Med
4019

MEDICINÆ
PRACTICÆ
Compendium

IOH. ANDREÆ SCHMITZII
Medicinæ Doctoris, & in
Academia Gelrica
Professoris.

Vocibus capitalibus ingenti numero, ad faciliorem propositorum affectuum investigationem, interjectis noua hac editione locupletatum.

G. H. Velschij. L. S. B.

GENEVÆ,
Sumptibus Petri Chouët.

M. DC. LIX.

لا طبيب الا ذو الحكمة
لا حكيم الا ذو التجربة



Hippocr. in Vrbic.

Μὴ λόγῳ σῶμα ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἰητρὸς νομίζεσθω.

CANDIDO LECTORI Salutem.

VTINAM *ab ipso authore huius opuſculi editionem procurari fata ſiviſſent: Longe enim accuratiora & correctiora omnia haberes,* Amice Lector. *Sed cum repentè letali morbo oppreſſus, mortalitatem explevisſet, qualecunque id*

erat, publicare visum, non quod meliora non reliquisset & accuratè pertractata, sed quod nova Methodo vniuersam MEDICINAM PRACTICAM, cum omnibus quæ ad morbos sive cognoscendos sive curandos vulgo requiruntur, in fasciculum quendam breviter constrictam, hæ pagellæ exhiberent. Miraberis ordine literarum morbos, non secundum partes humani corporis, vt plerique omnes scriptores solent, hic proponi. Cuius instituti sui rationes quanquam varias habuerit author, quas inter etiam hæc erat, quod in familiares vsus

hunc

Non è vivere, sed valere vita.
At nostri bene computentur anni,
Si grati et tetrica fulere febres,
Aut languor gravis, aut maligni dolores,
Et vita melior separentur,
Infantes simus et senes vicemur.

[Vid. Christ. Langii Miscell. Med. curios. §. 1.
et hoc dicti Lipsii ergo elegantior: Mustaf.]

---

hunc Indicem, non edendi animo, conſcripſiſſet; præcipuam tamen fuiſſe ſcias, quod exiſtimaret illam morborum iuxta partes humani corporis diſpoſitionem, non carere confuſione & imperfectione. Quid enim iuvat capitis affectus primo, deinde thoracis & ita porro, proponere, cum plurimi ſint morbi omnibus vbique partibus ex æquo communes, vt obſtructiones, inflammationes, &c. quidam ab iiſdem fiant cauſis, eadem habeant ſigna & curationem eandem, vt profluvia omnia, hæmorrhagiæ, fracturæ; vnde fit vt toties eædem repeten-

dæ ſint cauſæ, eadem toties iteranda curatio, vt lector pelvim ſubinde expoſcat præ nauſea. Qua quidem ratione multorum Medicorum Opera in ſtupendam molem excrevere. Satius igitur ipſi viſum, morbi alicujus rationem generalem dare ac mox ſpecialem in hac vel illa parte, quæ curationem generalem variare queat, ſubjungere: vt vno intuitu omnis in quavis parte curatio & curationis differentia pateſcat. Neque id ipſi viſum fuit ſatis accuratum quod vulgo dicitur, omnia medicamenta deſumi, vel à diæta, vel pharmacia, vel chirurgia,

cum

Theodoreti de cur. Graec. affect. Serm. 1.

Dux sapientissimus Medicus unus est animus scil. et corpori) efficit, et duae et illae medendi rationes prodierunt, iustitia cor probans q. unico ac dominatu moderans morbos, illius soda.

AD LECTOREM.

cum multi sint affectus in quibus chirurgia locum non habet nec pharmacia, neque sciri hinc potest, quid primo, quid vltimo agendum. Aliquando enim chirurgia in principio morbum tollit, aliquando vt pharmacia præcedat, necesse est. Quin & multæ dantur cibariorum formulæ quæ non nisi à pharmacia confici possunt.

Quare omnia medicamenta in quocunque morbo, vel Generalia sunt, quæ totum corpus respiciunt, vel specialia sive Topica, quæ partem tantum. Atque hæc illa sequi necesse est.

Inter Generalia primus locus

debetur diætæ, vt aëri, cibo, somno, &c. Secundo ad roborantia est attendendum, postea de glande, clysiere, Venæsectione, est cogitandum, tum de alterantibus, purgantibus, sudoriferis, diureticis. Quibus vel omnibus vel plerisque præmissis, accedendum ad Topica. Atque hac ferè Methodo vsus fuit author noster.

Hæc te monere visum, Amice Lector, simulque rogare, vt sicubi quid occurrat non satis expolitum, vel nævo aliquo laborans, id non authori, sed nobis, adscribas. Scripsit enim illa admodum iuvenis, nec correcta ad edi-

Jo. Chrysostomus in
Ps. IV.

Ἀλλὰ ἀεὶ, φησὶ, προσευχόμενος ἦν
διὸ ἐδόθησαν αἱ χάριτες
ταῦτα.

AD LECTOREM.

editionem reliquit: ſed prout in adverſariis eius poſt obitum reperta ſunt, ita edere maluimus quam in alieno opere ingenioſi videri. Quod ſi hanc curam noſtram benigne interpretatus fueris, proxime dabimus opus maioris momenti, Plantarum Velavicarum, imo omnium pene, accuratiſſimam Hiſtoriam, quam author paucis ante mortem diebus plenè abſolvit, & quo opere nihil à multis annis in Botanica laborioſius & exactius prodiiſſe, tute fateberis. Vale.

Georgius Hornius.

AD LECTOREM.

ET ego, *Lector humaniſſime, cum in manus meas opuſculum hoc ingentes labores exigua mole complectens incidiſſet, authoris inſtitutum comprobaui, & editoris animum beneficum laudaui. Sed cum Iohannes Andreas Schmitzius ordinem illum alphabeticum perſequeretur, breuitatique ſtudens vocibus primo occurrentibus, & ſibi forte magis familiaribus rem totam expediret, factum eſt vt ſibi quam quibus non deſtinarat commodius vademecum compingeret. Hinc omnes, qui alioqui libellum hunc in maximo pretio habent, de metho-*

di

Galeny ll. comp. med.
k. γ. c. l.

ὁ μὲν λόγος ἐνεδύκει τὴν δυνάμεως, ἡ δὲ πεῖρα κεύθει τὴν τῶν ἐνεδύτων δυνάμεων.

di illius difficultate conqueruntur: ut ex iis multi in vsum proprium peculiares sibi indices composuerint. Ea cum animo versarem, & medicorum filiis prodesse studerem, aliquid in scriptis alienis detrahere aut immutare piaculum ratus, huic operi medicinam facturus medicas voces ducentas & plusquam sexaginta, mea quidem sententia ad faciliorem propositi affectus inuestigationem necessarias, suis quamque locis inserui, quarum ope non iniustis eorum querelis abunde satisfactum existimarem. Ita enim inquisitor non omnino rudis aut in authoriss

dictiones primario incidet, aut in noſtras quarum indicio ad illas ſecundario deductus inueſtigationis fructu nunquam fruſtrabitur. Tu ipſe Lector experire, & induſtria noſtra ſi ea tibi arridet vtere: ſin minus pro ingenij tui facultate in medentium vtilitatem meliora molire, & interim vale.

NAΘ.



Judicativam, prognosticam, & curativam, nec satis accurate
divisionem, & Salvum Solarium plane conatur
Antonij Alvarezij Epit. Med. part.
1. epist. 1. p. 3.

IOHANNIS ANDREÆ SCHMITZII

MEDICINA Practica.

ABORTVS Symptoma est excretorum.

CAVSA est facultas expultrix irritata vel retentrix læsa, quod fit ab aëre, nimia excretione, motu, Venere, affectibus, natiua debilitate vteri, fœtus, retentricis facultatis, partu primo, odore extinctæ candelæ, Castorei, galbani: morbo fœtus à vitioso semine, copia vel inopia alimenti: morbo fœtæ, intemperie, febri acuta, ligamentorum laxitate, vtero hiante, intestinorum breuitate, soluta vnitate partium vicinarum. Lipothymia, conuulsione, dolore, Sternutatione, læsitate vteri ab humore pituitoso, *aph.* 45. *sect.* 5.

SIGNA *Diagnostica, aphor.* 37. 38. 52. 53. *s.* 5. *Prognostica.* In abortu magis afficiuntur quam partu : poma enim immatura non nisi vi evulsa decidunt. Sæpe, præsertim primus abortus, sterilitatem facit : periculosior est abortus sexto, septimo, octauo mense.

PRÆSERVATIO. Si occurratur causæ. Sæpe ab humore pituitoso fit. Interna & topica sint astringentia. Specifica sunt coralla, grana alkermes, rasura eboris.

℞. *Corall. præparat.* ʒ j. *marg. prep.* ʒ ß. *rasur. ebor.* ʒ j. *mastich.* ʒ ß. *grana kermes* ʒ ß. *manus Chr. perl.* ʒ ij. *f. pulvis.*

CVRATIO. Si præseruatio sit irrita, omn modo promouendus abortus.

QVÆSTIO. An angustia uteri abortus causa esse possit? Aff. prout ventriculi angustia vomitus.

ACHORES. Vide Sahafati.

ÆGILOPS. Vlcus caruunculæ lacrymalis.

AFFECTIO HYPOCHONDRIACA est colluuies humorum mel. sæpe & pituit. bil. in venæ portæ, art. Cœliacæ, meseraicæ ramis in hypochondrio præsertim sinistro collecta, ob læsam lienis coctionem sine putredine, è qua vapores horum naturam obtinentes & pars humoris varia Symptomata excitant ; ut nauseam, vomitum, ructum, diaphthoram acidam, nidorosam : (unde *Senn.* casum *Fabr. cent.* 4. *obs.* 32. non à semine,

بعون الله

Abcessus. vid. Chirurgica.

Abscessus hypochondrii. vid. Hist.

Eglisma Hypocistidis Catabasis.
Myrobalanus Electorum.
Ta. Corallij vegetabilis terrestris. [و عين البقر الذي في البحر]
Lithargirus Hispanici. ℔.
Nebay [illegible] a rosarum Electuarium. [و عين البقر الاحمر]
CC. Oculi.
Oculi Elaphorum Oculi. Conf. Statices Monspeliensis.
Hieraticum Hyocraci.
Ech. Helenij anisati.
Ta. Corallorum.
Margaritarum rosatus philosophorum.
Ta. amethystorum.
Aromatum Cydoniorum.

Cataplasma ex rad. cynoglossi recentis, sub Umbilico applicatum: Limonij.
Epenthesis Citri Nucis cydonij aromatica.
Antropinacle pincata.
Vngt. Com. Narcissinum.

Miraculis barbarorum, ab Arab. Vid. duct. mei ad Cl. Cons. epist. CX.
Gelo pro abdomen. [illegible] intus [illegible] is [illegible] Gelo Hypochondrium, Umbilicus partibus circumjacentibus.
Gadon Qeoudon Diocli Carystij ap. Galen. [illegible] rebat, ἐγγὺς Φλεγμονῆς ἐκαλεῖτο. Gelo. ἀπὸ τοῦ κατὰ γαστέρα διεῖσθαι theca: 1. Chron. IIX.
Diff. a melancholia hypoch. Multi n. Hypochondriaci, [illegible] nos melancholici, quales VI. apud XXIII.

Gelo Inflatio hypochondrium: ap. Clinicos Hamadan Alsaharavium.

Vid. Epifagm. mus. 7. Inter ventric
℔ d' sexti transverſi ſpinæ ℔
gemina omenti tunica dictu
efformat: d' V. aſſor. 7 IV.

Nullus vaſorum genus in hoc abſit exclu
dendus e, nec viſceris nullus immune
ce pt, adeoq; nec ℔, n vena Porta
tionis officina. Nec ſepar, d lien,
colatoria depurator, nec pancreas
℔ ductu ſuo Virſungiano d ſo. ꝑ
nec meſenterium c. ductib Aſelliani
d meatibz roriferis S. chyliferis P
quetiani ac Bilſiani, nec glan
dulis tam red Rorif ℔ alimenta
ria c. lactea d hymſ ductib
nec cerebz ſuc ℔ ſpinali medull
ctfi ℔ ſenſ adſect dicti ℔ ner
vos d ſo. nutricio ꝑprio. Nec ven
triculy d' inteſtina, ob ſemota ſua
Athonia ingenita obleſa.
℔ ſem. ℔ Uteri ſuc adſect e, d
is viris ℔ Uſa ſeminalia, d ſuc
℔ ſeminoidez.

7 Gen. l. conſ. Ec. C. d
Conſ. Cant-II. Conſil. Exoter.
7 XXV.

Syeliſmy inter ſigma pelvis,
gnomonica ap. Diocles:
mus tubz ex ventriculo, ſed ℔
cerebro, ſuta Nattomedis
Hyſmoy ℔ adſ. hypoch. c. VI.

ne, sed hypochondriacum fuisse vult:) flatus multos quos contineri vult. *Senn.* in cauitate illa Spiegelii in latere sinistro : anxietatem à pastu, alvum suppressam ob vasorum siccitatem, æstum hypochondriorum ; vrinam nunc crassam, nunc tenuem, turbidam, palpitationem cordis, syncopen, sitim, dyspnœam, vertiginem, epilepsiam, paralysin, lassitudinem, somnum turbulentum. Differt à Mel. hypochondriaca, quod in aff. hypoch. plurimi melancholia non laborent.

CAVSA est humorum colluuies ob ventriculi frigus, lienis debilitatem, hepatis calorem, intestinorum & pancreatis siccitatem, vasorum obstructionem, pancreatis præsertim & venarum lactearum vitium, collecta, in virginibus sæpissimè & mulieribus ob uteri vitium & menses suppressos.

S. *diagn.* Si à liene, tensio & durities ejus adest, facies decolor.

Si ab hepate ; in illo est tensio.

Si in mesenterio, vasis, &c. flatus, rugitus, durities adsunt.

Si in ventriculo, Coctio est læsa.

Si ab utero, rugitus est uteri, menses sunt suppressi.

Progn. Malum est contumax ob contrariam viscerum temperiem, humoris crassitiem.

Hæmorrhoides, varices, menses, sæpe eam soluunt, imo & hæmorrhagia naris sinistræ, urinæ nigræ.

Fœminæ ea rarius laborant: sed nunquam curantur. #

Vrina crassa melior.

CVRATIO. Indicans primum est humor vacuandus per humectantia & refrigerantia lenia, hemorrhoidum sectionem, vomitum, diuretica. Si frustra, ad duo est respiciendum. 1. Chalybem qui præstantiss. est in omnibus obstructionibus, aff. melancholicis, ob ejus sulphur quo abundat: unde videndum ne nimis calcinetur; sic enim adstringit potius sublatis partibus sulphureis. Exhibetur limatura chalybis vel chalybs pp. quod fit si in aceto macerata limatura siccetur & teratur, vel crocus vel tinctura, vel vinum, vel oxymel, vel syrup. vel elect. vel roulæ chalybeatæ. Dosis in subst. mediæ ætati ℈ j, vel non infra ℈ ij nec supra ʒ j ß. detur. Exhibetur commodissime vere & autumno; æstate enim calor, hyeme obstat frigus. Sumatur jejuno ventriculo, quo sumto una atque altera hora obambulet: si vires debiles, obambulatio omittatur. Prandium horis 4. post sumat. Initio tertio quoque die detur, post singulis. Quidam cum primis diebus cum vomitu rejiciunt: sed aliquando cum commodo datur ad dies 30. Videndum, ut chalybs per aluum descendat, quod è fecibus nigris cognoscitur: quod nisi fiat, quarto die vel clyst. vel pil. aluus cienda. Post decimum diem leniter purga & biduum ab ejus usu quiesce. Vt citius

Justi. Fürstenau, 2 ids c. Just. Mauz.

Epicrasi opta: ℥ iv cérebry pedl. cerui,
xella cerui Diosc. Carystio. Serpy.
℥ iv cerebr. Gedeut ex Athenæo.

℞ Specifici purgans Paracelsi,
Melancholiæ, & auth. hypochondriacæ
c. Cons. rosat. 3ij, 3. vel 4ij.

Pauli Dalby Com. de Warwick.
Pil. Fetidæ:
Diacastell. 3 Cornij.

℞ Antacidum Soc. ℥ ij ipse prop. sanat
rarò & hypochondriacæ, & curant
interdiu facilè, ℥ biz. h. u. à
Suppressi mensibj, ijdem provocatis
grauissimi. Nec ch. gravidas
nocuit solo impetu temporis
& melius & hypochondriacas, ℥
puerpio sponte restituunt.

V. S. eventilans dicta plica ℥ in aurem: & revellens aut diverters:
in brachio, in manu Salvatella dicta: Saphena in pede:
& in talo nunc omittenda, Juta
Vid. liens Obstructio, & separatio obstr.

G. Alberg. Inspicit V. S. ve
nena S. Mi. ex Scriptis, expli
& Mayerne.

Croci ℥ c. ℥ ℥.
℞ Ol. Capitina c. ℥ foliata ℥ ij
℞ Betonicæ c. ℥ Corticis.
Mixtura simplex.
℥ Diapente.
Electis.

Dyacrocum Asphodeli.
Mag. Ganolithi pondth. lassitud.

Distat ℔. à Reb. Ob.
Cæsaries Cæni:

Samech Paracelsi.
Mag. Vini.
Hypochondriacæ ℥ ℥ ij.
℥ ij Lilij: & ℥ ij Scabiosæ.
Dolor ℔. Lavane.

Extr. ℥ ℥. Cardui benedicti, ex aqua
D. Jacobi Starkij Med. Vienn: & ij Extr. Veronicæ in Scabiosæ
℥ de tribus Andr. Cnoffelij. Balthas. Timæi.

Metallica artificialis Alberti Kyri,
& D. Erbarij Medici Reg. Polon.

Ol volatile H. Antihypoch.
Elix ij ℥ ij.
Ol ℥ ij de Rivery.
Elix. ℔. Lymphæ à ℥ ℥.
H. Hepatica.

Extr. Camphor. 3ij c. ℥ & Opp.
Foliat. ℥ ij.

Resol. Saphiri c. Sp. Limon. Fausta
Mag. Sinapis ejd.
℥ Cochlearia c. Mag. Viscorum
& c. Rhinocerot.

℥ Hepatica . . ℥ Fuit. Bestr.
Hypochondriacas
℥ Anethi.
Corall. rubri ℥ c. ℥ ij Ol.

Vinum Salvianum Nov. Limon. sal.
c. ℥ ij ℥ ij ℥ Cochleat. Ly
cordiæ. tamarisci. Cichor. radic.
Capparum. Cary opt. an ℥ ij ℥. &
Hepaticæ. Fragm. bin. Rhen. opt.
Maij. Bene to Cal. per XX. d.
Sæpe agitando, ℥ col. per charta.
Dos. ℥ ij. c. Sp. Juniper. simplic.

Ol volatile
Elix ℥ ij
Ol ℥ ij
Elix ℥ ij
Ol ℥ ij
Elix ℥ ij
Ol ℥ ij

Mitridatis Pedemontani.
Conf. antid. Spermatocetiata.
℞ CC. — Fuligin.
Pil. Castell. d Corin.
Syr. rof. Persic. c. Cham. ℞
J. Bapt. Melij.
Pil. Ammoniac c. Sc. Card. ben.
Emulsiones papaveris & Sem. Cucumer.
Germesatæ.
Enecthismata herbaria.
Ptisanæ Spinæ c. bals. Dezphibus.
Cinnabaris rosacea dicta, per
Serum Capillis infus. rof.
Damascen.
Serum medicatum Stahlianum. NB.
apienis, & alterius furgans.
Aq. ex Xylobalsamo & Ex Petalis.
Potio Galatij & Stahlianis.
Succolata lactaria Jo. Mar.
tinj Bonomij, Venetij.
Pastillata testiculata Andr. Lan-
renzinj.
Emplastrum Butschij Norsinj.
Pro Analeptico R. M.:
Pil. Stomachal. gdi.
Carminativi gdi.
Confect. Alkermes.
Pil. Stomachal. gdi.
Carbunculi.

Pastilli Balsamodendri, & Hedychroi
Crocus &, ambræ, boracis aa,
CC. Ebori &. Rad.

Pil. Spadani Jo. Eichmanj.
Gottfani Balthasaris.
Marcostinæ R. Mund:
ex aloë Violata c. Oo &c.

Acidulæ Luccienses, Geppingenses,
Heimerenses, Antoniani Colonienses, Vallis Solis Tridentinæ,
Engaddinæ S. Mauricij.
Herinq: Serinq Virtembergica,
Ellenses, Teplicenses, Castinæ
enses, Laudecenses, Meidor
fenses, Spadanæ, Aquisgra
nenses Cornelianæ, Vilbadenses,
Fabarianæ. Schelciana, Ticinella
Nuerianæ. Tragemata.

℞ Pastilli Balsamodendri, & Hedychroi
Crocus &, ambræ, boracis aa,
CC. Ebori &. Rad. Scorton. gdi &
Conf. Alkermes. Conf. Sl. tunic.
Pil. Stomachal. Viol.
Spec. Diamb. Euphrasiæ.
Diacydoniæ. Pil. Margarit
Conf. Hyacinthina.
Lap. Bezoar c. Rad Scorton. M. fig
Mag. Cornu cervi.
Ebenus fossilis.
C. Rhinocerotis.

Alphar. vid. Jacobæi.
& Zibethi.

citius descendat, addi possunt purgantia & corrigentia & sub forma pil. exhiberi. 2. ad acidulas & thermas, quas qui bibunt, nigra per alvum dejiciunt ob vitriolum. Visitatæ sunt acidulæ Svvalbacenses, Griesbachienses, Egranæ, Thermæ Badenses, Carolinæ. Medicamenta è tartaro facta:

II. Partes debiles corrigendæ & roborandæ per interna & topica. Sic ventriculus frig. per cal. interna: hepar cal. per topica, vel per clysteres refrig. vel exhibe pulpam citri cum cort. hæc enim diutius morabitur in ventriculo; vel integra grana piperis. Vel homini diu jejuno exhibe refrigerans, quod citissime hepar petet, si præsertim se non mediocriter exerceat. Vel talia calida exhibe quæ subsistunt intra calorem hepatis quæque ob id ejus intemperiem non intendunt, vt agrim. fum. cichorium. Sic roborato stomacho tutò hepatica frigida exhibebis. Vel propina talia quorum mixtio noua & prima coctione non soluitur, sed secunda & tertia; vt Sp. vitrioli.

Si à suppressis mensibus, v. s. opus est,

ALBVGO. Oculi vitia.

ALOPECIA. Pili.

ALVI fluxus. Diarrhœa.

ALVVS SVPPRESSA Causa: Bilis defectus, ut in ictero & post purgationem vacuata bile & excrementis, cum bilis à vita sedentaria & incurvatione continua regurgi-

tat in ventriculum. Inedia, cum omnis liquor à partibus famelicis attrahitur; quod & conualescentibus accidit. Pituita intestina obducens. Sic in vita I. Heurnii narratur I. Lipsium pituitam instar intestini excreuisse. Hepar calidum. Fæces duræ, paralysis. *Laur. Cons. 7.*

CVRATIO variat pro ratione causæ. Si à duritie fæcum, si clysterem purgantem injicias, tenuia excernet, dura subsistent. Ideoque clysteres duos vel tres merè emollientes injicies post purgantem: vtilia sunt mollientia in cibo, serum lactis, malva, pinguia, potus copiosus. Sauonarola duci Ferrariensi suasit, ut in ttiduana suppressione nudis pedibus in pauimento mormoreo inambularet aqua frigida perfuso. Cum quinquaginta passus feciſſet, potenter alvum dejecit. Verum Brassauola periculosum hoc esse judicat. Tormina enim & fluxus sequi possent. Nonnulli ventrem solvunt ovis sorbilibus: quidam purgantium odore, alij manu ea tenent. Platerus tussi & sternutatione concitata. Vtiliter extra applicantur umbilico.

In infantibus supprimitur ob lac pituitosum, ventriculum debilem, errorem diætæ, epatis calorem, iique raro sani vivunt.

CVRATIO. Si occuratur causæ. Nutrix vel infans mollientibus utatur, mel ros. solutivum exhiberi potest. Si meatus cholidochus sit obstructus, decoctum rad. gramis,

obstructio: adstrictio et coniunctio:
gradatio et atrophia: collapsus a
vinia vacuae: enterocele: sensus
obtusio irritatus ung sentiens.
a efficacia varia: interna et
externa: aer calidus, siccus: status
agonicus Mappa. V. et XVII.
victus cal. sicc. balnea, unctura
cal. sicc. dentitio, sopitus, vectio,
sessio gravida, epistaxis frequens.

Juvenes: alvus ig alvus, ig febrilis
media efficacia: nisi ob
noctu plerumque. V. appar. cal.
obstructio a feces durior,
vermibus, fit. vitrea:
angustiae a tumoribus:
gradatio ig ileus.
Sensus obtusio a lesione nervorum
sectio pairs.
obs. XLIX.
Hemeyerus: ibid.

Electus len. Cornelii Baersdorpii &
Carolo V. Cas. ap. A. Gassen. obs. XLIX.
alias G. Guelmani, a Christoph.
Electus pestilentia c. Fe. cas. a Thuanus
Fr. Col. Ch.
Phil. alias c. Eff. absinth. a Rhi. Eff. aa p. apth. Ph. aliis Phantasiae
Daniel Ludovici Jacobsthaleri exstinto.

Suppositoria glandes.
Enemata emollientia.
Vesta lax. Epomphalia: ex Libano myrtabacis datis.
Vaporosae emollientes.
Balnea ig dulcis, emollientibus incocti.
Enchiridia Hoëchia.
Blepharospasmus Morgenstedt.
Cocula celeberrima.
Melancholia Oetzmelles Epomphalis Rhei.

tat in ventriculum. Inedia, cum omnis liquor à partibus famelicis attrahitur; quod & conualescentibus accidit. Pituita intestina obducens. Sic in vita I. Heurnii narratur I. Lipsium pituitam instar intestini excreuisse. Hepar calidum. Fæces duræ, paralysis. *Laur. Cons. 7.*

CVRATIO variat pro ratione causæ. Si à duritie fæcum, si clysterem purgantem injicias, tenuia excernet, dura subsistent. Ideoque clysteres duos vel tres merè emollientes injicies post purgantem: vtilia sunt mollientia in cibo, serum lactis, malva, pinguia, potus copiosus. Sauonarola duci Ferrariensi suasit, ut in ttiduana suppressione nudis pedibus in pauimento mormoreo inambularet aqua frigida perfuso. Cum quinquaginta passus feciſſet, potenter alvum dejecit. Verum Brassauola periculosum hoc esse judicat. Tormina enim & fluxus sequi possent. Nonnulli ventrem solvunt ovis sorbilibus: quidam purgantium odore, alij manu ea tenent. Platerus tussi & sternutatione concitata. Vtiliter extra applicantur umbilico.

In infantibus supprimitur ob lac pituitosum, ventriculum debilem, errorem diætæ, epatis calorem, iique raro sani vivunt.

CVRATIO. Si occuratur causæ. Nutrix vel infans mollientibus utatur, mel ros. solutivum exhiberi potest. Si meatus cholidochus sit obstructus, decoctum rad. gramini-

nis,

obstructio : dirimptio & coangustatio :
gyratio & ptosis : collapsi à
vinia vesicae : enterocele : fensus
obtusio irritatus ex fentieur.
a efficaces varij : interni &
externi : aer calidi frigi : flatus
aqueus ~~III~~ apta. V. & XVII.
vicis cal. frig. balnea, inuncta
cal. frig. demittis supini, vectio,
sessio prima, extensio frequens.

Iuterni : calor ij alij, ij febri
medra efficacer : mi ch
nocturni. V. apta. a
obstructio à fecij durij,
verunty, fit. vitrea :
angustio a tumoribus :
gyratio ij ileo.
Sensus obtusio à lesione nerv
sepij pair.
Hilperyerij : ibid.

Elitis Iem. Cornelij Baersdorpij &
Carolo V. Cas. aq. A. Gassen. ob. XLIX.
alind G. Guetmanj, & Cristoph.
Elitis passulatis c. fo. cas. & ~~Thuan~~
Syr. Cort. Cit.

Pil. aloes c. Ess. absinth. & Rhei. ~~Thuan~~ ca. p. asth. Pyl. cibi alij Pantiocy
Daniel & Ludovij Jacobi Hanij extento.

Suppositoria & glandes.
Enemata emollientia.
Iusta lax. Epomphalia : ex Libano myrobalicis ~~Thuan~~ data.
Vaporosa emollientes.
Balnea ex Rhei, emollientibj incocti.
Enchiridia Hoëtica.
~~Thuan~~ Hesphangiem Colocynthidatz.
Cocnia helleborata.
Melanthium Oatz melleo Epomphalis & Rhei.

Angina puerorum pestilens epidemia.
vid. mob. infant. NB.

nis, fænic. aſparagi conuenit, alvus cienda per glandes, clyſterem. Venter inungatur vnguento molliente, cui interdum grana aliquot ſcammonij & coloc. indantur. Lenientia propina.

AMAVROSIS, ſeu gutta ſerena. Oculi vitia.

AMBLYOPIA. Oculi vitia.

AMBVSTA. Combuſta.

ANGINA. Inflammatio faucium.

ANEVRISMA. Non eſt tumor ex ecchymoſi arterioſi ſanguinis vt vult Galen. Plat. &c. quia ſic ſanguis ſe in latum æquè diffunderet; quia cutem tingeret: quia facile putreſceret. Sed tumor ex tunicæ interioris arteriarum apertione, exterioris dilatatione. Aperitur vel V. S. imperita: cum exterior tunica, vtpote mollior, coaleſcit denuo; interior aperta manet. Vel à cauſa externa. *Senn. l.5. p.1. c.43. Fabr. obſ.44. centur.3.*

S. *diagn.* Tumor mollis tractui cedens alias cum, alias ſine pulſu, colore à reliqua cute non variat, tactui cedit, aliquando etiam non cedit. *Progn.* Recentia curantur, antiqua non. Sectio periculoſiſſima eſt; ſæpe fit à laborioſo partu, item in gutture.

CVRATIO. Apponatur adſtringens & repellens. Lamina plumbea ſub quavis forma. Sectionis modum vide apud *Senn. l.* cit. ſed tentanda non eſt. vide *Pareum l.6.*

ANI procidentia. Procidentia ani.

ANOREXIA. CAUSA: Quod Suctio vel non fit, vel non percipitur. Suctio non fit. 1. Cum alimentum in toto corpore redundat. 2. Cum humores crudi, crassi in ventriculo hærent. 3. Cum adest obstructio venarum. 4. Vsus pinguium, dulcium, lentorum. Suctio non percipitur. 1. læso cerebro. 2. ob morbum orificij ventriculi vt intemperie quæ sive cal. sive frig. sit insignis, Anorexiam parit. Sæpe fit à potu vini, vermibus, vtero. Causam diuturnæ abstinentiæ quidam volunt esse Dæmonem qui cibum in corpus suggerat; cujus tamen nulla sunt indicia, cum & brutis idem naturaliter accidat. Quidam occultam qualitatem esse statuunt: quidam aëre vesci volunt. Sed quid convertetur in naturam absumti? Quidam vaporibus in aëre hærentibus. Sed cur non omnes eodem modo nutrimur? Quidam aquæ potu vivunt: sed multi aquam non biberunt. Quidam statuunt pituitam in corpore hærere quæ absumi non possit; sed multi pituitosi non fuerunt; sed potius ventris aridi, subacti; sicque senes diu viverent sine cibo. Quidam volunt adipe liquato & in sanguinem mutato vivere: sed falsum est adipem liquari, in ventriculum fluere, in sanguinem mutari, nec per inediam in alimentum cedit sed discutitur. *Fort. Licetus* nutritionem non esse necessariam dicit; quia anima ea opus

non

Aij prurity.
ol. Rhumpfe. ? Schenckius ; mulso.
Viol.
Oleum Salvie ; Solani d planby. Oake.

Vnguentum veneris, non - deletarium
vocabat Nestor ap. Reinesium ; ep.

#3. ol refolutions nervor Stomachi,
cog. 4. ol interceptions Spiri
minalis, ; apoplexia. 5. ob
comitis pemicies, ; fell. mag
ligni, & hepatis. 6. ob ag
gerationes comitis, ; phrenitide
melancholia. 7. ol orificii ven
ticuli inferioris, tumore, solita
mitatis. Mellf. Lib. IV.
Sect. 1. Spec. Med. R. c. XII.

[#d plegz malitiosè inedias finiz
lamint.]

[#astione, Valiade, alteriae, d
robriae.]

non habet, nec corpus. Sic ſenes minus nutriuntur: generatio item & auctio ceſſat. *Senn.* Cauſam eſſe ait, quod nihil vel certè non niſi longo tempore conſumtum fuerit, ob humoris ad calorem certam proportionem. Sic *Scal. Ex.* 328. ſcribit carbones juniperi per annum integrum ignem tenere incorruptum. Diſpoſitio autem illa humori inducitur, cum ob humoris mel. diffuſionem figitur, vt actuitatem caloris recipere non poſſit. Peculiaris a. inducitur qualitas humori melan. ab vtero. Omnes enim ferè fuere puellæ, ea ætate qua menſes erumpere conſueverunt.

S. *diagn.* Si ſuctio non fiat, vires non proſternuntur & adſunt ſigna repletionis. Si ab obſtructione verò, alvus liquida excernit. Si ſuctio non ſentiatur, vires proſternuntur. *Progn. aph.* 33. *ſ.* 2. Reſpiratio, appetitus in ægris optimum. *aph.* 6. *ſ.* 6. anorexia in pueris periculoſa. Si in principium vel vigorem morbi incidat, tam periculoſa non eſt anorexia: pauco enim egent alimento, & ſi bene edant plus damni patiuntur. Si in declinationem, malum. Si in morbo appetitus ſit proſtratus & ſubito poſtea appetat, lethale. Cerebrum enim læſum eſt niſi criſis præceſſerit.

CVRATIO. Tollatur cauſa: acria, acida famem faciunt, vt & detergentia, vt ficus, garum. Si fit ex vtero, eius affecti adſunt ſigna, Symptomata interdum remittunt &

plura adſunt ſymptomata. Qua ratione vtero ſuccurrendum ſit, *vid. de ſuffocat. & Intemp. vteri Sen. l. 3. p. 1. ſ. 2. c. 2.*

ANTHRAX *ſive Carbunculus* tumor eſt è ſanguine aduſto ferventiſſimo ortus, eſcharam in parte affecta faciens colore vario inſtar iridis, cum veſicula in capite.

CAVSA: ſanguis craſſus, aduſtus, ſeu atra bilis.

S. *diagn.* Incipit à puſtula exigua ſeu pluribus, præcedente pruritu, breui per modum fluxionis ſemper increſcit cum ſummo ardore & dolore, præſertim circa veſperam: deinde febris & ſymptomatum peſſimorum caterva. *Progn.* Pernitioſiſſimus eſt peſtilens, niger, lividus, qui evaneſcit, qui prope partem principalem hæret, quem febris præceſſit. Tutior ruber, parvus, non peſtilens.

CVRATIO. Indicans primum ſang. refrigerium per generalia vt Diætam, V. S. alterantia, non purgantia. 2. Cor à malignitate vindicetur per iuterna & topica, imprimis per ſcabioſæ vel ſuc. vel aq. vel decoctum. 3. Cauſa conjuncta vacuanda ſcarificatione ſatis profunda cum cucurb. hirudin. Si tamen nimium affluat humor, arnogloſſ. cum furfure coctum ſupra carbunculum impone, vt repellat præſertim qua nobile membrum ſpectat. Poſt plaga aq. ſalſa collavetur. Loco ſcarificato non malactica, ſed ſiccantia & putredini reſiſtentia apponenda vt ægyptia-

Spe. t Cicha. c. alia? Exputo L. Barbetty.
Diarrica . .

Vinu Myrofyly. OB.

Appetitu excitantia acidula d aq; Crocdi: de Crem. Tt:
Stimulat ij a calida: amara,
acria, Salsa ij fixida.
Vid. Simplicia ij intra Med. J. J. à Bruy.
Composita ij Euchii. R. Sel. ij Mso

gyptiacum vel farina orobi cum oxymel. vel ſcabioſa vel ſucciſ. viridis trita cum axungia porci vet. vitello ovi & ſale. *Pareus l.21. ſeq.* ſæpe eſt expertus.

℞ *fuliginis* ʒ iiij *ſal. com.* ʒ ij *vitel. ov.* ij *miſc. Radix raphani in taleolas ſecta, potenter trahit venenum. Par.*

Si omnia fruſtra, adhibe cauterium, ſenſus enim ademtus eſt. Eſchara mollientibus non eſt tollenda, vel cum anthrax ipſe cruſtam faciat, mavult *Senn.* vti *Scab. rad. & ſymphyt. raphan. theriac. fuligine, mithrid. ferment. ficubus, ruta, nucibus iugland. rancidis, vitriolo* &c. iiſque Cruſtam removere. Si orbiculi inſtar circum abſcedat, & circulus ruber appareat, futuræ ſanitatis indicium eſt. Cruſta enim ablata vlcus deterg. mell. roſ. ſucc. apij. &c.

CVRATIO peſtilentis differt, quod vena ſecanda non eſt, niſi forte ſub carbunculo ad evacuationem: ſemper attrahentia apponantur vt fimus columbinus, ſapo, pes columbinus, cæpe ſub cineribus cocta & ſuperiora. Quidam aiunt ſi circulus circa carb. fiat cum ſapphiro, eum prohibere ne latius ſerpat & venenum extinguere. *Senn. l.5. p.1. c.* XI. & paulo poſt.

APHTHÆ. Cauſa vel oris vitium cum humores in eo colliguntur: vel totius vt in febribus malignis, acutis: vel partis ut capitis, pulmonis, hepatis, lienis, ventr. uteri;

In infantibus lac acre linguam erodens, item lac putrescens quod vapores acres emittit.

Differentia: aliæ recentes sunt, aliæ inveteratæ, aliæ malignæ aliæ non, aliæ in lingua aliæ in palato, aliæ à sanguine, aliæ à bile.

S. *Diagn.* Tubercula conspiciuntur nunc rubra nunc atra; nunc alba, nunc nigra & fætida. *Progn.* fætidæ, nigræ, ulceratæ, crustosæ, inveteratæ in infantibus lethales, quia eis med. applicari non queunt, quia partes sunt molles, humidæ, vnde facilis putredo, ossis corruptio in aduktis periculosa. Si fiant in febb. acutis & pestilentialibus, lethales sunt.

CVRATIO. In infantibus lactis acrimonia tollatur in nutrice per generalia & topica. Infanti haustus detur è melle rosat. & diamoro cum oxymelite, sirupi primo adstringentes, post addantur discutientia. Si lac male coquatur parcius lactetur. Si frustra, suppurentur caricis appositis, vel coq. furfur in aqua donec lenteſcat, colaturæ mel adde, vel lacte vel mucag. sirup. iulap. gargar. pil. subling. pupul. eclegmatis.

In adultis. 1. humores attemperandi. 2. causa continens adstringentia primo requirit, post & resolventia. Si sint malignæ, aq. viridi, vel ægypt. vel ol. fervente imbuto specillo ex Actio. vel aq. forti quæ vires eluserit in metallis. Seq. repellit.

℞ *aq. caprif. plantag. nucum aa* ℥ iij *ſl. ros.*

Ani fissura. vid. Sebit. Mf. p. 105. Ani ulcera. vid. Hid.

Ani condylomata. Vid. Chirurgica.

Animi deliquium. Vid. Lipothymia.

alię flaua, alię albescentes, alię liuidę, alię nigrę. Vt e. phlegmone et felis, vt fine illa.

Syr. Hyssopiano. I. Lydion melli pectoralibus, Iubsidentibus, Iujubabus, ut vocabat Io. Gisselinus ap. Hildan. Abstinendo, ut acrimonia et causticis.

Ol respectiva diz animalis fue y
digus ablatis, ob vegetis spiri-
tus animalis influxus y organa
illius oborta.

& Lympha crassior nervor obstruens
Q. Barbetij R. Med. lib. 1. c. 5
& lit. ffi, & ff. oppilat. hi
& Sachery d. n. 5. l.

ros. rub. sic. p. j. in colat. dissolv. sir. granat. diamor. aa ʒ j. m.

Sp. Vitrioli gutt ij mellis ʒ j. mixt. bonum.

Crato ep. 183. Ad inveteratas utilissi. est cinis rad. fænic. ustæ vel per se, vel cum melle illit. Ne ab inunctione à Mercurio fiant, *Forestus* os colluere jubet sæpius oleo amygd. dulcium. [Si tamen gangræna immineat vel suffocatio, repellentia locum habent in malignis.]

APOPLEXIA est symptoma quo omnes actiones animales pereunt. #

CAUSA est non obstructio ventric. cerebri: illi enim Spiritus animales non generant, repugnat experientia in dissectis, neque hydrocephali ea laborant, in quibus soli anteriores ventriculi sunt obstructi, sed 1. Pituita vel humor mel. principium sp. medullæ, prout in sectione Varoliana demonstratur, obstruens. 2. Sanguis vel ictu vel alias effusus eandem partem comprimens. 3. Diathesis phlegmonodes, in qua cerebri vasa à plethora distenta partem illam comprimunt. 4. Si cranij contusio illam partem cerebri comprimat. 5. A Spiritu narcotico, vnde torpor in curatis. 6. Vulnus cerebri & inde nata sp. effusio vel turbatio, *aph.* 58. *s.* 7.

Different. Fortissima est in qua respiratio cessat, nec spuma vel stertor est. Minus fortis vbi spuma est cum stertore. Debilior ubi respiratio est violenta, inæqualis, inter-

mittens. Debilis ubi reſpiratio eſt ordinata.

S. *diagn.* Differt à lethargo quod lethargici excitari poſſint & in ſomnum recidant, adeſt febris; apoplectici non excitantur, excitati paralyſin incurrunt ſine febri. Differt à caro. In Caro reſp. eſt integra, ſenſim invadit: puncti ſentiunt: in apoplexia ſecus. Differt à ſuffocat. uteri: quod in hac faciei color mutetur & fiat lividus; in apoplexia non. In hac vis ſentiendi ſæpè manet, nec reſp. læditur; at ſi reſpiratio lædatur, pulſus etiam læditur: in apoplexia non. Differt à Syncope: quod in ſyncope color faciei mutetur, dentes, os, manus claudantur: in apoplexia laxa manent, in ſyncope reſp. nulla & pulſus nullus. Differt à Catarrho ſuffocat. quod hominem ſenſu & motu integro ſuffocat. *Progn.* Apoplexia 1. & 2. gradus lethalis, *aph.* 43. *ſ.* 2. Apoplexia à cauſa prima eſt, quam intelligit *Hipp. aph.* 42. *ſ.* 2. quæ à cauſa 3. 4. facile curatur. Non ſepeliantur ante 72. horas: quia omnes humores intra illud ſpatium moventur. #

CURATIO. Indicans primum obſtructionis liberatio, quod fit ſi excitentur. Secundum, cerebri roboratio. Vtiles ſunt pulv. cephalici *dib.* 1. *p.* 1. *c. ij.* Senn. Si fiat à cauſa prima præmiſſis excitatoriis, ſi vires ferant, ſanguinis copia adſit, in æſtate, vere, juvene, V.S. per vices in brachio, vulnus fiat amplius. Vel ſi ea uti non liceat, Cucurb. ſcarif. ap-

Observa loquitur. Ego infra quatuor dies
a se veniet rosatt, solita obstructione
d. ipsius sinus parte.

Gentiana quadrifolia.
Tussilago tussi multi ejusdem agentes
sepiendo.

Resina Succini.

Is paroxysmo, excitato per rauda, aut
i epilepsia. Remedio per clys,
mata, fridiones, ligaturas, frigo,
Historia, encarabitas, sinapismos,
pharmica.
Defatigantia foris intus sp. debenda,
Suffitus ex Succino, galbano,
Castoreo &c. Balsama odorata.
Unguenta paralytica illita.
Extra paroxysmum: accedendo, ad dis
versalia, pathi, vadendo
universalia ad particularia: et
roborantia.

...ch Cephalica c. Opobals. Carina.
...l. Echinobalsamj Barbarinj.

...anda Emetica si ventriculj
... per Sympathiam elicit effectus.

...v (busa.
...Jonicus.
...fis.
...lil. gradle.
...rantj Sum.
Eff. amboe.
Castorej.

V. Schalij anim. adv. lib. VI. §. 66. c.
not. R. Schalij de vrij; nisi à cibo
apoplexia & Meningitidis Oratij Rocch.

Extremitatis Spectabilis ...o Lauri,
Spicej, Cotta. Hyppic. & Scarlatt. Fel. Dexter

Justinj. Regulentium in Gal: ...
Gal: in multis ...
re multo magis. Generis Asthmatis
& Symptomatum gentium Asthmatis,
nec & Empiricis curationes, quae ipse
Forsan desiderabuntur.

Schr. Spec. Med. P. part. IV. Sect. I.
c. XIIX. usq. VIII. de exercitio vesper
meridiano, & balneo Calidiore.

Aq. d. ...efrig. Laurin. portulac. acetos...
Succ. endiv. Sero Capritic.
Syr. Viol. frag. acetos. Cichor...
cichorior. Jul. acet. Syr. rosar...
Syr. Cort. pulp. Cit. Nymph...
acetosell.
Cort. aur. c. Gummi Tragacanth. & Bolo
Armen.
Diaphoretic. Sero Sudorifero
Cinnab. Cort. exterior Cydon...
mic. c. rhapontic. p. aeq.
Syr. glycyrrhiz.

plicentur cruribus, brachiis, lumbis, ſcapulis; non vero poſteriori thoracis parti. Poſtea per generalia & topica materia à capite derivetur & vacuetur. Vomitoria tamen fugienda: # quia ſuffocationis facerent periculum. Purgantia fortia ingerantur; ut pil. ſolutæ ſi deglutire poſſit 2. cerebrum roboretur. Si à cauſa ſecunda V. S. opus vel cucurb. ſcarif. diverſione item, vacuatione, roboratione.

QVÆSTIO: An repellentia ſint ex vſu? Gal. eis utitur. Neg. *Foreſtus*: Quia morbus hic celerrimè ad ſtatum properat: quia nulla eſt fluxio. *Senn.* diſt. in apoplexia à cauſa tertia ait convenire.

APPETENTIA canina. Bulimus.

ARDOR VENTRICVLI. Cauſa vapor acris è bile flava, porracea, æruginoſa, è cibo corrupto, acri, caſeo putri, porro, * è dulcibus pinguibus elevatus. Vel ſi bilis veſiculam ſuam & ventriculi tunicas flavo colore tingit, & tum diuturnus eſt affectus; vel ſi ob ſtudia corpus inflectatur & ſic ventriculus è veſica bilem exprimat.

CVRATIO. Tollatur cauſa. Sedetur ardor per generalia & Topica refrig. item acida, imprimis illa quæ humorem præcipitant: ut creta alba, nux moſchata, bolus armenus, oculi cancri. C. C. Lap. Carpionum, grana thuris. marg. præp. Corall. præp. Vt

℞ *nuc. moſchat.* ʒ j *Cretæ* ʒ ij *ſacch.* ʒ iij *f. pulvis, doſis* ʒ ß *vel* ʒ j.

ARQVATVS niger. Icterus niger.

ARTERIA aperta. Hæmorrhagia vulnerum.

In ARTERIAM asperam illapsa. Obstructio.

ARTHRITIS est dolor vel tumor cum dolore articulorum ab humore seroso, acri, qui partim distensione, partim acrimonia, membraneas partes vellicat, easque dolore afficit.

CAVSA: Humor serosus, acris, salsus, Tartareus, ut è dolore, tophis, & ineptitudine ad suppurationem colligitur. Iecoris, & lienis calor & siccitas, diæta, dispositio arthritica. Licet enim eadem fuerit temperantia victus, hic fiet arthriticus, ille neutiquam. Suppressio urinæ & sudoris quæ semper fere paroxysmum præcedit. *Pareus l.17.* malignam statuit materiam; quia dolores acriores sunt quam in exulcerato cancro; quia remediis appositis sæpissimè exacerbatur. Gal. theriacam præscribit.

S. *Progn.* Arthritis à multis morbis præservat. *aph.49. s.6.* Tumor, varices apparentes boni. Si non revertatur lethalis. qui alvum habent siccam, in iis curari nequit. Tollitur vel resolutione, vel in ichorem & saniem mutatur, vel in tophum, vel ad partes principes fertur. *Laur.* suppurari aliquando ait, si per vincula in partes carnosas exprimatur humor.

CY-

Agor Urina.

Ca: aerimonia ejus. cujus iter Eq varij ejt. d uit. ures, per alimenta: & per intrita: Poh Sorbacaij. Dulapia. Emulsiones. Jerg laudr. Balnes fol. Vitis d rapar.

Elitta eq Conf. Viol. malv. de. c. hord. al/kek

Arteria aspera assitas nimia.

Ca externa, flatz eglomares, pulu. fiens, acida, falsa, alua, aeca, ra, vina inutilia.

Interna, catarrhi salsi, humores maligni, vocis interceptio.

Curatio per lenientia, levigantia, emplastica suis morbis.

Sanat. Cauta. penid. Cremor hordej. Butyracea. Mucagines. Emuls. Semi. frigid. Syr. Viol. frigid. altheae papav. glycyrrhit. Trochisci bechic. alb. nigri. Tab. Diatragacanth. Glycyrrhiza Cocta. Ol. amygd. d. rec. ol. viol. rec.

Ecquitates cor. Partis mandantis vbey, et recipientis Eqq. Imbecillitas artic. boz, e ca sine qua nos. & commentes. Ca externa: aer frigid, Boreas: calidus ly: et cibi calidiores ac poh attenuantes: amaenitatis dis: animi pertentia, inanis vacuatio, & grauedo: Ca externa gravitas: Capitis & inglutiendi, poh cibi grossiores immodici, cibi salsi acres.

Ca arthritica debilitantes, frigus Vis, Vesp, inglutiendi, & ignatia.

Causa prima, Or aerimonia sive Eq frigid siccitas salsa: tuctaq vocis scientia.

Arthritis vaga, Anglis Naring dicta: cui curatio + V. S.m frigidarum & refrigerantium. Clysteq + Mayerne h. + arthrit. f. 27.

Aq. hordej Cata Emetica.

Emuls. semin. Cathapuciae amygdalat.

Pil. Cynosphor.

CVRATIO. 1. Revellentia adhibeantur: ut si adsit plethora, febris, vires, V. S. imperetur in eodem latere: vel si manus sit ægra in opposito. Cucurb. scarif. hirud. fricat. ligat. 2. Vacuantia. Purgans postea detur una vice in principio citra coctionem; cum vires consistunt per paulo fortiora. Durante purgatione pes vel pars affecta altius locetur, vel defensive præmuniatur. Vomitoria utilissima. Post sudorifera imprimis, & diuretica frigidiora, imprimis C C. radix bardanæ. 3. Topica anodyna. *For.* miraculi instar laudat Lenticul. palustr. & fl. Chamæm. in jaste coct. cum far. hord. *Spiegelius* aqu. stillè rad. fl. ulmariæ, pinguia noxia. Imo ad narcotica sæpe accedendum. Vide *aph.* 25. *s.* 5. Primo sint resolv. & modice repellentia è plantag. aq. sperm. ranar. semper vivo, portul. ros. cum moderate resolv. sub quavis forma. Repellentia autem sint frigida & humida. Resolventia sunt aq. fl. fol. verbasci, lumbric. terr. decoct. artemis. rad. in aqua marina vel salsa. *Spiegelius* commendat urinam humanam veterem. Sal urinæ. Spiritus salis aq. ulmariæ temperatus & parti dolenti penna illitus. Liquor solutorum limacum in vase cupreo cum sale, vel incoq. aceto & ol. ros. suffumigia resolventia prosunt: præstat fimus columbinus in aceto coctus, urtica in vino cocta.

Tophi curantur mollientibus cataplasmatibus

tis è caseo veteri, suc. Tabaci & suffitibus. Caseus putris cum iure pernæ. *Scal.* addit pulv.pyritis usti. vid. *Sen.d.arthrit.* Fimus ciconiarum coctus in axungia. Schreckevos. Ischias sola resolventia & attrahentia requirit. *Vid. lit. ff.*

Si dolor sit tensivus, si pars impressi digiti vestigium non retineat, flatus cum pituita arthritidem veram mentitur. Chirurgi incauti pus subesse rati aperuerunt magno cum ægri damno. *Fab. cent.* 1. *obs.*79. *cent.* 4. *obs.* 84. podagram tortura curatam vidit.

Fallitur sæpe Medicus putans causam esse calidam. 1. si dicat calidis juvatur. E.frigida est, cum per apertionem pororum calida refrigerari queant. 2. Frigidis dolor sedatur. E. calida: quia frigida sensum tollunt, non causam. 3. Est intensus. E calida, quia frigida ob virus malignum idem possunt. 4. Color est citrinus. E. fit a℔ bile. Quia multa pituita pauciſſima bili tingitur. 5. Febris adest, urina flammea. E. quia vigiliarum & doloris ratione febris oriri potest. *Parens l.*17.Rulandus eam curavit purgat. sudorif. è rad.asari ʒ ij Centaur. min. m. ij balneo è ligno junip. ℔ j gran. junip. ℔ ß.

Præseruatio fit à diæta. Gall. gallin. capones uitentur, quia podagra laborant [ob esum arenæ.] *Senn.* Vitentur pinguia, frixa, omnia condiantur artemisia vt solet fieri, petroselino, nimium deambulare & equita-

re

te valde noxium. Pedes vinaceis expressis cal. immittantur. Quidam singulis mensibus ad pollices pedum V. secant : alij singulis mensibus ante plenilunium cucurb. non scarif. plantis pedum apponunt. Purgatio fieri potest. Vtilia sunt medic. antipodagrica quæ vid.ap. *Senn.* articuli roborantur pluribus modis.

QVÆSTIO : Quæ causa? *Fernelius* causam antecedentem extra cranium colligi vult: 1. quia nullæ venæ eo desinunt & adest capitis gravitas. 2. quia excrementum in cerebro collectum per nares & palatum expurgatur. Contra argum. *Laur. & Senn.* Sed si intra cranium colligeretur & inde deflueret per palatum , arthriditem semper præcederet nausea, vomitus, tussis. Si à corde vel epate, præcederent bubones in inguinibus & alis; ibi enim propria sunt emunctoria.

Fernelius vult non per vasa sed sub cute descendere materiam. *Neg. Laur.* 1. Quia febres in arthritidem desinunt , quarum causa in venis est. 2. Sæpe V. S. percuratur. 3. quia ante paroxysmum rubent & tument venæ. 4. faceret horrorem.

Fernelius causam vult esse pituitam. Non est sanguis : quia extravasatus putresceret & suppuraretur : non melancholia, quia in scirrhum abiret , nec subito afficeret : non bilis, quia in pus abiret ; non pituita salsa , quia exulceraret.

2. An omnis dolor articulorum sit arthritis? Neg. quia sic luxatio & dolor à lue venerea in virginibus & parituris in quibus coxæ dolent; imo etiam humor in articulis sensim generatus, esset arthritis, quod falsum est: sit enim œdematosus potius tumor, quam arthritis: sic ab exsiccatione humoris in articulis fiunt eorum dolores. *aph.* 16. *s.* 3. non tamen arthritis.

3. An tempore doloris purgandum? N. *Crato ep* 167. negat quoque cauteria in pedibus convenire, quod partem affectam vacuare non liceat: vnde *Erastus* lepram male sudoriferis curari, *Crato* dysenteriam per clysteres asserit. Sed erroris plenam vocat sententiam. *Pareus l.* 17. *Hollerius.*

ARTHRITIS vaga Scorbutica est dolor variarum partium.

CAVSA: est omnium humorum ichor tenuis, turgidus, malignus. Pars affecta: nervosum genus: quia in dorso & lumbis ob substratam medullam valdè luxuriatur; quia fac. nutricis actio læditur: quia nervosis curatur.

Species. I. Tumores circa articulos habet, qui si diu durent proferunt maculas ut in scorbuto, quæ aliquando suppuratæ in ulcus malignum vertuntur: inprimis circa pedes è quibus vermiculi instar Cantharidum proferuntur. Interdum tota materia in vnam aliquam partem decumbit: Vnde corpus totum

Vini mustichelli &c.

Hermes Ferinus.
Helvetius.
Augustinus Vindelicus.
Caput lupi Coelii Aurelian. l. tard. l.
veterum in vini remedio. Gloss. Indoct. l. Tr. VI.

Vomitus provocat ad arthritide, semel
audivi in anno. D. St. Jacques.

Hybrida Sphecobolarix.

tum dolore liberatur, abſceſſus excitatur, qui in fiſtulam deſinit.

II. Abſque tumore; hæc ſæpe maciem infert cum impotentia articulorum.

S. diagn. Vagi & atroces dolores in omnibus partibus potiſſimum dorſo & lumbis: primum unam ſolet invadere partem; deinde celeri diſcurſu vicinas quoque occupat: alvus in pluribus eſt adſtrictior, urina fanorum ſimilis, niſi quod interdum vermiculi inſtar eorum qui è caſeis putridis oriuntur in fundo matulæ innatare & alvi excrementis miſceri videantur, alij bene appetunt, alij non. *Progn.* Curatio ſæpe ad ſeptimanas extenditur.

CURATIO. Empirica ſunt: Lumbrici terr. variis modis præpar. alij talpæ vivæ combuſtæ cinerem cum vino, luna decreſcente, exhibent. Dogmatica.

℞. *pulv. Sen.* ʒ ij *infunde per horas* XII. *in aq. beton.* ℥ jv *forti expreſſ. add. diacarthami* ℥ ß *m.*

℞. *Rad ſucciſa* ℥ j *ariſtol. rot.* ʒ iij *ſalv. beton. ana m.* I. *abrotan. rut. vinc. perv. ſabin. an. p.* I. *coq in aqua ſimpl. cum huius decocti* ℥ iv *pro doſi trajiciantur per colum lumbrici terr. ter vino loti & triti n.v. dein miſce theriacæ* ʒ ß *pulv. Cinam.* ∋ j *ſacch q ſ ſorb & ſuda. repetatur per dies aliquot continuos.*

Abſceſſus rumpitur plantag. & ſale in mortario tuſis impoſitis. Rupto abſceſſui alij cataplaſ. è rad. ſigilli Salom. cum cereuiſia applicant, cum rad. fil. quer. Alij aſpergunt pulverem talpæ. H. de Bra.

ARTICVLORVM vulnus. Vulnus articulorum.

ASTHMA eſt læſa reſpiratio ſine febre // cum ſonitu & reſpirationis frequentia ex bronchiorum anguſtia. Si ſumatur proprie, affectus eſt contumax & diuturnus.

CAVSA Vſus auctus ob bronchiorum anguſtiam. obſtructio ab humoris copia, craſſitie, calculo, grandine. Tranſmittitur autem illa materia raro à capite, ſæpe ſenſim colligitur: ſæpiſſime tranſmittitur per venam arterioſam & arteriam venoſam. Si enim ſæpius à capite flueret, tuſſis adeſſet: quia aſthmatici plerumque ſunt cachectici, pedeſque eis intumeſcunt, quia abſque expectoratione ſæpè ceſſat: quia ſuppreſſis hæmorrhoid. ſæpè fit. conſtipatio à tuberculo, tumore. compreſſio. ſubſidentia. coaleſcentia. conſtrictio. à flatibus craſſis ex utero elevatis.

Quicquid reſpirationis inſtrumentis moleſtum eſt, ſi facile excuti poſſit tuſſim facit: ſi difficulter non tuſſim ſed aſthma. Vires enim excuſſioni non ſufficiunt; ſi difficillime, orthopnœa fit; ſi non excuti poſſit, Catarrhus ſuffocativus.

S. diagn.

Atrophia. Vid. Macr: d: Hectica.

Iunij Lunbricatij.
Lumbricis. tem. Italij Saponarij
Caprarij c. Offic de Croco.

Ghondij q. ejjd. ff Dyffnoea, et Orthopnoea. vett. ghisa hinc dentist Jul. Guastavinj II. Schedior. Med. c. VI. inj b q. Cass et effè d. stinguebat.

Ca ejj sepè defectio capitis, et xaxrodoXeyor corporis, cui arbitr similis vapores hesenti q. ffiyon. Jussend, nec rois, Gratiathi ben. tienti Sebinn aspecti d Dyffnoea multe empresso.

Stefanj? d Aurelijs Bern. Godinij. IV. Pr. IX.

Oe Orthopnoea sive d affec. Lugo Bern. Godinij vid. eius Guil. Ballonij tom. III. Cathol. sive Epitom. d esse. p. 198.

℞. Talamonti Lobi affis. M. Barn
Holtzii Diatrib. singular. §. III.
de Distinctione & Causis Gibba
rum Bassani Lanzi Lect. Ac.
Nat. Georgica cum Tabula Fi
guris Incisa: Lib. Cent. II.
Consilior. Cyclor. XCVI.
℞. Marcelli Malpighii nova
recta, de Vesicalis & Faecalis pul
monum: D. Valsalvae de aure humana
disquisitio ad. M. Bartholini
M. Instit. anat. c. IX.

Eph. Lelekovij cornedo Holtzmij.
Medica initia nocivamque ergo
Sanat.
Cassia Rabenhorst.

Ephem. Vale D. Phil. Millerij D. Hofm.
Medicae Cardiacae.
Emily. Comitis Hispan. c. de Marsch
Alberti.
Instit. Fe. Comitis de Federic. tert. &
Papav. ch. c. Seab. Cantio.
Syn. ex ipsi. D. A. Jacq.
Tisana diuretica ex Ouoride, Hey
jungiell. c. Fe Chij & Talb.
℞.

S. *diagn.* Si à cauſa craſſa, ſenſim genita, ſenſim fit aſthma eſtque continuum. Si affluit, exacerbatur per intervalla, vt tempore autumnali, hyberno & noctu. Si à cerebro, ſigna catharri adſunt. † Si ab epate, adeſt tumor pedum & cachexia. Si humor craſſus obſtructionem faciat bronchiorum, tuſſis adeſt cum ſonitu; ſenſim gignitur, Catarrhus abeſt, ſanus eſt æger. Si pituita in pulmone hæreat, adeſt tuſſis & ſonitus & raro quid expectoratur & malum pertinacius & diutius hominem enecat.

Si à ſiccitate pulmonis (ſic vidit Heurnius pulmones ita aridos ut aridum pomum retulerint.) ſputum deficit, macies adeſt totius. *Progn.* Infantes ſuffocat, ſenes non curantur *aph.* 40. *ſ.* 2. juvenes difficulter. Periculoſum eſt in febre acuta.

Mutatur aliquando in peripneumoniam, hydropem, cachexiam.

CVRATIO. In ipſo paroxyſmo cauſa eſt revellenda per frictiones, ligat. Cucurb. Clyſter. V. S. ſi vires valeant, adſint indicantia, ſi humor tenuis purgant. Topica mollientia, reſolventia. Quando ultra quartum diem extenditur paroxyſmus, veſicatoria in dorſo è regione pulmonis applicentur.

Extra paroxyſmum, materia evacuanda præparata, poſtea expectorantia dentur, pectus ungatur. Si à catarrho, cerebrum vacuetur. Catarrhus ſuſpendatur. Vſus ther-

cæ veteris eximius est, ut & diacalaminthæ, vini adusti enulati. post siccetur materia decoct. guajaci." Victus sit attenuans: potus vinum tenue, melicratum, Motus ante cibum non subitus, non vehemens. Sic enim multi sunt suffocati.

AVRIGO. Icterus, flavus.

AVRIS obstructio. Obstructio meatus auditorij.

AVRIS vlcus. Vlcus auris.

AVRIS vulnus. Vulnus auris.

AVRIVM humiditas infantium. Infantium humiditas aurium.

AVRIVM tinnitus. Tinnitus aurium.

BRONCHOCELE. Hernia guttu-ralis.

BVBO tumor est vel inflammatio glandularum in inguinibus, sub axillis, auribus. Phyma, Phygethlon parum differunt à bubone.

CAVSA. Sanguis vitiosus, crisis, febris.

S. *progn.* Si non fuerint maligni, periculosi non sunt. Si tarde suppurentur & diu durent, fistulam fere faciunt. Sub axillis citius maturantur, tardius sub inguinibus, tardissime parotides.

CVRATIO per generalia. Sic V. S. utilis est cum cessavit fluxio. Catharsis in principio & fine. Topica nunquam sint repellentia sed attrahentia & resolventia, vt cucurb. fermentum, resina, diachyl. cum gumm. satius

Euphr.
L.
Ephr. rad. Jacob.
V. Mandrag.

Tr. Troj. c. ℞ d. Nucleario.
Arcanissimum Echinophoreon.
Cassia Rafenensata.

Fr. Bezoard.
Stimulo balsamico, Regulino, ℥ Oculi
℥ Oculi, ex vin. Selen.
Unicum Diaphoreticorum ex V. Saturni.
Lilij a Fonte.

Jacrassantia d. Hungaria ij catarrho
femij: attenuantia, obstruentia
fij, à lento crassos, lenta. ℞
Evacuantia partialia Cephalica, errhina,
apophlegmatismij, sternutatoria.
Berne, Turcicum, Londinense, Aquense, Bal
lerucense. Balneum Diuretum. Spelunca S. Helenæ.

Aurium dolor: otalgia.
Ca erysipelas: Vesicæ frigidæ V. frigida,
vijcida, ustiva: acria, mordacia.
Inflamm, tpa flatulenta membranæ
duræ, phlegmone, sinus in aliena.
Sanies, Vermes, pulvera. Salivatio.
Dicta L. Crudelis c. Salivatio.

Aurium vermes.
Generalia.
Antihelmintica, amara, acria.
ex ℔ Cephal, Absinth, ℥ss, Tanacet.
Tostrix in ol. ℔ Euphorb.

Aurium hypersarcosis i meatu.
Chirurgica postulat, quæ
℔ imperforatio.

Aurium Ulcera. Vid. Chirurgica.

℞ ℔ Fumar c. Rad. Althææ.
Lilij. Verbasci Diapleuritica antiphthisica.

Lacc. Serpentaria Dioscor.
Dr. Antonij.
Cassuria Solenicalata.
Lignum Aphrodisij Jupiter.
Turbith Nigrum ℥ Pulv.
Grajacij
Mag. Salomonis Selenitis.
Emily. Fol. Sempervivi c. ℞. Jec.
Martij
Vinum Hazardij.
Stibiata Lotio d. Rad. Imperat.
Hazardij, ex Tinct. Butyri Lilij
Valerij Cent. II. Confil. 47.
Conf. Ros.
Facultas Antimonij Paracelsi.
Vitelli Emplastr.
Ung. Malvatici Crocati.
Hydromeli medicati.
Vinum mysentericum.
Pastilli angelicati.
Pyr: d. Lonicerij Horatij.

Ol. Scordij tartarei, ℔ ij. Euphorbiæ
Cancri ana ℥ss reficiant. Meconiata
Symphonici Angelici Anodyna.
Purgantia, Aloetica. Diaphoretica, Epispastica.
Antihelmintica: Balsamica.
Ol. Hofmanni exp.
Ol. Pimpinellæ Crocatum.
Cimbricum optimum.

℞ Fol. persici
Juniperi.

Curae: fere eadem Apoplexiæ,
vulgo dictæ. Ab ea vero dis-
jungenda.

Interna.

Externa.
Epicarpia et Pulegij.

Cardialgia. Nephritis. Hydrops.
Pleuritis. Pneumonia.
Ca Externe: aër frigid, mest
& malignus, & à Febre.
V frigid & phlegmatic: & nimis
& crudus, oleos & fluxiles esse,
sed nimia refrigerantia. Vide
aerem, aquas. Catharticabo,
Diuretica. Venena, Cathereticas,
Emetica.
Interne: Flatus & stranguria.
Humores aeres, & ventriculo
genitis, vt obstruentes ab aliis
partibus. Vlcera, Vulnera,
Tumores. Vide ea incumbentis
fonds.
Curatio: per antidota, & regimen
Symptomatis debita: & per
& ablationes, & varia.
Removende a. Externe: vis,
tempies & aeris corrigende:
flatus discutiende: Tum. ea
purgand per vomitu & deje-
ctiones: venena alexipharmaca,
& debellanda: Vulnera &c.
Tum. phlegmatis curatio indigent.

V. Stomachica Cal. & Aquosa,
L. carminativa dicta &
vetera Med. J. J. à Bruno.
Composita a. & Euchi.
Pr. Lib. & Phs.

V Caj. c. vin.
Elix. pp. L:
vitæ M:
& foetic.
absinth.
Junip.
Syr. menthæ.
Card. benedict.

Pulv. arom.
Ster. a Nutritat.
Cort. aurant. & citri
Calam. arom. & Cit.
Euph. cyp.
galang.
Cyp.
Zedoar.
Ol. D. M. de Macis exp.
Ol. Totius arom.
Vin. arom.

Narcotica tantissimè danda.
Laudan opiat.
Philonia.

Externa: Olea & Empla.
vid. Frig &c.

venenos. vid. J. J. Rumleri obs. XXIX
& Curatio malignæ Epidemiæ &c.
obs. XXXIIX.

ſatius eſt ſi procuretur ſuppuratio, reſoluti enim cito redeunt. ſuppuratio aperiatur, ſolidetur. Curatio bubonis venerei eadem eſt, niſi quod ipſa lues etiam curanda. Curatio peſtilentialis bubonis. Tumor ante omnia ſcarificetur: ſic enim virus vacuatur, humores ob dolorem attrahuntur, vel veſicatorium imponatur poſt attrahentia, ut Ammoniac. rad. lil. ſcabioſ. cœpa theriaca repleta coćta, pulli gallinacei, columbini, circa anum deplumati, catuli diſſećti: poſtea maturantia apponantur, tum digeſtiva: ulcus tamen ſtudioſe apertum ſervetur. Si gangræna minetur, ei occurrendum. vid. *Senn. l. 4. c. 6. d. peſt. l. 6. p. 4. c. 23. l. 5. p. 1. c. 6. Laur. de Lue ven. Pareus l* 21. & 18.

BVBONOCELE. Hernia inguinalis.

BVLIMIA eſt appetitus auctus, ſed non continuus cum lipothymia & virium dejectione. Appetentia canina ſemper eſt cum vomitu, vt in canibus, vel diarrhæa.

CAVSA ſuctio in orificio ventriculi. Humor mel. acris, acidus, alimenti defectus quia calor id abſumit, ob vermes, longus detergentium vſus, ut ficuum, gari, quod in ſeipſo expertus eſt Rondeletius. Sæpe fit ex utero.

Cauſa Bulimi eſt frigus ventriculi. Sed quomodo? non eſt credibile vellicare hum. pituitoſum, exprimere, conſtringere: quia in vivo actuale frigus non datur. Platerus à

contractione caloris à frigore ambiente fieri statuit, vnde hieme plus edimus. Senn. etiam putat frigus ambiens orificium ventriculi vellicare. Sed an semper hieme accidit hic affectus?

S. *diagn.* Appetentiæ caninæ: si fit ab humore acido, ructus fiunt acidi. Si à defectu alimenti ægri emaciantur. Si à frigore hyelus est. *Progn.* Facilè in vomitum diuturnum, cæliacam, Hydropem transit. Fames magna post morbos recidivam minatur. In morbis chronicis quartana, quotidiana, hydrope lethalis.

CVRATIO appetentiæ caninæ: Causa vacuetur potissimum per vomitum. Dentur cibi famem compescentes, pingues, lenti, caro bubula, porcina, cerebrum animalium, amylum recens. Parcè tamen sumantur. Alterantia commodiss. sunt vinum, sp. vini, vinum salviatum, theriaca, mithrid. Vacuans est hiera. post robora.

CVRATIO Bulimi. In ipso paroxysmo fit si excitetur à syncope. Extra paroxysmum non statim cibetur, sed recollectis planè viribus. Post curatur ut appetentia canina.

CACHEXIA Intemperies est corporis frigida & humida cum symptomate coloris mutati & morbo magnit. ob tumorem pedum.

CAVSA Sanguis serosus, pituitosus crudus. Vitium hepatis, lienis, ventriculi, cerebri,

Balbuties.

Melancholia Zimara cap. primi autor
Anat. Vivor. ij lienosis.

Vsitata ap. Hippoc. VI. Epid. s. IV. vocat.
Calor ꝺ per ἀντίφρασιν dicitur.
Resolv. fomenta, venticulare
mixta accedens, aut copiosis, aut
aequalibus.

Saccharum Cretalis Canalis.

‖ εὐχυμος, εὐπεπτος, τοπάλοφος.

Vinum Salviatum.
Descript. Vid. not. vino ꝺ Hippoc.
II. apho. XXI.
Exhib: fomenta calefacientia

Off. Melissae. Ol. Macis ℈.
℔ ij. ij. gran. Piperis.

[Diacydonites Canalis, c. Elect.
Diacalaro ℥ ij. frid.
Deckers aestate.]

Si a vermibus, Helminthocton
seu de purgantia misceantur.
Hiera picra: ex puncto Alimentali.

Est vitiosa Corporis habitus ꝺ
εὐεξία opposita. Celso. III. cap.
tabis ꝺ: media inter ἀκαχεξίαν
& ἐυεξίαν.
Diff. κακοχυμίας: ut ὕδρωπος,
ἱκτερος, & alios affectus legi.
Particularis, aeris partis, ut
Universalis, totius, ventriculi &
reliqui & licet quaeque alia
& tria partes affectus constituant.

#Jmod: ca et vacuas, mec sis,
Sponte vt arte facta.
Humores p.n. ; viscerib; collect:
Sinch: intemper.

Syr. Domestic Rosarum.

Eid. Magic Butyr. Lolij.

#obstruct: aperiendę: Intemperies
alterandę: cacochymia purgandę
Suppress vacuandę excitandę.

Roborantia tonicap viscerib;
oris restituentia, post pur-
gantia, mucp omittenda.

Gnay alacrum gdum Jo. Terrentij.
Hyelcym aureum Jo. Hiemanij.

Det Li. S. phi Fisch c. Cichoraceis,
aphthis et hydrop.
Det ad. Sinens. et Saffaras, Butyr
Silvatic.

Mtra crassa, terrena,
viscosa: varia ḡ partiū
varietate, ḡ ffs repit.

#Suis sucy petrific: aut, vt Cs
ffs Gorgonej G. Carleton.
Diff. varię à figura, colore,
magnitu, numero, to, et ffitū
tig modo.

febri, renum ulcus, ob quod ſerum regurgitans ſanguinem infecit, menſium ſuppreſſio, voracitas & ingluvies nimia. * *

S. *diagn.* Color pallidus, plumbeus, tumor mollis circa oculos, genas, pedes, manus. *Progn.* Sæpe pueros affligit ob voracitatem, ſenes, mulieres. Curationem recipit niſi fiat à morbo incurabili.

CVRATIO Materia vitioſa vacuanda. Cauſa tollenda. Intemperies tollenda per generalia topica. # Vtilis eſt pulvis cachecticus dictus vel alius pulvis è limat. chalybis, vinum chalybeatum. *Senn. l. 3. p. 6. ſ. 2. c. 2. For. l. 9.*

CADAVER an à fulmine tactum. Renuntiatio.

CADAVERIS ſuffocati ſigna. Renuntiatio.

CADAVER ſubmerſum. Renuntiatio.

CADAVER vulneratum Renunciatio.

CALCVLVS RENVM.

CAVSA Tartarus. [~~Calculoſa & arenoſa renum diſpoſitio, cum Fernelio,~~ renum ſiccitas, cum Platero calor.] Item venus, exercitium mox à paſtu, cibus, aer, potus, coctio læſa.

S. *diagn.* Mictio ardens & laborioſa, urina mucoſa, alvus impedita. *Fab. obſ. 63. c. 1.* doloris in glande ſenſus *obſ. 66. c. 1.* ſtupor cruris lat. affecti, vel quia muſculus ploas comprimitur vel nervus ejus, nauſea, vomi-

tus ob nervum sextæ conjugationis. Distinguitur à dolore colico. 1. quod in colica dolor est acutissimus, quod dolor supra renes extendatur. 2. Colicus dolor mobilis est, calculi fixus. 3. in Colica potius alvus, in nephritide urina supprimitur. 4. dolor nephriticus ob ureteres descendit sæpe ad testiculos; in colica non item. 5. Colica in sinistro latere plerumque exacerbatur ob coli ibidem angustiam.

CVRATIO. In paroxysmo injiciatur clyster molliens, vacuans, vel talis potus, vel bolus &c. exhibeatur. 2. Si plethora sit in toto, V. S. adhibeatur in cubito, si ad partem affectam affluxerit, in malleolo. 3. omni ingenio molliendum per interna, externa, ut cataplasm. è fol. parietar. malv. tritis, coctis, cum mucilag. sem. lini, fœnugr. alth. balneum, semicupium è rebus mollientibus. Interna sunt sirupus de althæa. *Fern.* Item Foresti illud valde probatum.

℞. *Sem. malv. alth. ana* ʒ iij *cicer. rubr.* ʒ iij *Sem.* 4. *frig. mai. ana* ʒ ij *hordei mundi* ℥ ij, *Caric. ping. n.* IX. *feb. n.* VII. *glycyr. rasp.* ʒ v. *Coq. in* ℔ iv *aq. f. ad* ℔ ij

Crato cancros in lacte coctos applicat, lac cum mica panis. vel

℞. *fuc. portul. inspiss.* ʒ j *gumm. Arab.* ʒ ß. *f. pil.*

Sic laxatis viis ægro in balneo sedenti exhibeantur

Cacochymia. Nos differt à Cachexia
nisi gradu, eodem curandi modo curanda.

Ag. thy Syroga coenulea J. S. Elixatis.
& rad. Sarsaparg. simpl. vel. coc.

La Colizne gravellense: Galli dicta
Nephritis arenaria S. Solicarus,
phitica. J

Passule Lini & Costidate.
Cassia Cancelidis so. pruncta.
Cerebinthina & Manna ana Lepata.

" flatus discutiens & abstergens: # succi Colocasiae, id cap
mediocri parte

Dolor Uteri anodyne demulcendi,
aut thy Narcotici obtundendi.
aut Par:
Philonii Plenf. & Rom.
aut ana Unguenti D. Nicholai Lyf.
Aleucatici: vel ex Solij capit dulcis.
Cataplasm. ex farinetaria cort. alb. ol. amygdal. d. de Scorp. S.
add. thy rad. pelroselini
Fomenta humida; facculis, vel vesica, vaporosis adhibita.

Q palmis bombacinis, Succ. Paulin.
Vini Cameracensis: d Infus. ejus. in V. c. sacch. Cantio.
Ol. amygdal. amar. dulcis. Scorpiorum amygdalini.
Bals. Copayv: Barbette.
Sol. glacies Paradis. c. v Cir. J.
Malvatici: Terebinthine Hyacinthini comp. ejus.
v Ung. c. Q Rosat. dulcificat.
Succ. Cochlearis Jus.
v Ung Cerussati
Oenanthina Ung.
Fa. J.
Succus alb.
Mag. Cydonior.
Cydoniorum.
Ech. succ. lumbr.
Mag. & sol. Lap. Nephritici.
Ess. & Ech. Cichor. fragor.
v Rotul alb Basilic. Valentin.
Garabia milleda & Scorpiocrypso.
Ocul. galli vetuli & gruis popularis.

Orbis Limonata c. tri. rectis. Palmarum, Palmarum.
Basilissomeli auctarium Prenestinum.
Phagorum c. St Hermiani. J. Balsamum.
Mag. pelargolithorum.
Polychrestum compositum universale.
Domicilium Fagus Alta Oak.
Vfl. Caryophyll. fil.
H. Nolimetangere.
Saxifragia.
Crepitus.
Hominum.
Hederatum.
Fra. + alts. Femelij.
Nephrocatharticum Jalappa.
Vfagorum.
Ferula.
Juniperi.
Justus. Sed. tem. & vfaenic.
Trans: + c. Ebusinum.

Ofagum c. Vfnicell. et Hyr. alb.
Vil. Simpl. aq. J. J. à Brun. Scamp.
& Enchir. Fr. Mel. Sch. J.
Stoechas fil. S. lapidea dicta. Lepta
mel. Anesilaus.
Sts L. fragum c. Sem. Vid. St. Gyb
Sem. lapp. major. Hyoscyamus. Al.
Vparis domestica genista ca. Al.
Ofilicum. Ofilix. fabar.
Crystalli.
Androgynolithi.
Oak & Vparis c. tri. alb.
Rob Grossul.
Sts Leopodij & tri.
L: Nephritici.

Sig. à subito, figura, colore, magnitudine, numero, situ, alijs liberis, alijs vesicæ affixis & stabilis.
Ca. Clavis rerum, salis, femelis Summa efficiens Septentrionalis, sex Systolicus, Vena.
Signa calculi liberi: vaga, & obscura linea subexistentibus, sistentia & sui grandior, gravitas cum sonoris in cumbentibus: assidua mictio, & incerta, non ostensa: stillicidij, & vbi vena & non Vena

hibeantur diuretica ut calculus moueatur. Crato ſeq ſæpe uſus eſt.

℞ *alth.* 3 ij *paſſul mai. exacinat* 3 iij. *Veron. hed. terr. ana p.* 1. *Coq & detur hauſtus.*

Vel aliud è Terebinth. &c. Si fruſtra, calculum frangentia exhibe; ut ſangu. hirci vel caprill. Calidus extra applicatur. Item ol. ſcorpionum. Æger ſuccuſſatorem aſcendat atque eo duo milliaria conficiat vel gradus plures pluries adſcendat ad laſſitudinem, ſumto diuretico vel oleo amygdal. Frictiones ſuperne deorſum fiant. Cucurbita ſicca renibus applicetur; deinde paulo inferius & rurſum alia atque alia oblique ad inguina vſque. Sed dolore ſummo urgente eis non eſt utendum. Hoc tamdiu faciendum donec calculus in veſicam delabatur. *Pareus l.*16. *For. l.*14.

CALCVLVS Veſicæ. Calculo veſicam intrante miteſcit dolor. Tum igitur ſi vires ferant, equitare ægrum vel pedibus iter conficere oportet: præterea liberaliter potare, à potu quam maxime poteſt urinam cohibere, ut aucta urinæ copia ſimul calculus excludatur: interim extra & intra diuretica applicentur. Cum urethram ingreſſus eſt cavendum ne remeet, ſed digitis ad extremam glandem deducatur lubricata via: ſi in glande reſtitet uncinis evellatur: ſi fruſtra terebello fiſtula ſua incluſo teratur. At ſi lon-

gius à glande reſtitet nec ulla arte queat exi-
mi, tum à latere recta plaga penis eſt inci-
dendus, non ſupra, ob vaſa, nec infra : eſt
enim pars membranea. filo interim ſtringen-
da eſt urethra ne remeet & præputium quam
maxime eſt trahendum, ut totam glandem
tegat. Facta inciſione, exemto calculo, cu-
tis remittenda, ut inciſum penem integra
cutis contegat : ſic enim unio erit facilior.
Vltimum remedium eſt lithotomia, vid.
Senn. chirurg. *Para. l.* 16. extrema ſunt nar-
cotica ſed caute exhibita. Crato ep. 121. ma-
ximos dolores curavit diſcuſſis flatibus per
clyſterem ; aucto calore viſcerum. Sic um-
bilicum inungit oleo de Terebinth. junip.
nuc. moſch. Ventriculum ſolo oleo nucis
moſchatæ : per os exhibet decoctum Vero-
nicæ cum vino, vel decoctum raparum cum
ſaccharo candido, butyro vel oleo amygd. Sed
detrahendus illis eſt cortex & primæ coctu-
ræ aqua abjicienda. Inungit aq. alb. ovorum.

Fernelius omnem calculum veſicæ è reni-
bus veniſſe ait ; quia omnia mucoſa è veſica
per urinam vacuantur : unde omnem calcu-
lum veſicæ ſi frangatur cortex, nucleum ſem-
per continere tanquam indumentum. Cine-
ritij eſt coloris & ſcabroſus. *Fab. Cent.* 4.
*obſ.*5. vid. *Hiſt. Guilh. Laurembergij*, qui cal-
culum veſicæ medicam. curavit apud *Senn.*
*l.*3. *p.*8. *ſ.* 1. *c.*2. aquæ per catheterem immiſ-
ſæ in veſica lapidem frangere poſſunt : licet-

que

Vita ad [illegible] utilis, ne
a deo [illegible]

Lapp. ng. potest multis fundi [illegible]
alcahella: sed potest [illegible] olej
litharg. [illegible]; hi nondi, plane indurati. Alfir; adeps anser, ng.

Lenientia ex Cassia Terebinthina.
Specifica Lacrimae Opii Hypocistidis.
Lung. ex Diacodion:
Manna c. Sp. V. ol. pol.
Diapnun. Sinapi.
Jusseus Hydrolej, Malvacej.
Joh. Cap. Venecij.
ex emolientibus & litharg. [illegible]; ex Marsil. Cagnati
ap. Andr. Crocc. & Colleg. Med. Veron. §. III. c. XVII. ex unio
exfrenh Calculi, & dolor
ingeminantur.
Injectiones augent ex lacte mulierij
c. Aq. Rosar. & unicag. Phil.
aut tubulo faucibus.

Jusc. Plantaginis S. Hermetis pharmacy Americanj.
Syr. Sticis H. Angeni.
Vitrig. c. V. Basilicj & Fumarij.
Syr. ☉ Amelungiana c. [illegible]

Troglodytica Salitr. Nitri alb.
Vinum asarinum.
Juscula Melanocrotonis c. Syr. Limon. &c.

Calcanej contractio.

Calvitium, vid. pili. Ede m. li
el, cyrus, f alopecia, Gmissio pi
mittendi, f mutatio mutandi.

M. Diazbel.

M. Hemiatia c. v Lamberg.
apoplectic. Card. Lem.
Terebinth.
Ai.

Vulnus l. i.
Ech. Purgatur.
epilepsia Arundi. Weitzend.
Regii morbi Hombarch.

que extra corpus humanum in lapidibus è veſica extractis periculum facere.

CANCER. Tumor eſt durus, aſper, inæqualis, rotundus, immobilis, lividus, profunde hærens venis atro humore turgentibus & in habitum ſparſis ad inſtar cancri divaricatis.

CAUSA: atra bilis. *Heurnius in aph.* 38. *ſ.* 6. duplex venenum eſſe aſſerit, unum putrefaciens quod exacerbatur ſuppurantibus, alterum erodens quod exacerbatur cathæreticis.

S. *diagn.* Tumor calidus, dolorificus, ulceratus. Vlcus eſt fætidum, ſordidum, labia ſunt tumida, craſſa, livida. *Progn aph.* 38. *ſ.* 6. per occultos non ulcerati intelliguntur. *Senn. Fab. Cent.* 3. *obſ.* 87. Nulli cancri etiam mammarum, abſciſione curantur quin recidivam faciant. Cancrum labiorum quomodo exſtirpare debeas docet *Pareus l.* 6. *c.* 29.

CVRATIO. Perfecta abſciſſione fit. Vlcerati prohibendum incrementum, non ulcerati ulceratio. Palliativa. 1. fit diæta. 2. vacuantibus & alterantibus. 3. revulſione & derivatione per fonticulum. 4. Topicis. Succus decoct. Solani, intybi, cochlearum carnes elixæ, cancri fluviatiles, ranæ virides, ol. ranarum. vid. *Sen. l.* 5. *p.* 1. *c.* 20. cineres cancrorum. *Sen.* herb. ſcabioſ. *Robert.* chæref. aneth. Caprif. pulv. ſterc. hum. *For. l.* 17. cinis verbaſci, Chelid. min. *Rob.* ol. ovorum

& cera in mort.pl.cum aqua ſolani cum piſtil. pl. mixtum. Lac afininum utile eſt & theriaca, Eriſymum tritum vel ſub forma fotus & ſanguiſug. Catell. & felium ſectorum applicatio. Gal pulv. uſtorum cancr. ol. rol. exceptum cum linteo applicat. Præſtans *Parai:* Lamina plumbea, hydrargyro obducta, quæ alexipharmacum eſt omnium ulcerum malignorum. Sed quia vapores detinet, *Foreſto* non probatur *Par l.6.* eam varie perforandam jubet. *Crato* ep. 59. Oculi cancrorum in marmore lævigati, ſumti cum juſculo vel vino plurimum poſſunt in maximis doloribus cancri.

Ægyptiacum cancroſis ulceribus lethale. *Fab. l.3. ob.* 86. Vetula curavit cancrum ſalivia dentibus maſticata appoſita. *For. l. c.*

CVRATIO Vlcerati fit per metallica. ung. de tutia, diapomphol. vel ſucc. ſolani depurat. & in mort. plumbeo piſt. pl. agitati ℥ viij tutiæ vulg. in aqua ſolani decies lotæ ʒ ij plumbi uſti & ſimiliter loti ʒ j ol. roſat. ℥ ß ſucc. ſolani q. ſ. fiat litus in mort.pl.piſt. pl. Nonnulli quotidie gallinam apponunt quam comedit cancer. *For. l c.* empl. de ceruſſa. Verè curatur vel ſectione vel uſtione vel med. adurentibus: ſi ſanguis fundatur laudabilis & ſanies, perfecta eſt curatio. vid. *Senn. l.c.* Nulla attrahentia aut digeſtiva proſunt, nec olea aut pinguia exceptis ſuccis, cera alba & ſæveo hircino. *For. l.* 28. Puſtula parva

Cambuca Paracelsi. Vid. Petr.

---

ol. L. Corij Horat. Hygeij.
fund. Pseudocrania Matthioli.
Empl. gisei Tab. c. f. Semperiv.
Liq. Verbasci.
fl. Genj coerul. pr. Schoenfeldij in Oe.
Lamina Oea: et
Jo. Veslingij.
Epipasma proli.

Nariam Cancer, curat immediate
deterget: ulc. nihil sperm.
tily, Lingij, vid. sus to.
Tinct. aloetica. Otto c. V
aristolod. genitan. Sardij, Vi
ctiae. Celidonie.
Vnth to, Nichiana Jonst.
Empl. Diach. Semeli; Diach. Rul
Mino, Christic. Colli.

Linct. Opiat. Gallenth c. Oil.
Bals. Tol.
oo Solani c. Oil volatil. mr.
Diacalcitros opiata in Oto.
Diapompholygos Saligniatis c. Oil vol. mr.

à externe, vl interne:
gle, cùj crassi, mult: ♂ acres.
ste prime, stabilis: genteeder
sis adusti, bilis rebonida.
mediate, sepatis fœtus, mensthus
Suppressio, licuis imbecillitas.
Imperium sese ♄ pitor latet.
Author facile cognoscit. Equibus
rata manifesta e: febris ostima
bunta a ♂.

De curare vid. VI. apha. XXXIIX.
vera & legitima rarò sentanda, ne
aliter ♃ (sinapia^: legitima e
stis κολλύλαξις: Vnde pallia,
lia da, quæ ♄ integer ost non
st, ♃ vbcunque tuto queunt.
V. S. ♀ menstruos suppressione. ste
monstris apha.

Bals. ♄.

Cautries [cruatura]
Cæ, ut morbi magni diuturni,
ut repentina multo sanguis nervosis
ex animi passione aliqua, aut cor-
pore affe.

Curatio: si à morbo chronico tempore cum
hoc & victu potus & cibus.
si ex animi passione, sterea cum ♂
cerebri roborantibus. ♀ lubrici ♂ stimu
lis contrariis ac ♀ quæ ventri ♄ externa ♀ migrantia
sunt adsta. vid. ap. Medic. Schrift
Phys. Med. R. part. II. sect. 1. c. 3.
vid. infra. p. 198.

Capitis distorsio.

parva cancrosa circa mentum, os, nasum, tarde crescens, *Noli me tangere* vocatur; Cancer in tibiis & cruribus *lupus* vocatur. *Senn. l.c.* Sanguis commodè per intervalla aliquando mittitur. Herba card. benedicti, exhibetur commodè magisterium oculorum cancri cum aqua persicariæ. *Senn. l.4. p. 3. s. 1. c.7.* Modum sectionis vid. ibidem. Quid cavendum vide de musculo pectorali in anatomicis. Feliciſſime apponitur gallina secta per medium & quotidie renovatur. Celebre est medic. Antonij Fuchsij Itali, quod vid. *ap. Sen. l.c.* Aq. præstans *Fab.* & plura alia vid. *ap. Senn l.c.*

CANCROSVS ficus. Ficus cancrosus.

CANIS rabidi morsus. Venenum.

CAPILLI. Pili.

CAPITIS dolor. Dolor capitis.

CAPITIS dolor in febribus. Febrium symptomata.

CAPITIS hydrops. Hydrocephalus.

CARBVNCVLVS. Anthrax.

CARNEA excrescentia. Vlcus.

CARTILAGINIS xiphoidis prolapsus. Procidentia cartilaginis xiphoidis.

CARVS est somnus profundus cum sensus & motus ablatione â spiritibus impeditis. Respiratio tamen manet libera.

CAVSA. Compressio Cranij & cerebri. Sic *Fern.* vidit quendam per 3. menses Caroticum, ita vt perforationis Cranij non me-

minerit. *Foreſtus* quendam curavit qui per dies 14. fuit Caroticus. Cerebri obſtructio, refrigeratio, concuſſio, motio, turbatio ſp. animalium ab ictu, lapſu, læſio muſculi temporalis & arteriarum carotidum, vis narcotica, Vermes, Vterus, Vapor carbonum. Radij Lunares.

S. *diagn.* Somnus profundus, puncti ſentiunt, ſe contrahunt, ſi febris adſit, ſequitur acceſſiones. Differt ab apoplexia & ſyncope ut ſupra. A Catoche: quod in caro oculi ſint clauſi, nec homo manet in eo ſtatu in quo fuit prehenſus. A Lethargo; quod lethargus ſemper eſt cum febre; carotici interrogati non reſpondent.

Progn. Carus febribus ſuperueniens lethalis.

CVRATIO: Si à cauſa 1. Curatur ut depreſſio cranij. Si à 2. ut apoplexia, cephalalgia pituitoſa. Si à 3. ut commotio cerebri. Si à 4. curatur pro ratione læſionis. Si à 5. Curatur alexipharmacis, ut venena. Excitari autem debent more vulgato. V. S. non convenit. præſtantius non datur quam eſus naſturtij vel cocti vel conditi in acetario. *For.*

CATALEPSIS. ægri manent rigidi in eodem ſtatu quo prehenſi fuerunt. Interdum tamen nonnihil audiunt, vident, recordantur & poſt narrant, ſi qnid ori ingeratur deglutiunt, impulſi incedunt. Milites

in

Cancer genitalium. Vd. Penis.

Multi gloriati se curasse apoplexiam, et tamen fuerit. Hist. Capivaccij R. lib. 1. c. XIIX.

---

* Casus S. Cupitus.

Vza cappima & amaracij succus in lotio, pro unij ad lenienda organa generationi.

Non e[st] ergo hippos.

Purgantia sunt melanagoga
Eneomata acriora.
Fictiones artis.
Ligaturæ.
Aqua diaphoretica.
Embrocha, Unctiones, Cataplasmata Cephalica.

Ex hac. di' 8 dyas to malu Greek
W Cucumber Ex hac ou, Hesy 9.
Example gute d gtte eredens.
W Humor Sc. Excrementitius: flemma
fitui: ofs d Serosa: epa ofs Sa:
Citri ofs.
Ex; interne; externe. Remote; &
cæ.

in obsidione Metensi hastam in manibus tenuerunt, equites turmam sequebantur non minus quam non congelati,

CAVSA est vapor congelans, figens è mineris terræ vel humore mel. elevatus, spiritus figens non qui jam in partes influxerunt sed qui imaginationi in cerebro subserviunt. aër frigidus vero non catochen sed sphacelum & stuporem inducit.

CVRATIO. 1. Excitandi. 2. Curatur ut cephal. melanch. Acetum Topicis non misceatur: figit enim & illud. V. S. concedi potest, si adsint indicantia. *Senn. For.*

CATAPHORA. Coma.

CATARACTA. Oculi vitia.

CATARRHVS est Symptoma in excretis sive generaliter sumatur, pro quovis defluxu, sive in specie pro defluxu in pulmones.

CAVSA Fluxionis nota est. Dolor tamen non trahit sed ob debilitatem partis discutere non valet. *Laur. de Catarr.* Humores sunt res nat. non n. & p. n. cerebrum frigidum, quod sæpè calidi catarrhi causa est cum pituitâ salsa in eo colligitur, & contra.

Diff. præcipua à termino à quo. Sic à liene oriri potest vel alio modo per consensum, in quo frustra medicam. capiti pleraque applicantur. Cum febre est vel sine.

S. *diagn.* Causæ sunt propria & per Syn-

dromen collecta, ut color, ſapor, motus, calor, dolor, mollities. Partis affectæ ſeu mittentis. Si à cerebro fiat, facilè, ſæpè diu & continuo affligit. Si intermiſſiones faciat, ſi adſint alterius partis affectæ indicia, ut alvus, menſes ſuppreſſi, ab alia parte fiunt.

CVRATIO. Si fiat per conſenſum pars illa primario reſpiciatur. Revellentia non trahunt à capite ſed revellunt à parte primario affecta. Cerebrum tamen roboretur. Si fiat per Idiopathiam cerebri, & cum impetu in pectus defluat, derivantia & ſiſtentia ex uſu ſunt. Si non, Cauſa. 1. eſt vacuanda per generalia & poſtea per topica. V. S. etiam in frigido Catarrho locum habet, ſi ſepar ſit Calidum. 2. Vacuato præparato humore caput ſiccandum per interna & Topica. Calidis autem cephalicis etiam in catarrho frigido commodè miſcetur conſerva roſarum, & revellendum per ſetacea, frictiones, cucurb. Gal. emplaſtrum è columbino ſtercore rec. per tres horas ne nimis exureret, capiti raſo imponit: mire enim calefacit, ſiccat. Granum unum thuris albiſſ. hora decubitus ſumtum, ſecretum. Decoctum ligni Guajaci, ſiccantes pulv. cephalici. *Senn. l.* 1. *p.* 1. *c.* 12. *Med. Pract.* Si catarrhus ſit calidus, eccoproticum detur. V. ſecetur, præparantia, purgantia exhibeantur, Topica, ſiccantia, roborantia dentur. Si periculum ſit ſuffocationis, omni ingenio revellendum per fimum

columb.

Catarrhus, hi sit ferus, e cerebro descendens, a rheumatismi vel mors gerit.

Ca: Rima pubis, hi oris; Sua, Scrutator, hi tenuior.

Can. S. M.

Hippocrat. c. Mag. Margarit. et Paras. rhead.

Praecipuus in medicis de intemperiis.

Odio suscepit in Coronat. Scheck. Jo. Scheck. Cons. 1. p. 4. cas. 5. ad or. ubi 5 principia lamiae cranii adustione nocentissima. Id. Scheck. de lambdoidis ossibus ad or. exclusive Cons. 1. p. 7. de sutura dentata. Cons. LXXV. p. 385.

Tobiae sutura.

Lues venerea interdum et generat acidum scalbroseq. l. dan. Horsch de Helmii Victorii cura.

Rheumatismus: expurgandi: Catharticis, et particularibus apostegma, Hiemalis, cardiaca, pharmacis, gargarismatis. #

Revellendo Cephalicis, pilulis, pediluvio, ligatura.

Derivando Cucurbitulis c. et s. Scarificatae, sinapismis, vesicatoriis, cauteriis, Sinapismis, Metasyncritica.

[# Empiricorum arcanum: die fleissige Apothek. Vid. Ephemer. curios. Germanor. obs. XXX. Cent. 1. p. 110. Jo. Mich. Fehrii.]

|| inprimis curing Renealy II. Ephes. part. 1. c. XXII.

|| Cinnabaris, Sarsaparill. Sassafras. c. Cephalicis: Alexipharmacis.

6 8 98

Rhapontici Diaphoretica Cardiaca antepileptica Paracelsi de Feb. quart.

Sacculi Stoici.

Embrocha Camphorata Cephalica.

Liniment. c. Aromatite.

Empl. Temulentum melancholicum.

Lij. V. c. Cephalico Agricolae. c. Betonica Dai, Cephalico Hofmanni. de Vitriolo Crollii.

Extr. Hepatis Hippocrat. antiscorbutic. ol. agarici Crollii Stahl.

Pulsus imbecillus philosophicus.

Oeconomicissima Myrepsicorum.

Turbith Cephalicus Coriandri.

Manna laudanum Hoffm.

Pil. Diabetica Magica Rutae Zobelii.

verfolig & Stto Seng.

Mitheilung Stahl.

Rabia trochisch. Styrax.

Diacodij solidus.

Tragacanth albi Hyeuthiensis.

Fab. è fo. Violar.

Rhoeados elisa. ē. F. O.

& h. Bugloss.

Catarrhus suffocativus Apoplexia
gener. Cap. 33 Dick.

V. S. Stahl in pleuritide.

Evemata acria

Pectoris artus. Cauterisatio.

Phoenigmi. Empla metasyncritica

Balsama Nuces unctae.

Linctus pectoralis. Vapoplectici.

Extra paroxysmum: Caput purgantia

Religua, ut alias!

Expectorantia: Oxymeli scillit.

Catarrhus Suffocativus (apoplexia
gener. Cap. 33 Dick.

V. S. Stahl in pleuritide.

Evemata acria

Pectoris artus. Cauterisatio.

Phoenigmi. Empla metasyncritica

Balsama Nuces unctae.

Linctus pectoralis. Vapoplectici.

Extra paroxysmum: Caput purgantia

Religua, ut alias!

Expectorantia: Oxymeli scillit.

---

oleia distinguenda ad affe

Hippoa. Χολγεικόν γ'

ch γ' graindi. D. H. Jaquer.

Externa: Cibi praui, facile cor-
ruptibiles, ut melones, pruna &c.
fica, uuæ putibiles V. Item
Ova barbon, lucios, & purgantia
Vomitoria violenta, & drastica
Systemata mobil.

columb. cauteria, clyſt. lot. ligat. fricſt. cucurb. veſicatoria, errhina, Topica & generalia. Siſtendum per interna, etiam per laudanum opiatum & narcotica. Diæta ſit ſicca. Cæna parca. Somnus parcus. Decubitus variat. Si catarrhum in capite detinere volumus caput jaceat ſupinum: ſi plus noceat in capite quam pectore caput altius locetur. *Laur. de Cat. For. Senn.*

CATARRHVS infantium. Infantium catarrhus.

CATOCHE. Catalepſis.

CEPHALÆA. Dolor capitis.

CEPHALALGIA. Dolor capitis.

CEREBRI concuſſio. Concuſſio cerebri.

CEREBRI inflammatio. Inflammatio cerebri.

CHEMOSIS. Oculi vitia.

CHOLERA humida eſt aſſidua & immoderata humoris pravi per ſuperiora & inferiora rejectio.

CAVSA eſt humor acris corruptus circa ventriculum & lienem, meſenterium, venas, reſtitans. Venenum ſumtum.

S. *diagn.* Febris abeſt, adeſt dolor, inflatio, vomitus, dejectio. *progn.* Intra 3. vel 4. dies interimit. Si intra horas 18. terminatur, ſalutaris ſæpe fuit.

CVRATIO. 1. Vomitus ſi parcior ſit eſt promovendus epota multa aqua tepida.

parca enim bilescit, decocto hord. non ex cortic. cum saccaro vel sir. ros. Sero caprill. vel vaccino cum sirupo ros. 2. Si vomitus sit immoderatus, [alvus est movenda.] Detur ergo serum lactis vel jusculum cum manna vel sir. ros. sol. Clystet molliens refrig. injiciatur cum diacathol. cass. Si alvi fluxus sit immoderatus, vomitus moveatur. 3. Si valde excedat excretio, revellentia utilia sunt, ut ligaturæ membrorum superiorum si vomitus; inferiorum si fluxus alvi excedat. Materia etiam temperanda per interna Topica. Præsentissimum remedium est Crystalli 3 ß vel per se vel aliis medicam. mixti. sæpe laud. opiat. dandum si Syncope metuatur. 4. Vires roborandæ per interna & Topica.

CHOLERA Sicca est spiritus flatuosi per superiora & inferiora excretio cum inflatione ventris & strepitu, dolore laterum & lumborum.

CAUSA est ventriculi imbecillitas quæ flatus generat, vel humor lentus, tenax, cum calore ventric. intestinorum satis forti; qui humorem in flatum resolvit vel cibus flatulentus.

S. *progn.* Tam periculosa non est quam humida.

CURATIO. 1. Flatus educendi, discutiendi, temperandi clyst. ex oleo dulci vel sem. lini amygd. d. cum decocto moll. & carminativo: per Topica item. Exhibendum oleum,

Glossis. Vid. mah Virgines. I.
Febris alba. f. 81.

S. M. Statis initio. D. St. Jacques.
H. Enemata anodyna d'ufus.
Syp. Lenter. c. ℔ Coralli. d'Hazard.

Vomitus ex Statis Sistendus, Actis
seb. III. Sect. I. c. XII.

+ Caute, ne dejectio semel facta vomitu ejiendi det, is loc. affi. Dandi ejus, Vomitus Empesan vid. infra.

Enemata aperiendo comoda.
Pituanthia leniora d'benignora
tis Vomitus, & Diversioni de,
Pituanta. Vid. Seb. Sect. Affl. ac fundi. Syp. fe. ffic. de
Humos acrimonia ofempenda. cibor. c Galanb. Mel ros
Stomachica roborantia, & vid. Sol. Stib. Lem. Absol.
Seb. Vires reficientia. Flor Cassiæ

Cicatrices.

Pulsus ovij.
Peripneumonia.
Hydropis pessi.

Ol. myrtil c. adipe ofinino.
Lac Virginale.
Vesp. Citrin. Nic.

Coeliaca. Vid. Lienteria.
Gradibus v. Tabes differunt.

Coctionis S. Chylosos lactis.
Pulsus non differt à Readvertentia
& Atrophia. Externis v. nitè
Comparatis & motus & rectifi-
cae fermenti Stomachi vertit.

Cibiorum vitia. Vid. Cosmetica.

oleum, vinum, nisi quid obstet. 2. Materia vacuanda per syr. ros. sol. temperanda juscu-lis. Si à veneno, curatur alexipharmacis.

CHORDAPSVS. Ileus.

CIRSOCELE. Hernia varicosa.

CLAVVS. Dolor capitis.

CLAVVS. Verruca.

COLICA in genere est dolor intesti-norum vehemens, vagus.

CAVSA. 1. est flatus vel à caloris debi-litate vel calore forti & pituita viscida vel ex humore mel. flatulento ortus vel cibis flat.

2. Fæces induratæ, calculus, vermes, her-nia quæ omnia continuum solvendo dolo-rem faciunt.

3. flatus vel humores inter duas tunicas collecti.

S. *diagn.* Differt à dolore ventriculi. Semper enim dolor ventriculi supra umbili-cum subsistit & sæpe ad spinam inter scapulas pertingit cum ad nonam vertebram ventri-culus spinæ alligetur, levatur ructibus. Dif-fert à dolore uteri quod dolor uteri inguini-bus & coxis communicatur & supra ilia non adscendit, præcessit partus, menses suppri-muntur.

Progn. [Colica sæpe sequitur icterum ex obstructione meatus cholidochi factum prout icterus sæpe sequitur colicam ob cau-sam eandem.]

Si diu duret hydropem facit, herniam, ru-pturam umbilici.

CVRATIO. 1. Causa est tollenda. 2. dolor.

Dolor tollitur internis & topicis mollientibus, balneo. Imo narcoticis si causa sit ~~calida~~ valida. Si vero sit frigida causam morbificam deteriorem reddunt & paulo post dolores majores revertuntur. Raro per os exhibenda. Tutius per clysteres injiciuntur ut Phylonij Romani ℈ j. *For.* Laudan. opiat. ad gr. iij. Appropriata sunt stercus lupi albiss. ad ʒ j. etiam foris appensum. Intestinum lupi ad ʒ j. cum liquore. Alaudæ assæ pulvis. C C ʒ j. in potu, intestina gallinæ tosta ad ʒ j. ʒ ß. pulv. Testicul. equi vino lotorum & siccatorum in furno. Durante dolore nihil est edendum.

COLICA è fecibus, flatu.

S. *diagn.* Alui suppressio præcessit cum alvi pondere, dolore, cephalalgia, palpabili duritie.

CVRATIO. 1. Clysteres injiciantur mollientes, lenientes, ac sensim fortia purgantia miscenda, donec excernantur feces: si non operentur, leniens per os exhibeatur ut mannæ ʒ j ß. ol. amygd. d. ʒ ij. cum jure gallinæ. Vtile est oleum galbani, empl. è baccis laur. extra applicata. Vltimum remedium est follis Hippocratis, quo intestina ita inflantur ut à stercoribus internis superficie sua separentur, post clyster immittitur.

Si à vermibus, curatur ut vermes.

Si ab

Specifica: Astragali porcini
Salep leporini
Grana Cucacanthina
Bacce Lauri
Vim Pertheniatis.

Specifica Frigaria.

Cedria cal. bibita, & pariter lecta, vas, unctu, ejecta, & in die bibi tuis, tacta, & gustatum lethales sepe terunt unctu: aranda e stemperantia, & mitigantibus aviumonia, bibi, per cretha deglutata: attractia mitiora:
Enemata lactis Caprina Jac. Octhij.

Emollientia, discutientia, lenientia, vermes necantia, sedativa: dispentia, vid. sup. tit.

Diacydonium Malvatico. ℞.
Theriaca Otata Gesneri.
Mumata.
Globuli ex Rosis.
Species Basilicae Hermodactylicae.

Enemata ex Solis gallis Castoreatis
Adolphi Decoris expunto.
ex ol. Castorei opiato Crocato c.
Croco Crocatis. ℞.

Ol. Saving. & Gm. expunto Lauri.

Ol. Lebetid. i.
Cinnamomi Zgeodermatis.
Jusculum Pp.

Jusculum Pharmacopolarum vini.
Petri Vandenzigen. Med. Lug.
Κεκρυφαλος.

Sagapeni ex mitio, Caro, Gummi d. Oc. Pp. ex S. Canabis tosto.
Enecathismata artemisiae, pastilli, melichrantes, pulegii, salvici &c.
Epemplia Antidotaria
Cataplasma pultis avenacee e lacte Pp.
Opiates Cp calidissime fervi Pp, admoti.

Pp. d. cal. discutientes.
apoplectica.
Elixir vitae M.
Pp. 2: Cocs Helmontij.
Pp. Pp. Cocs Helmontij.
Pp. Pp. Cocs Helmontij.
Pp. Pp.

Si ab hernia ut hernia.

Cucurbitulæ umbilico applicatæ incantamenti instar curarunt. Constringenda est alvus latis fasciis.

Seq. clyster miraculo profuit. ℞. Vini malvat. ol. nucum (quod & *For.* commendat) ana ʒ iij. aq. vitæ ʒ j. ol. junip. & rutæ ana ʒ iij. injiciantur calide.

COLICA à causa inter tunicas.

S. *diagn.* Dolor acutissimus instar pali fixus est.

CVRATIO: clysteres injiciantur mollientes carminativi: omni studio caveatur vomitus, post clysteres fiant acriores. Solutiva carminativa ~~ut allium~~ per os exhibeantur. Externa utilia sunt.

Si fiat ab humore acri scorbutico in venis & tunicis intestinorum hærente, curatur refrig. humect. internis, Topicis vacuantibus bilem, &c. ut dysenteria.

Si ab inflammatione intestinorum curatur ut inflamm.

QVÆSTIO: An clysteres purgantes conveniant? N. quia trahunt ad partem affectam nec vacuantur: alvus enim suppressa est. Sen. For. Pareus.

COLORATIO capillorum. Pili.

COLVMELLÆ inflammatio. Inflammatio gurgulionis.

COMA somnolentum est actio imminuta à spirituum influxu prohibito.

CAVSA: vis narcotica, obstructio cerebri, vermes, uterus, compressio cranij.

S. diagn. æger diu & profundè dormit, hiante ore.

Diff. à caro: quod in Comate interrogati respondent: à syncope pulsu & facies in comate non est mortuo similis.

Progn. aph. 1. s. 2. 3. s. 2. in febb. continuis exitiale est. Minus periculosum quod per consensum fit.

CVRATIO. Excitetur, vacuetur, revellatur, derivetur causa: siccetur, roboretur cerebrum.

Si per consensum fiat, pars primario laborans curetur.

COMA Vigil. Est cum ægri clausis oculis frustra dormire tentant vel sine delirio vel cum delirio. Sic Comaticus apud Heurnium Monacho custodi caput abscidit cum dormiret.

CAVSA Vapor narcoticus sed simul turbans vel cum vapore calido somnum turbante.

S. Progn. In Lethargum vel phrenitidem mutari solet.

CVRATIO: Cum semper ferè ingruat cum febre maligna præter ejus curationem malignitas & venenum impugnandum, revellendum, roborandum, &c.

COMBVSTA. Diff. vel calor saltem in parte sentitur vel vesiculæ tantum excitan-

Progn.

Ol. S. Cameliæ c. Cerasorum.
Ol. ℞.

Progn. A fulmine plerumque lethalis. In abdomine difficulter curantur; profundiores eſcharæ minus ſunt dolorificæ.

CVRATIO. 1. Empyreuma ſeu atomi ignis evocentur. Quod fit calidis. Si levis ſit combuſtio citiſſimè pars igni admoveatur vel aq. calida foveatur, mox cæpæ in mortario tuſæ cum ſale applicentur. Vel ℞ cæp. crud. ʒ j ß ſalis, ſap. Veneti ana ʒ ß m. in mortario, affund. ol. roſ. & amygd. d. q. ſ. *Fab.* obſ. 93. Cent. 4. fimus eq. rec. Salv. ebul. Sambuc. fol. cum ſale & oleo nucum trita. Calx viva novies lota cum aq. malv. & butyro. Ol. lini. ſuc. cæpar. butyr. majal. ſuc. ſambuc. pingued. por. Camphor. ol. oliv. Calx ſic lota miſcetur cum oleo hyperic. ſuc. aliquo, cremore lactis. ℞. lardi conciſi ℔ j liquefiat in aq. roſ. Coletur per rarum linteum. lavetur quater aq. hyoſca. vel plantag. vitell. ovi rec. III. miſc. ung. in ambuſtis ita ſint facta ut non tenaciter adhæreant ſed facilè abſtergi poſſint.

Si veſiculæ ſint excitatæ ante tertium non ſunt aperiendæ nec poſt, ſed circa tertium aperiantur. Si vero combuſtio in tertia ſit differentia, omnes puſtulæ ſunt incidendæ, eſchara tollenda mollientibus, vel ſi major ſit ſcarificatu profundo ad vivum uſque, ut mollientibus detur aditus & fuligines tranſpirare queant, vel ſcalpello removeatur, ſupra partem defenſivum ponatur. Si gan-

græna immineat ei occurrendum. *Par. l.* XI. Vng. alabastr. præstans est ad cicatricem inducendam.

Combustio à pulvere pyrio fœdum colorem relinquit cum granulis, quæ nec scarif. nec cucurbit. nec vesicat. sæpe evocari queunt.

Combustio à fulmine curatur per interna cardiaca & Topicis è fol. rutæ, cœpis, theriaca, &c Topica omnia fiant ex alexipharmacis. Si os simul fractum sit, vulgaria glutinantia venenum detinent, &c. medicam. è rad. angel. vincetox. fol. rutæ & appone. defensivum etiam.

Comb. oculorum. Lac tepicum instill. Forestus filium curavit emuls. sem. cydon. facta cum aqua rosæ. Vtilia sunt reliqua mollientia.

Comb. articulorum acria non fert sed mollientia præmissis generalibus.

CONCVSSIO cerebri fit à causa externa. Sic Hipp. ab alapa quandam mortuam narrat.

Signa sunt vomitus ut in fractura cranii.

Progn. Si sanguis inter tenuem & duram matrem effundatur desperatum est.

CVRATIO Fit revellentibus, repellentibus. ut V. S. in cubito, clyster injiciatur, Catapl. repellens injiciatur è far. hord. ʒ vj. ol. ros. ʒ iij. aceti q. s. cujus usus est ad 4. diem. Cucurb. scapulis affixæ, seq. die

vena

Comoño Cecchi, cade e, nel salto
grado tutto di Sempst.

Emplex Diasseleos.
Diat
Quinquatuat. Silenfis.

vena puppis quæ ſupra lambdoidalem eſt ſecetur, altero die V. frontis ſub lingua, a 4. reſolventibus eſt utendum ut Cerato Vigonis vel ung. Alabaſt. empl. è gum. hederæ. vltimum remed. apertio cranij etiam poſt ſecundum menſem. *Fab. cent.* 4. *obſ.* 2. *Par. l.* 9. *Sen. l.* 1 *p.* 1. *c.* 20.

CONDYLOMA. Verruca.

CONTVSIO cum ecchymoſi eſt cum ſanguis è vaſis ſeu tenſione ſeu ruptione exprimitur.

CVRATIO Sanguis extravaſatus vacuatur vel modo ſpectabili ut V. S. cucurb. ſcarif. hirud. modo continua & vehemens febris ægrum non habeat : vel reſolventibus internis & ſudoriferis balneis, diæta tenui. ſic V. S. utitur Gal. licet plethora non adſit: mox exhibet ʒ jv. oxycràti

Topica primo ſint repell. poſt reſolventia, ut ung. alab. quod ſemper competit excepto febris principio.

Si gangræna immineat, quod ex duritie tumoris (mollis enim ſi ſit, parva eſt contuſio) & livore colligitur, potenter eſt reſolvendum ſacculo toſto &c. vel ſcarificetur vel apperiatur cultello, curetur ut gangræna. efficax eſt rad. ſigill. Salom. contuſa appoſ. rec. vel vino macerata. Si ſit cum vulnere, primo adſtringens applica, poſt digeſtivum partibus vicinis ſuppurans. *Par. l.* 11. alias ſuppurans locum non habet in parte affecta.

Si in infantibus, Cæsar Arantius sectione olim usus est, qua ob clamorem, dolorem, infantes in summum periculum deduxit. Post oculatior factus per diem nat. primo omnium linteum ovi alb. & acet. ros. imbutum apponit sæpe madefaciendum. post ad diem nonum usque cataplasma è fl. ros. rub. fol. & bacc. myrti ana ʒ ij far. fab. hord. ana ʒ j. absint. beton. ana ʒ ß. sem. cum. Vino nigro. Fiat cataplasm. adde ol. ros. chamæmyl. ana ʒ j. Tantum eis appone ut vicinas etiam partes complectatur. post decimum diem empl. diapalm. seu diachalcit. apponit *Sen. li. pit. c. 21. & de Tumoribus.*

CONTVSIO Cum fractione cranij seu vulnere.

Si sanguinis copia sit effusa inter cranium & membranas, quod scitur ex effusione sanguinis per nares, aures, capitis gravitate, stupore, sopore.

Si os sit depressum & cerebrum premat, quod digitis exploratur.

Si cranij particulæ meninges pungant, quod cognoscitur si dum æger nasum emungit punctura sentiat, vel delirium adsit. cranium est aperiendum vel elevandum.

Si vero horum nihil adsit, præmissa V. S. & cholagogis curatur empl. è gum. hederæ. Sic Foresius quondam solo oleo hyperici curavit. Vidus Vidius, Lanfrancus sæpius & tutius medicam. quam trepano curari aiunt.

CON-

Quid ergò? nervos lacertosque Lunæ vel vapor, quæ manifesta, quæ occulta gerit.

CONTVSIO cum effluxu ſanguinis per & in ſuperiora.

Cum in hoc caſu 4. ſint in metu. 1. ne ſanguis nimis effluat. 2. ne ſuffocet. 3. ne concreſcat. 4. ne putreſcat : cumque concretio reſolventia, ruptura ſolidantia indicet, ei occurrendum quod magis urget. Ergo à V. S. cum jam ſanguis rarius ejicitur cumque non amplius tam floridus apparet, exhibe reſolvens ut poſcam dilutam vel medicam. è coagul. lepor. hædi, caryophyllat. artemiſ. rub. Caul. rub. beton. rhabarb. rhapontic. terra ſigill. Sperma ceti, oculi cancri. C C. corall. præp. bol. arm. aq. chæref. card. Mar. decoct. fl. bellidis minoris, hyper. fumar. ſcabios. rad. angel. Vincetox. ſem. card. ben. rub. tinctor. Mumia inutilis eſt ; vomitum enim movet. &c. *Par.* l. XI. poſtea omni ope glutinandum ut in hæmoptyſi. Succinum. Si dolor fiat ventris à ſanguine concreto, expurgetur per Rhabarb. &c.

Si tuſſis ſuſpendatur Catarrh.

CONVOLVVLVS. Ileus.

CONVVLSIO eſt motus muſculorum depravatus.

CAVSA non eſt inanitio quia fit ab elleboro : quia in hecticis & febb. ardentibus rarò fit ; nec repletio : quia in plethora non fit, nec elleborus replet. #

Subj. Eſt muſculus, ejus potiſſimum partes nervoſæ & fibroſæ, cum eorum expultrix-

irritatur, ob quam facultas animalis in consensum trahitur, ut in vomitu, tussi, &c. Si firmiter parti adhæreat, fit convulsio, si vero vapor vel materia mobilis, fit motus convulsivus. Si unus vel vnius generis musculus afficiatur ut flectentes, fit convulsio: Si vero duo antagonistæ fit motus convulsivus. In convulsivo motu cerebrum simul afficitur, in convulsione rarò. Si à vulnere fiat convulsio, fit ab acredine saniei. Cum partes ultra tonum contrahuntur, dislocantur, distorquentur, ut extendi denuo non possint.

Progn. In aphorism. Hipp. Convulsio subito orta alvi fluxu vel febre supervenient-te, solvitur. 4. diem si effugiant, sanantur.

CVRATIO. Si per consensum pars primario laborans curetur. Si per essentiam V. S. est utilis vel cucurb. scarif. Si crura sint convulsa coxis, si manus primæ thoracis vertebræ; si lingua, palpebra primis cervicis vertebris apponantur. Purgatio, frictiones, clysteres acres, inunctiones spinæ locum habent. Topica sint resolventia incipiendo à mitioribus. ol. chamæmyl. aneth. &c. pinguedo anseris. &c. ‖ Interna sint ut in paralysi. † Os convulsum nullo modo instrumento est aperiendum.

Si à vulnere, sanies detergatur, phlegmone sanetur.

Si ab esu fungorum, Galenus stercus gallinarum cum oxymel. exhibet magno secreto.

Vid. fungorum usus. Ani-

Vapor ad mentem Herodoti Pulsometij Galen. l. simpl. c. XXVII. nec exclusis Johann. Guil. Baleus l. 4 quæst. Vid. de particulis elasticis, nuper conclusis, H. Willisij l. 1 affect. cerebri.

Sessus Universalis et particularis. Ille ἐν πᾶσι καὶ ὁλόνους, ὁ καὶ ὁλόνους, ὁ ἐν ὅλοις. Particularis, diversarum partium, et cui hic finem, ut sessus genus.

Cum Vis: vera: Spuria S. mob. quibus ejus sessus non extenditur, vel ad alium se habere dicit, certis immaterialis Ebusiæ.

Quærenda sensus Universalia. primus Visus Distantia, Numerus Figura sibi subjecta. Tactus. Specifica sensuum Pari: Bals. Hactenus opus.

Cavendo à nimis calefacientibus et siccantibus, ne tendines indurent. Fomenta, oleosa, Linimenta. Aqua antispastica. Herbæ. Balnea arte parata.

Specifica: Bals. Manuale P: Castoreum. Judicium cerebri. V Card. Epithymi c. bino. S. Vini Hyperici. Unicorni abietini amberati. Syr. e pomis Pandecti Jacobæi. Mag. Jacobæi Syr. millefolii c. Mag. Vipeli aloes. Moschatum elect. Caballinum. P. Cinnamomi Nutmegatis. Vfl. Jacobæi. nigri. Li. Card. Jacobæi.

Capitis pandiculatio. Cyll. Aretæ.
tinet ad τὰ ἐπιληπτικὰ
Hippocratis II. aph. XLV.

Cura cadens, & epilepsiæ
vertigini.

Sc. Card. Indich danach c. Venich.
Arcanum Harmalæ Arabis.
Ol. Cinnamomi theriacale.
Conf. anthos & arcanum Androcacis.
Mag. Alcanetis.
Emuls. S. Nasi Coralina.
Mag. Ebur.
Rhinocerotis.
Monocerotis.
Cj.
Succini.
Species Diatessaron.
℞ Mygalosphyn.
Ol. anisi N.

Erebinthus tam rectificata.

Methagyreticus Martialis.
Epispasticus Monspelienses Rueyi.

Potus Visci q. expugiat.
Hydrosaccharum Cardamomisat.

Pediculi Vitacea.
Omphalocrisma ex pinge oleis.
Trachelochrisis c. ol. Juniperi.

Coryfa. Catenulæ ſpec. deſcriptio ſe
d varias ſui mori cruci
Pars adſa cerebri ſentiens, vertici cubi
ypi e anteriores, d or Rhinoides.
Fi olfactus ſimul ledat, et ſocios
quam illæq.
a, fit. et ſpiritus animales: ab interna
frigida. Externa commoveat,
frigus, calor ligneus.
ſpontaneus affectus flexuum
Abſentia adjunctorum, ſimi
tia, abſorbentia.
Vapor ſi noſ.
Vfoemiculi rhodoſacchara c. ſ. v. Beta balaustia, planta. &c.
Salvia, majoran. Lavend. &c
Suffitus.
Odoramenta ex unguella, ſulphio.
Exhalationes variæ ab humore ſalſo to
lendæ limentis formati. Lithargyri.
ſtitis, et ſo, Vfol. quercus ſplen
dens. noſ. alchymiſtæ.

A nimiis siccantibus indurati nervi, sæpè curari non possunt.

CORDIS palpitatio. Palpitatio cordis.

CORNEÆ pustulæ. Pustula.

CRANII fractura cum contusione Contusio cum fractione cranij seu vulnere.

CRANII fractura. Fractura cranij cum vulnere.

CRISES. Imperfectæ, materia nondum cocta, tamen bonæ. Vidit *For.* sæpè repetita crisi, tamen ægros evasisse. Sic ab apoplexia paralysis, à lethargo parotides bonum.

Fern. l.2. c.1. statuit crises utiles non fieri per hæmorrhagiam, 1. quia semper sanguis ruber floridus affluit.

2. Quia radicem morbi non revellit citra enormen fluxum. vid. aph. 25. s.4. Respond. Zac. l.1. hist. 64. quod ruber ille sanguis apparet, quia guttatim exstillat; unde calor ejus ab aëre ambiente tollitur; iccirco frigus heterogenea ab bonis separari non patitur: unde sanguis manet ruber. In cubito confertim effluit: unde manente calore crassæ à bonis separantur.

CRISPATIO capillorum. Pili.

CRISTA. Verruca.

CRVRIS fractura. Fractura cruris cum vulnere.

CRVSTA lactea. Sahafati.

DENTIVM caries & nigredo fit à nimis calidis, frigidis, dulcibus, acidis, fucis ex hydrargyro; &c.

Præſerv. Si à cibo os vino eluatur, & dentibus maſtiche, cyperus imponatur.

CVRATIO. Si quis omni mane gr. ſalis ſub lingua contineat, & eo liquato dentes fricet. Sp. & ol. vitrioli aq. permixtum dentes reddit albiſſimos. Pumex ignitus bis vino albo extinctus & tertio ignitus relictus, donec refrig. tritus & lotus albiſſ. facit dentes, etiam non ignitus. *For. l.*14.

Quidam ſolo pane toſto utuntur. *Par. l.*16.

Oſſa ſepiæ, C C. cinam. corall. oculi cancri, teſt. ovor. cochl. mandib. lucij piſc. maſtich. rad. ariſtol. rad. ireos, roſmar. fl. lavend. roſ. arena alba ſubtiliſſ. alij ſolo melle roſat. cum oleo vitriol. utuntur. Cinis ſtirpium roriſm. Cinis Nicotianæ.

DENTES Ferro avelluntur vel ob dolorem ſummum, vel cariem, quæ animam olidam reddit, vel ſi ſe extra ordinem ſuum profert. Summa manus moderatione opus eſt, ne maxilla loco moveatur, frangatur cum alveolo, unde hæmorrhagia vel os obtortum ſemper maneat: ne ſanus pro ægro evellatur. Exemto dente ſanguis liberaliter fluat, os oxycrato proluatur, ventus fugiatur. [Vt dentes ſine violentia euelli poſſint, gummi hederæ imponatur vel radix cucumeris agreſtis in aceto macerata per triduum, ſemen hyoſcyami, vel radix ejuſdem aſſata radici dentis calida applicata.] Sed vicini dentes non tangantur, os apertum ſervetur ut ſa-

liua.

Cynanche. vid. Angina.

His detergentibus & siccantibus addunt
sternutatoria & adstringentia, accedo,
rata. Coll. Ch. Cad., Cary op. li.,
L. Rhod., Sauval. Benjam. Amb.,
Thoseby, &c.

Ab exandisque molez attrita ap.
Hippoc. l. 7 Simon.
Alvi ollutiones frigidiores
Vomitus diuturni cachexiæ hypochondri
acæ.
Amygdalæ, uvæ faucium, glyc. cynosbi
olei olivæ. adstring.
Glycyrrhizæ
hepaticæ.

[Ho Carolo Piso felicissime
purgante bolo et (assa) diaphoe
nic. Zi. mj.
vid. Hens et adonalgiam.

liva effluat, nihil deglutiatur.

DENTIVM ſtuppor. Cauſa eſt ſapor acidus.

CVRATIO. Portul. masticata, ſuccus ejus prodeſt. amygd. am. avell. jugl. maſtic. rad. ſicc. glycyrrh. Vinum. Sal.

DENTIVM dolor. Fit vel à cauſa frigida vel calida vel vermibus in dente. Affluit ſerum illud vel à capite vel ab alia parte.

S. *Progn.* à dolore tumor bonum.

CVRATIO. Cauſa vacuanda, revellenda, derivanda, omni ingenio: ſecari poteſt vena pone aurem, per veſicatoria, &c. frontí, tempor. adſtringens applicetur. Topica in cauſa calida. aq. roſ. cum tertia parte aceti, ſucc. plantag. ſempervivi, lactuc. acet roſ. &c. *Rul.* aq. Solani cum aqua vitrioli utitur.

Si gingivæ ſimul ſint affectæ acetum ob acrimoniam vitandum. ~~ungu. alabaſt.~~ *Senn.* Radix lapathi acuti in taleolas conciſa & denti dolenti impoſita mire auxiliatur, decoctum item fol. lappæ. *Fer. Paræus* tribus graviſſ. dolores dentium à cauſa calida curavit. 1. appoſitis ſanguiſugis, gingivis tumentibus leniter ſcarificatis. 2. phlebotomia ſub lingua. 3. earum quæ pone aures ſunt.

Si à cauſa frigida. Allium ſub cineribus coctum dolenti denti impoſitum.

Aq. vitæ. piper. Gum. Iunip. ʒß Vini rhen.

℥ viij. coque, cola. colatura calide in ore detineatur. ol. cal. junip. & fumus Nicotianæ, ſæpe expertum à *Senn.*

℞. Rad. filicis. pentaphyll. ana ʒ iij. biſtort. ʒ ij. fol. rut. Salv. beton. fl. roſ. rub. ana m. ß. coq. in vini rubri & aq. ſ. ana q. ſ. pro collutione à quavis cauſa. Vltima ſunt narcotica. *Rul.* ol. camph. vel ligni Heraclij guttas aliquot apponit cum goſſypio.

Vltimum vel ferri candentis ad rad. ima depreſſio vel narcotica vel extractio: præmittatur tamen lac tithymali thuris & amyli polline exceptum vel tangatur aq. diſtillata è ſale ammoniaco.

Graviſſimos dolores dentium videmus ſimulac evomuit aliquis tolli. *Crato ep.* 182.

DENTIVM vacillatio vel fit à nimia humiditate [vel lue venerea vel inunctione hydrargyrica, vel à ſcorbuto.]

CVRATIO. Si ab humidis, præmiſſis ſiccantibus generalibus, Topica ſint calida adſtringentia: ſed omittenda quæ dentes denigrant ut corr. granat. balauſt. gall. vitriol. [adligationem per filum aureum ſæpe ſequitur inflammatio.]

DENTITIO infantum ſub menſem ſeptimum fit.

CVRATIO. Nutrix curetur ac ſi febriciter. Ori infantis actu frigida non ingerenda, omni ingenio gingiva mollienda ut baculo glycyrr. ol. amygd. d. adeps gall. butyr.

Fox.

+ Mucer. ☉ Bupleu. Val:
+ fl. prim-veris.

Ol. Lauri. ℔B.
Bals. ad. Hofgaum d Guaglass. ℥ oggorato.

Dolor à corrosione dentium: pars modi
Nucis tosta & cal. applicata:
expulsis Marcelli Cum:

Del. à Rheumatismo strumoso. V. S. frigum.
Opium. em. c. Diacodio.

Maria Glycubadus.
Cera Cameleontica pista.

Radd. tormentill. pentaphyll. plantag.
bistorta. H. centinod. cupurid. fol.
picea. myrti, lentisci, fl. rof. bacc.
myrti, Nuc. Cupress. Rasped. Fur.
Santal. rubr. Boly Armen. Coral.

Diff. ꝑpriè d impriè dicty.
Hic à cæterà: Hæmaz
stis, vix tenuis copiosa: cibis
sallis ꝑpatis, minùs diure
tica ꝙ. Hs Cichorij ꝙ febr.
ò Hydrope. Hic sonchi fer,
uelis à cal. remq; intempiè ſ.
simpl. sive intus, à robore
attractricis, d imbecillitate
retentricis. Addit a. recte
et ꝙ alijs partibus dysenteriæ
ocurrere, ꝙ colligatos d
resolutionem indicit, hq. ſc.
bene, Hoc vehementi gubæ.

ydropis ad materiam.
dysenteria. dia[illegible] cum ꝙs dy
senteriæ comparatis à gal.
VI. loc. affect. III. ab aliis ꝙ
ptis fauci carieq. Rarius affi
cit aſa: renes: d ex parte ꝙ
vesica.
Curatio vacuantia per ſet.
Cura acris temperata.
Gamaroz flow. Cichoreus c. sue
Sacharo. t. Heffer. obſ. XXXVII
ouj. ad. nuc. c. Eſſ. croc. ℈ß
c. vesicæ capillæ.
Vfol. fragin
cat. ad. fil. c. ꝙ.
Hq. Balsamitæ.
Hypogastrium et Epigastrium cū
initio coxæ c. Vinde.
Hq plantag. ℈ß Vfarm. ꝑ Balneo.

For. cerebellum leporis cum melle terit, quo gingivas fricet: cerebellum pullorum avium. Commendatur & succus è cancris vivis contusis cum aq. fl. cyami extractus si gingivæ eo abluantur. *Par. l.*23. *c.*67. scalpello gingivas aperuit. Dens dexter caninus lupi appendi solet cum catena argentea.

DIABETES. Causa renum retentrix læsa vel ab urinæ copia vel qualitate. Copia urinæ fit à calore hepatis, lienis, serum liquante, imbecillitate ventriculi, viarum laxitate; fit potissimum in febb. ardentibus & malignis.

S. diagn. ~~Sensim incipit ut vix agnosci possit,~~ in visceribus ardor concipitur.

Progn. ad Tabem & mortem deducit, nisi in principio curetur.

CVRATIO. V. S. purgatio. Vomitus. sudorif. non conveniunt. Sed per interna & Topica adstringendum, roborandum per ea quæ moderatè refrigerant: possunt & narcotica adhiberi.

DIARRHOEA est alvi fluxus ab humoribus excrementitiis facta.

CAVSA est vel obstructio Venarum hepatis, vel hepatis debilitas, vel totius dispositio p. n. cum febre vel sine febre, vel feb. hectica, ardens, phthisis, inflamm. viscerum, unde fluxus Synthecticus s. colliquativus: vel cibus corruptus, vel vermes, vel hepar & bilis, vel lien & humor melancholicus, vel ute-

rus vel cerebrum", vel hypercatharsis, vel dentitio infantum.

S. *diagn.* Obstructionis, debilitatis epatis signa vide.

Si à corrupto cibo, præcessit cibus ejusmodi vel ventriculus est debilis. Si ab hepate, liene, illorum læsorum adsunt indicia absunt signa alius partis læsæ.

Progn. Alvum fluere uno die vel etiam pluribus pro valetudine est, si modo febris absit & intra septimum diem conquiescat.

CVRATIO. Si ab obstructione fiat, primo per hepatica aperiendum, post detergendum, tandem cōnstringendum, roborandum.

Si ab humore acri, cibo corrupto, primo est detergendum & humoris acrimonia tollenda ut ℞. decoct. hord. non excort. ʒ iij sir. ros. ʒ j viol. ʒ ß. Vena secari potest. Deinde leniter vacuandum per clysteres, pot. pil. è rhabarb. myrob. mastiche, è quibus fiant pilulæ quæ in omni fluxu tuto dantur.

℞ myrob. citrin. chebul. ana 3 ß. mastich. ∋ j spic. gr. 6. cum mell. ros. f. pil. cape pro prima 3 ß. post ∋ j. Non nisi vacuata majore parte materiæ, & si vires multum dejiciantur, in duobus his casibus adstringendum, quod intra 8. & 12. dies fit, primo per topica & alimenta, postea per interna & derivationes omnes, V. S. ligationes, fluxus tollatur.

Si

Delirium. vid. febr. Symptom.
— Delirii refert Hofmannus ab Arnoldo Heidanio, ejus
discipulo, Amentiæ S. Insaniæ: aut Melancholiæ.

Recommendatur inter diuretica et Gal.
Epist. 11. diff. febr. 11. de cur. rubef.
p. m. 11x. et 11. de Glauc. 11. pro
hoc cap. Aegrotum vide morbosum
depingit ad vivum et intestina.

Nimis absinthij in epotis diuretica
et dysuria, curata Jessæo et
Stahl. c. Jacobæo H. Rumley
Obs. XL.

Non efficax, nec validioribus adhæ-
rens, de per ἐπίκρατα W.
Manna, assa, tamarind., Sena,
Syr. ros. Sol.
Diæta bona.
Abstinentia absinthij cardiaca.
et pro Vinum de Quinquina. Hr.

Gravidis Gonorrhœa fœtus roborantia.

Fa. Stetices rosata.
Tyrbetinæ Valer. Valer. Exebrar
Fa. Sacrej. Ph. Cran. VII.

Fa. d'Eff. Leuckf Oata.
Fa. Glyciorrhiza Equisetifolia.
Fa. Croj.
Mag. Coral.
Fa. S
Mag. Hyacinthi.
Dy Diaphoret. D. Myrrh.
Extr. Helenacios.
Cassura Kerfata d Darfinata.

Debilitas facilitanda, gingivæ oleo amygdal. dulcis, et butyro rec.
#Stomachica: Ol. Mastichini.
Ol. Calam. arom. menthæ Cydonior.
N M.

#Differentia quæ loq. Vulgo per tot spes Cephalitis: Cephalalgia, Cephalæa, et Hemicrania. Quæ dolorifica, cui pleuritis per, paraphrenitis, frenetis &c. de qb vide Dorig Cons R. Sect. 1. lib. 1. c. 6. d Exercit. ea de Vena Medianj.

Ea vel externa vel interna. Hæc humor vel solidi. Illa evidens: sol, venti, ignis, aër, pot, exercitij, animi pathemata, balnea, acria &c. Sect. Febrientia.

Si cum febre & ſit criticus, nihil agendum, ſed diæta præſcribenda. Si nimius tamen ſit, acrimonia humoris eſt tollenda, imo & conſtringendum, robōrandum. Si parcior ſit, promovendus. Si ſymptomaticus, curetur ut ſupra.

Si ſit colliquatio curatur reſumtivis, parum adſtringentibus, imo & narcoticis, ut clyſteri tria cap. papav. incoqui poſſunt.

Si in infantibus dentientibus, fit vel à pituita ſalſa à capite defluente, vel lacte per febrem corrupto, exhibeantur mel. ſir. roſ. ſir. de cichor. cum rhabarb. Conſtringendum poſtea per topica. ℔

DISLOCATIO. Luxatio.

DOLOR capitis. ℔ Cauſa vel nuda intemperies, atque tum gravitas capitis nulla eſt, oculi facile moventur, præceſſit cauſa procatarctica.

Vel materia, ex ſignis communibus & propriis. ~~Sic ſanguis ſyncipiut, pituita occiput, bilis dextram partem, mel. ſin. occupat.~~

Vel flatus; adeſt tenſio ſine gravitate, ſubito oritur & remittitur, tinnitus adeſt.

Vel ſerum: dolores fiunt vagi: crebræ ſunt diſtillationes, ſputum multum.

Subi. Si ſurrectis pilis intendatur dolor, qui ad radices oculorum non pervenit extra cranium eſt.

Si radices oculorum attingat, intra cranium eſt.

Diff. Fit vel per Idiopathiam vel ſympathiam ventriculi, lienis, hepatis, menſ. hæmorrh. ſupp. ulcerum clauſorum, quod ſcitur ſi per intervalla repetat; ſi intendatur pro intenſione alterius affectus, ſi alius partis affectæ adſint indicia; ſyncíput potius affligatur.

CVRATIO. [Si à nuda intemperie, alterantia contraria indicantur per generalia & topica.]

Si à materia, illa eſt vacuanda, revellenda, caput roborandum, alterandum per generalia & topica.

Vng. alabaſtr. mirandæ eſt efficaciæ V. S. ſemper utilis eſt, ſi ob nimium dolorem metus ſit inflammationis. Potiones magna doſi etiam ʒ x. pro una exhibeantur. Saccharum in dolore capitis ſit albiſſimum: impurum. n. lædit. In quavis cephal. pro quovis humore addenda phlegmagoga..

[Clavus eſt dolor in ſupercilio à materia acri cum flatu inter cranium & pericranium concluſa.] In cephal. mel. V. S. tentativa inſtitui poteſt. Optime exiccant puly. arthrit. quos vide apud *Senn. l.* I. *p.* I. *c.* II.

Fernelius ait nullam ſe cephal. offendiſſe quam non curarit. ℞. aloës opt. ʒ ß. ſp. el. de gem. trium ſant. roſ. rub. ana gr. vj cum ſirup. abſint. & viol. fiat maſſa. doſis ʒ j. bis in hebdomad. horis 2. ante cœnam. *Scholz* ep. 121.

Diaphragmatis tumor.

Dolor cap. à ā rum. vt vapora.
Ad hunc sinet adora: ila ebusine
Gemina: ō الثنين
à fostore: d ō الطحال
à fragmatis. ll. III. Sect. l. h. II. c. V.

Lipiriales, Sensa, Symptatica, arteriales per vx exquisitor, lactea s. chylosa.

Stō Diopathig affs fibrig, nos femur.
Quod ois certissig; d vic magnificil.
Et hor fallacissimus, & fallacissimus Hypothesi Empirici, per inania se. attrahor gratia, aut defectig cava, vapores & flatig; caput deferig. Per vasa v. via potig femores, & se flatice gfig ca auth.

(Dolor Vrgens, anodynis mitigandig. Rarissime ad surgica deveniendum, cum potig externa & interig sumpta. Sanguis, Guaiacig, & pheniticis, & lenientig ois seniores.

Vacuantia Tumoris, genus optig repig. ciant: d ventriculig, c. capite: ca portione, qua decet: semp v. ig capite, d semp & ig ventriculo a. ligo fititig conducib.

[# Ejusmodi vicia plena ab accidente aliquo desumpta vic magis curanda variantig, semibarbaris excogitata, ad Cestalcam, nec alio, referenda, vt Ovum, Galea, & similia.]

[# Imò mos tentativa, sed curativa & plethora iuncta, sic mag, sola seu revulsoria.]

Cum tibig post anum
V. S. ig frontis, & hypogastrij ag.
L: Cephalicig & Salvatig, & Dēto L: & Sanguinis. A. Gastr.

Diaphoretica.
Rh. Balsamo anding:
Electus Stellati Pauc:
Opium.
Mag: Pulvis Corallij
Ecbo. S. Bals. Pyrenaici Hiera.
Specifig Theophrasti.
Specifig Mag. Tetrachymagogi.
Mag. Tetrachymagogi
Chelidon.
Coralia.
Margarit.

Epithema Antihecticig Sennerti.
Opium O.
Sp. Vr.
Mana Indicorum S. M.
Angelica Laudana Thymiatos.
Ess. Diamoschi dulc.
Ecbo. Stypacis Ravennatum.
Pa. Aquatica c. Croco Vbicig.
Symphytocollis Mithridatig.
Mag. Carpophyll. Cassiobalanig.

Pilulæ.
Pilulæ Cynoglossatæ Fuligi C. V. Hum.

Enemata derivantia.

[Nec alternatim tantig ea debent, nisi sitis urgeat: nec purgantes, ne fastidio creant & abominationem.]
Diaturbith Hepatig.
Alia Confectiones
Benedicta Fracastorij c. Hiera Pic. & Ecbo. Diacatholicon.
Justinus Ravennatis Rondeletij.
Epicrasis seu pil. Cochiarum Fernelij & Thom.
Catholicum Sennerti & Temporig. cum Pil. Viuertij, Gesneri & Severini à Fonte, qib. & post Aurel.
Hiera Mesuæ, cum Aurea & mirabili Rod. Fonseca.
Electuarium Coronatum.

Si à crapula curatur ut cephal. bilioſa.

Si à ſero ut cephal. pituitoſa, potiſſimum ſudorif. & diureticis.

Topica ſyncipiti circa frontem, tempora, ſuturam coronalem applicentur, quibus ſemper adde acetum: Occiput ob ſp. medullam ea non fert.

Actu frigida applicari poſſunt; caute tamen in ſenibus, pueris, &c. Si incaluerint vel ſiccata fuerint removeantur: calida etiam in cephal. cal. conveniunt, rariſſ. frigida.

Laudatur verbena, corona è roſis, polygono, philantropo impoſita, rad. plantag. appenſa.

Folia caulis cum fimo columb. ſambuc. ſubacto pedibus ſuppone. Fermentum cum ſapone & ſale caulibus inductum pedibus ſuppoſitum, probatum eſt. vide febr. ſympt.

DOLOR eſt actio læſa facultatis ſentientis, triſtis ſenſatio.

CAUSA. Non eſt intemperies, ut patet in ſectione, extenſione: nec ſoluta unitas, ſed cum unius rei una ſit cauſa proxima, ſolutio continui, quæ fit à cal. frig. ſicco, ſine & cum materia, non vero à ſola humiditate: ab extenſione & maligno humore.

CURATIO. Dolorem tollunt quæcunque ſenſum partis blande afficiunt ut anodyna: dolor non ſentitur, ſed cauſa. Vel ejus intemperiem tollunt: Sic calorem frigida. Vel

materiam evacuant, ut cucurb. purgat. top. Vel malignitatem infringunt ut ægyptiacum: vel sensum tollunt ut narcotica.

QVÆSTIO. An aeris calor dolorem facere possit in parte nervosa ut aure? N. cum aer ambiens semper frigidior sit calore cerebri.

An trahat dolor? N. *Laur.* Quia natura magis obesset quam prodesset. Sed humores facilius ad partem debilitatam decumbunt, & pars debilitata humores discutere non valet.

DOLOR colicus: Colica.

DOLORES à partu. Partus

DOLOR lateralis. Inflammatio pleuræ.

DOLOR Lumborum. in febribus fit à causa morbifica in amplas lumborum venas transmissa.

CVRATIO. V. S. cucurb. ung. ros. &c.

DRACVNCVLI infantium. Infantium dracunculi.

DYSENTERIA est intestinorum exulceratio cum dejectione frequenti cruenta, purulenta, ventris dolore ac torminibus, à materia acri & intestinis peculiariter adversa, erodente, ortum habens.

CAVSA potissimum est humor biliosus occulta qualitate intestinis infestus. *Remotæ*, esus uvarum, potus musti, frigidæ aq. coagulatis sc. humoribus, postea putrescentibus, *obs. 47. cent. 3.* aq. per canales plumbeos ve-

Panacea Xenocratis.
Electuarij Pythagoricæ S. Regis Persarum.

Anodynus generale: pueris oleatus adhuc.
Ol. Camomel. c. aliquo tarij.

Dolor hypochondriacus, sub costis mendosis,
sinistri lateris: in regione pancreos,
absq; manifesto exterij.
Curatio: tarij. V. S.
Enema. Vomitorium, si opus videbit.
Stomachica: et Stillaticia.
Diaphoretica et Cardiaca.
S. Ivory. Calybeata.
Fomenta ad Liniamenta stomachica.

Diff. Cholerodes et aquatica.
Hepatica et splenica. Melancholica.
C. febrij, sine febrij.
Cholerodes.
Primaria, secundaria. Maligna, benigna.
[Cervinales Cœl. Aurelianus.]
Mucosa, membranosa, carunculosa.
Epidemia, Sporadica.
Canina: quæ nihil differunt ab
cæteris. Interna, nunquam
aeris salsi: externa, citius
potus, sudorifera, venena.

Vlcy mundificandy & sfoldandy.
Vires sfervande.
Symptomata urgentia mitigans
da Hollanda.
Vlcera ex relaxata:
scrimonia sfempanda:
maligna tas sfecipsam. expur
gand:
Sfluxy avertendy.

tuſtos fluens ſumta, ob Mercurij & plumbaginis copiam, purgantia cibis mixta. Venena ut hydrargyrum, nebulæ, aer malignus. contagium.

Diff. Gradus 3. ſunt. 1. in quo pinguia corpora exiguo humore perfuſa. 2. In quo ramenta inteſtinorum. 3. in quo ſubſtantia inteſtinorum ſub forma caruncularum excernitur: de ultimo gradu intell. ap. 26. ſ.4.

S. *diagn.* è definitione patent. Febris non ſemper adeſt. *aph.*3. *ſ.*6. diligenter ab abſceſſu in inteſtinis eſt diſtinguenda. Si tenuia inteſtina ſint affecta, dolor eſt punctorius. Cruor exacte ſtercori miſcetur vel poſt ſtercus excernitur. Si craſſa vel ſupernatat pus, vel extra iis adhæret.

Progn. Circa æſtatem & initium autumni fiunt potiſſimum. Puſtula nigra poſt aurem ſiniſtram cum ſiti magna lethalis. Mulieres, ſenes, pueri, gravius laborant.

CVRATIO. 1. Cauſa eſt vacuanda, temperanda per V. S. per vices purgantia, ut ſir. ex multipl. infuſ. roſ. pallidarum vel potius primo è ſimplici infuſ. myrobal. tamarindi. Rhabarb. quorum infuſum damus ſi purgare, ſubſtantiam, ſi adſtringere ſimul ſit animus. mechoacanna. Fol. Sen. diacathol. diaphœn. *Clyſteres*, qui magna quant. injiciantur ſi detergere velis: parva ſi glutinare. Alexipharmaca ut bolus arm. &c.

2. Si dolor vehemens ſit, interdum dolo-

rem ſedantia injicienda. detur juſculum ex ol. amygd. d. applicentur interna, Topica, narcotica.

3. Conſtringendum, non tamen ante ſeptimum, niſi forte levioribus. Tragea granorum actes, pulv. turturum, lepor. uſtorum commendatur. item ſuccus hederæ terſumtus. Ceræ in pomo aſſo uſus. Cavatur pomum & repletur cera alb. & citrina, aſſatur, edatur ante cibum: per externa etiam topica, quicquid velint multi: per revellentia.

4. Mundificandum ulcus, carne replendum, &c.

Dieta. Potus copia dyſentericis noxia, ſi convaluerint, nimium exercitium.

Mucus ille albus, pinguedo inteſtinorum non eſt, nec pituita, nec cruſta, ſed humores è venis effuſi ob partis læſionem mutati, ut in fluore uteri albo. #

QVÆSTIO. an purgantia exhibenda? N. *Valeſ. in Com. 4. in 4. Epid. Fuchſius. Maſſarias*: quia Galenus iis non utitur: quia trahitur humor ad partem affectam.

Affirm. Senn. Galeno non notum fuit Rhab. myrobal. uſus tamen eſt melle, lacte, & Crato ob rationem ſecundam negat cauteria in podagra utilia eſſe. ep. 167.

An lac convenit? Non convenit, ſi adſit febris, & ubi corpus eſt impurum. Caute cerere exhibeatur. Si ſerum ſit copioſum, deter-

git:

Pil. Z. Barbetti ex alej ecph. gr. vbj.
laud. op. gr. j. ol. menth. gj. mj.

Syr. è 5 plantag. mis comp. 3ij.
Vng. mica pan. D. Fracastor. Ratisbon.
V. fomentitia Crup. Na.
V. Celidonij c. beny. gij. d. tolut.
aut M. Capharn. ℔.
V. cucull. c. vino d. ℔.
Emuls. vellan. Longobardic. c. V. Cydonior. F.
Mastiches gr. c. c. Diacodio Gromito.
olea d. linanta modica.
Fomenta ex lacte ℔. medicato.

℥ rad. Filipendulæ: exprss. L. Mercurialis D. Prosperi,
℔ fest. Granator. c. vin. cost.
Lagolytij ficulnij.
℔ Corall. Conf. Cydonior.

Syr. Glycyrr. c. Corall. rub. d. S. Jacobæi.

Externa: ol. Myrtin.
Mastichin.
Glycyrr.
N. M.
Hyssopij.

Emplr Diapalmæ cum cal. d. fuj.
Fotus vini Quarantaliæ.
Enemata lactis d. Lalybeatis
d. Lilio albi.

#Nil prohibet te, quo tibi Natalis meus
ille nitidissimus, externa oblineus
abrasis ex cassidis dolor sanè id
satis arguat.

Dyspnoea. Vid. asthma: differt
enim a tussi, sed ἐτυμολογικῶς
πλέον.

Dystokia. Vid. partus difficultas.

git : ſi coctione longa ſerum evaporet, adſtringit.

An potus aq. lac. vini chalybeati prodeſt? N. *Crato ep.* 261. *Doringius obſ.* 42. *cent.* 3. ait aq. recentis chalybis, quique nullam adhuc extinctionem paſſus eſt, alvum turbare; ſi vero à chalybe jam ante crebro extincto potetur, alvum ſiſtere. Vnde ſi adſtringere velis primam aquam abjice. *Sen.* hoc non concedit : quia homogeneæ eſt naturæ, ſed parce potum chalybeatum ſumendum cenſet: quo enim plus ferri aquæ communicatur, eò plus alvum turbat, imo vomitum movet: neque diu contineatur, ſed ſubitanea ſit extinctio. Si enim diutius in liquore maneat, in rubiginem quaſi mutatur & magis turbat. Ergo prima aqua effundenda non eſt. Crocus martis per ſolam reverberationem factus utilis eſt, per aq. ſolventes non item.

DYSVRIA eſt urinæ imminutio. Differt ab Iſchuria ſolo gradu. Interdum cum, ſæpe ſine dolore, eſt : guttatim non effluit, ſed ſæpe debita quantitate confertim.

CAVSA eſt facultas ſentiens vel expultrix veſicæ læſa, vel alij veſicæ morbi.

S. *djagn.* Si fiat vitio ureterum vel renum, nullus dolor, nulla gravitas eſt circa pubem. Vocatur ardor urinæ : non eſt urinæ imminutio, ſed cum urina debito modo, verum cum ardore, excernitur. Vide ſtranguriam.

CVRATIO. Sublata cauſa. *For.* gra-

uidæ febric. applicuit ad pubem. ℞ pariet. virid. m. ij. chæref. m. j ß. ol. ſcor. ʒ j ß. butyri ʒ ij. raro fefellit : præmitti poteſt glans vel clyſter. aliam curavit ol. chamæm. & ſcorp. præmiſſo fotu olei decoct. rutæ & anethi. *Fernelius* obſtructo uno uretere, urinam tantum per alterum excerni ait. Contrarium obſervat. *For.*

EBRIETAS.

Præſ. Comedantur amygdali amar. ſ. 6. 10. ante cibum ut & nuclei perſicorum, quæ videntur prodeſſe vi diuretica. Scribit *Arculanus* ſi quis abſinthij comas aut fol. rutæ mane jejuno ſtomacho edat, ab ebrietate defendi. Semen braſſicæ ante cibum ſumtum prodeſt.

Platerus ebrietatem fugit, quod in principio parciſſime biberet.

Mneſitheus Athen. tria obſervanda dicit. 1. ne vinum non mixtum bibas. 2. ne bellariis ſecundæ menſæ te repleas. 3. ne dormias antequam evomueris.

CVRATIO : acetum ſumtum ebriis mentem reſtituit & alia acida. *For.* ebriis cerevisiam tenuem propinat & dormire jubet. Si non dormiant non levantur niſi abſtinentia ſeq. diei & ſir. dd. rib. aſſumto.

Fol. braſſicæ aq. roſ. mad. cephal. medentur à crapula ſi capiti imponas. Obmutescentes à crapula mori ait Hipp. niſi febris accedat.

ECCHYMOMA, ſugillatio. Oculi vitia.

ECCHY-

Ischuria spuria de vi pressiua. Illa scribit
vesicæ plenitudo ab obstructione.
Ischuria fit vrina nulla ꝙ vesica pleuit:
ischuria tranſmittit ꝙ emittentis
vias aperit. ardua, sive con-
pressiua a tumore, calculo, sabulo
Pil. Rufi. Mithridatiq.
Lotio, pure, puro pituita, phlegmate.
carunculis, ostreis, nodosa
vrinam obstruunt, sabuli tranſeuntes.

Ischuria expulsiua: ꝙ vesica cerui
S. Damule, & iumenti fluu.
c. Syr. Capill. ꝙ
vesicæ & nascentia, Hypocarpos offeum Pesiq.
Dos Sarsaparille
Gamarocchisma Caldani.

Catapasma ex sol. Plantaginis pediti
dicti.

De Ischuria compunctione cu-
rata inter mensibus pyramidales
Fallopiani vid. Epistym. LIX.

---

59. Semperiui c. ſ. o Dolo Dilymi
involuendi. Hemic. ad Ther.
obſ. XIX.

Vitiligo: ἀλφὸς, ψώλας, λεύκης.
Hæc pessima, ista gravis: hæc
levis. Hæ quibus descendens:
Hæ tubo cutis occupantes.
Atrophia, morphæa alba, cutis ex-
ulceratæ, nævi alba à Synanthesi
pilis & cuticula, à sanie forente
lanugine albâ: Ut Melanæsis,
ita. Add. à femella VII. pau-
Hol. c. U. malis mortuis.
La tuisseria pet. mel.
Cura dirigenda ad ea antecedan-
tes et genuinas
Illa ex vasis rectis, Phlegmonæ
& melanosis dicenda: Ista
Ulcerosa: Topicis dijerenda,
dissipanda, absorbenda, abster-
genda, seu attrahenda.
Balnea ex dictis V Cochl. Fasti-
gentian. anthelon. polygonat.
Saponaria, ari, dracontii, helleborr.
Pæon, tryonis, asphodeli, scillæ.

ECCHYMOSIS. Contusio cum ecchymosi.

ECSTASIS. Vel *vera* est cum mens ad cœlestia contemplanda adstrahitur; Vel *Damoniaca* ut sagarum saltus, quo pertinet Cardani & Lapponum ecstasis.

Vel *naturalis* qua somnia sua ob imaginationis contentionem vere accidisse & angelorum choros se vidisse putant.

ECTROPIVM. Palpebrarum vitia.

ELEPHANTIASIS Græcorum seu lepra Arabum est cancer totius corporis, seu morbus in magnitudine aucta, intemp. cal. sic. solut. cont.

Causa est bilis atra maligna. remota conceptio fluentibus mensibus. Cal. & sicca epatis & lienis intemperies.

S. diagn. Nasus lividus, genæ rubræ, unguium fissuræ. Vox clangosa. Stupor in suris & toto corpore ut vix puncturam acus sentiant. ~~Si aliquot gr. salis super sanguinem leprosi projiciantur, sal resolvitur.~~ Si sanguis ~~aq. limpidæ innatat, infectus est.~~ Cineres plumbi usti si urinæ supernatent, leprosus est. *Lemn.*

Progn. Non curatur nisi incipiens.

CVRATIO. Diæta præscribatur V. S. purg. cardiacis. balneo. post balneum milvi cap. pedum ac viscerum in olla combustorum cinis exhibeatur; carnes vero tribus continuis diebus comedendas exhibent, quod ali-

qui pro ſecreto habent.

Viperarum uſum non ſufficere obſervavit Palmarius, Fernelius, Eraſtus; ſatis validum eſſe & quo Giſb. Horſt. ſe & multos alios Romæ curavit ait Vidius, Schenck. Palmarius magnam ſpem facit in hydrargyro.

ELEPHANTIASIS Arabum eſt tumor pedis qui pedem elephanti refert, lividus.

Curatur incipiens: inveterata incurabilis. Obſervavit *Senn.* ſæpe & manus ita intumeſcere, ut digitis preſſæ inſtar œdematis foveam relinquant. Curatur ut ſupra.

EMPYEMA eſt collectio puris in cavitate thoracis.

CAUSA: ſequitur potiſſimum inflamm. tonſill. pleuræ, pulm. &c.

S. diagn. Si præcedat talis inflamm. quæ curari non potuit, pondus circa diaphragma, fluctuatio in mutatione decubitus, febris tandem accedit lente, partim putrida, p. hectica, circa veſperam & mane exacerbatur. Tuſſis perpetua, ſputum purulentum. Si in dextro latere latent, pondus & calor ibi ſentitur. Hipp. jubet linteum madidum utrique lateri applicare, ubi citius ſiccatur ibi pus laret.

Progn. Sitis, anorexia, alvus liquida, ſputum fœtidum, lethale: ſæpe in phthiſin abit. *l. aph. 15.* Tum tempora valde extenuantur, pedes intumeſcunt, ungues curvantur. Si in ſiniſtro

latere

Sonnenabra Foeth: Vnctiosa tor
cutis: Jpis ab adfuso tib acerimus
ng unitab nec fermentescens:
nussa Jpis arenosa vel carnosa
sordida mundicans ab elotione
i agra lanteamine excepti:
Jpis Urine [illegible]
i ea subrubeus. [illegible]
b sese se ora.
C. E. melisse c. Cob & Pare:
Ess. Ptelecozhi: J. Dominici.
Vranisctor Hermetis.
Hermanthea Dea.
Conf. Diglosse Cremesina Vipera D. de St. Jacques.
Sem rosati c. Asserico Aut. Vizani Patav.

Externa:
Balm. c. sol. Lectuarie
Vinis Citri. c. ol. pur
ol. bryni.
Butyri Saccharini Cro
ni, à Elione.
Opiatelle c. C. E. O. & Mary
Pilulis.
Pilis Mypicis Necrosmicis.
Ebeni Cydoniati.
Pulv. virgin Henrici Novelli.
Conf. Corydalis c. Hermodyca.
Aloes Galenici.

Legitimus alius, & alius spurius
à Catharsi pituitosi, & pit.
putrescente.

Syr. d H. Heliodori.

Dys 4 expuls. gtt. x:

Exh. Pulv. Arom.

Syrupi.

F. o.

Exh. mellis.

Specifica unguenti.

Mag. Coell.

Jurisdictio Romana, attendantia
& delegantia: & vid. sub to.

Conf. Fabr.
Steel Terebinthinat.
Syr. Salviati, anisati &c.
& al. d'to.

Inj. per sectionem Uretheræ, & pp.
vulvæ, vid. sub to.

Injectiones ex dicto Hominis, rof. &
veronic. c. Jacob. Cautio.

Epilepsia Carotica aurea, vid.
C. l. Consil. Ecoten. usqh. III.
De epil. puerperia vid. Item.
Bodin. & alt. omiss. c. VI.

Epil. gravis per ulcera &
vis principes et viz sensus.
Diff. prim. et secundaria. Forte, le
vis: inveterata, recens: periodica,
inordinata: hereditaria vt ppria

[# varie agitantur, studiunt deambi,
vesicam & alvum exonerant, semet
ipsum rodunt, frustant.]
[a parce ipsum debiles, & stolidum,
vestigium fit: pallet facies, &
hebetes figunt, linguam mox in,
admittit, mox & retinet.

[# Ebria parce ipsum Narcotica &
spirituosa vinosa; sed & ipso parce &

latere pus lateat, periculosius. *aph.* 44. *s.* 7. 27. *s.* 6.

CVRATIO. Vacuandum pus quo natura ducit. *For.* injecit enema è decoct. hordei & mell. ros. pectus inunxit ol. chamæm. lil. axungia felis, catuli, fotu usus est molliente: post exhibuit cassiam, cumque urina crassa fieret, diuretica: postea purgans: his curatus fuit. Si tussis adsit per expectorantia, ut suc. hederæ ʒ i v. ter quaterve in die. Si frustra omnia, secãdum viribus constantibus. Si pulmo ulceratus non sit, inter 4. & 5. vel 5. & 6. costam in latere, ubi major est dolor.

ENCANTHIS, excanthis. Oculi vitia.

ENTEROCELE. Hernia intestinalis.

EPHELIDES. Maculæ.

EPHIALTES. Incubus.

EPILEPSIA. fit vel per Idiopathiam cerebri vel à ventriculo, utero, vermibus, partibus externis in adultis vel infantibus.

Diff. gradus 3. sunt 1. præsentitur lapsus, non demittunt spumam, non diu durat, & æger post paroxysmum omnium meminit. In gravi gravius se habent, in mediocri medio modo. ℔

CVRATIO. à paroxysmo liberetur æger, quod fit, si quam primum ingruit ℔, pil. una laudani opiati cum quarta parte ol. camphoræ sumatur. vel pil. antepileptica è rad.

pæon. cran. humano, vel ol. succini. Caput altius locetur, cuneus ori inseratur, motus vehementior inhibeatur, sed non omnino, prolongatur enim paroxysmus, excitetur.

Post paroxysmum curatur ut cephal. pituitosa vel melancholica, præparantibus, vacuantibus diu, imo per mensem, continuatis, sudoriferis & reliquis generalibus, Topicis, appropriatis. Iecur perdicis ad ignem in testa pulverisatum cum aqua millef. in vase vitreo destillata. *Crato ep.* 104. fir. è succo cardui cum extracto cal. arom. *ep.* 140. sang. hum. probat *Zac. l.*1. *hist.*23. quia lac utile est: semper amuletum appendatur, ut ℞. rad. pæon. ℥ ß. sem. pæon. mar. 3 j ß. item rad. bryoniæ,

Diæta: caro hircina, cor hirci, capræ, anguillæ, pessimæ. esus turturum utilissimus. coturnices malæ. pedes calidi serventur. temulentæ epilepticos pariunt.

Si affectus sit cerebri Idiopathicus, gravior est paroxysmus, invadit circa novil. & plenil. cerebri affecti adsunt signa: reliquæ partes valent. setacea apprime conveniunt cervici applicata.

Si infans laboret, præcavetur, si quamprimum fere natus fuerit, exhibeatur puluis epilepticus cum lacte. Si à lacte, vomitus procuretur, quod fit si lingua infantis comprimatur, vel penna ol. amygd. d. vel alio imbuta in fauces indatur. Nutrix curetur ac si laboraret

Pil. Stomach. Juciniak
Hiera Aloeceratic.
Elect. Sanctæ, seu quin
Hydrocrambes.
D. St. Jacques.

Purgans repetenda. Caret
stomachi Erudiæ. B. Bun
Cons. XIV.

Epil. Symphatica generalis Emetic
Specifica mixta, sic Roma
te. Beckeri l. c.
Ramedy Hydrocyan

Syr. Hieracei Carpobalsamy.
Elect. Emetica Ethnicorum.
Pulv. Lenitiv. Viscer. Pr
Li. S. Salaës c. T
Genev.
Lac Caprinum hyosciam. H
Pyronic Compos.

Elect. Cynoscole ex Cretico & Opiat. Jer. Martin.
Asaphyr. c. lig. Lumbric. ten. Pulv. Gasseri ex punct.
Hepar Lutz c. Vipera & beton. Martini ab Heyer.
Elect. primula veris St. Mercurialis, c. Cruciat. & Cinnabrin.
ex punct. A. Gassi

Spec. Lithontr. Raf. c. L. Bezoar. & Unicorn. Pl.
Pulv. Angelicæ Phoenicis Quingentis; & Crescente Dr. Pl
Oxymel. Scillit. stomachic. & hydropter. Heap. Lanzi.
Electuar. formicarum ex Vipe. tiliæ. Hemsner.
Galeobd. luteum ex Vipe. tiliæ. Hr.
Diacodium P.
Gemach Austriac.
Regis X.
Lac. Tamarindor.
Dante istis aliis levioribus, & meta
nis sive Colagog. adhibet, v. g.
Manna, Sp. & Manna, mel, anisi
& similia.

Epilepsia com. Valdungensis.
Pulv. pro. emeticis alb. Vipe. tiliæ c. Pe
Sperm. ceti & Opiat. cran. hum.
& Cinnabrin.
Cautela Stephanographica: ex punct. G. Lanzi.
C. plenary powder.
Trepanopsy.
Hippospleu.
Laurostea.
Pelargaspody.
Heracleotic.
Cor. Aurig.
Pl. granator.
Ther. Sycerapody.

Pulv. Stomachic. Lanzi.
Pulv. Antiepileptic Basilii Valentii
Anthropocephaly.
Ei.
Spiritus volatilis.
Pulv. Gabi.
Pl. Ovi glauberi.
Spec. Cydoni.
Syr. Rosarum. F.

Herm. Dalec I. Quercetan.

Four Hydrometeliticks Paderborners
Fig. Hedonikij.

Epilepsia Cardiaca à vermibus Hercina
curata à facultate Leg. H. Sept. M. PP.
obs. XI. à Jacobo Hendelino à M.
Rulando. Cent. IX. c. XIII.

Erotomania. Vid. Mania
amorosa insana: & Philtra.

---

raret epilepsia : infans purgetur melle plassu-
lato. *Holl.* In paroxysmo curentur ut adulti.
Si à vermibus, necati expellantur.

EPINYCTIS. Pustula.

EPIPHORA. Oculi vitia.

EPVLIS. Tumor.

ERYSIPELAS, Rosa seu ignis sacer, fit non à bile pura; exulcerat enim & fieret herpes, sed à sanguine bilioso vel calidiore ejus parte : plerumque est cum febre.

Signa. Febris cum horrore, rigore, dolor intensus & calor, color roseus. Distinguitur à phlegmone. 1. quod digito posito super Erysipelas pars exalbescit refugiente sanguine; secus in phlegmone, nisi pars prematur. 2. major est calor, dolor, major febris; unde pars sæpe in vesiculam attollitur.

3. Color phlegmonis ad nigrum, erysipelatis ad flavum inclinat. Progn. *aph.* 25. *s.* 6. 7. 2.

CVRATIO. Si adsit plethora, causa antecedens V.S. purgatione vacuanda : post naturæ conatus est promovendus per sudorifera alexipharmaca, aq. flor. & rob. sambuci, Theriaca, &c.

Quidam nucem moschatam lino vel cannabe involutam torrent sub cineribus, ac cum sem. aquilegiæ itidem tosto cum aq. scabios. exhibent tanquam singulare antidotum.

Vulgo pannum lineum vel laneum rubrum vel far. hord. apponunt : humida vul-

gus horret. Commodè tamen pannus lineus aq. ſambuc. imbutus fortiter expreſſus tepidus imponitur.

Topica, ut in ambuſtis, ſi frigida ſint, facile gangrænam accerſunt: potius igitur aq. fl. ſambuci. ol. ſambuc. quod lac aureum vocant utendum. Item aq. omnium florum. furfures macri. *VVierus* ſecretum eſſe ſcribit ſi fel carpionis piſcis cum penna tepide membro affecto illinatur, & poſtea linteum ſiccum imponatur. Si frigidis uti velis, eo uſque utere dum calor parum ſedatus ſit quod æger narrabit.

Diæta ſit frigida & humida, quæ quoque ad præſervationem facit.

ESSERE. Puſtula.

EXCRESCENTIA carnea. Vlcus.

FASCINATIO Eſt incantatio qua per intuitum, laudationem ſeu contactum, homines, bruta, ſegetes, emoriuntur.

Dantur autem faſcinationes per primum & ſecundum modum non vi vocum, ſed diaboli.

Signa: ſi medici doctiſſimi de mali cauſa dubij ſint, ſi ſtatim ſtatus adſit; ſi res p. n. ut lapides ejiciantur.

Curatur precibus, purgat. hum. mel. vomitu. *V. infra: Incantat. p.*

FAVI. Sahafati.

FEBRES infantium. Infantium febres.

FEBRIS lactis. Partus.

FEBRIS

Faucium vlg. V. vlg.

Si ex solemne seroso scientia ad sanitatis
eius restitutio glandulis litiatis:
prouidet: Laxandus Galeni c. ol. asparagi Rosij.

Diuretica, ad diversiones & vacuandi
sui per pituitam.
Cichorij sicci.
Syr. pomor.
Pulmonica incerata pectoralia, & salutifera.

Faciei cicatrices.
Delentia Cosmetica. V lil. alb. bryon. limon. lapathi ac. serpentar.
ol. ovor. cepe. amygd. amar. myrt. Vngt. diapalmae.
Lig. Gij per deliq. Hydropiper cum aspirata c. borace.

Faciei rubor. bil. gutta rosacea.

Faciei rugae.
Seniles curari non admittunt.
Curatio ijs juniorib. per vict. bonj succi,
getacij, vitae hilaritate.
Varij, asperj, polygonati
fl. verbasci.
prim. veris. ol. sesamin. amygd. d.
Betae succus, d. rad. Bryoniae
Ol. alb. ovi concretum.

Faciei mundificantia Cosmetica:
V ovum d.
Mag. Marcasitae.

Faciei varij. [illegible]
tenui sanie.
Curatio per Universalia, per emolli-
entia, suppurantia, digerentia,
& detergentia: q vid. sui tis q
intra med. V lil. alb. Cinnam. sic.
amalve, ol. amygd. d. Diachylon cum ab,
Simpl, Empl. Emolliat. Ol. Jui-
nitor. v. semin. Ol. ij ol. lat.
ol. Rosar.

FEBRIS Ephem. eſt febris à ſpirituum vitalium incendio orta: quo pertinet ſynoche plurium dierum à ſpirituum & ſanguinis tenuioris effervescentia orta.

S. diagn. 1. Incipit à cauſa procatarctica, eſt ſignum inſeparabile. 2. Vrina ſanorum eſt ſimillima. 3. Pulſus naturali proximus. 4. Calor mitis, ſuavis. 5. Inuadit ſine frigore, horrore: caloris cauſæ ſunt, 1. motus. 2. putredo. 3. vicinia rei calidæ. 4. conſtipatio, corporis. 5. permiſtio rerum cal.

Curatio facta fuit balneis, frictionibus, unctionibus.

FEBRIS Putrida. Cauſa putredinis eſt læſa coctio ob res nat. n. n. p. n. 2. pororum conſtipatio vel ab aſtringentibus vel ſiccitate ut ardore ſolis vel vaſorum obſtructione ab humorum copia, lentore. 3. evocatio caloris naturalis à febre ephem. ira &c. 4. vicinia rei putridæ.

S. diagn. 1. Calor eſt actis, mordax. 2. Incipiunt abſque cauſa procatarctica, eſt ſignum proprium. 3. Vrina, pulſus, multum differunt à naturali. 4. Incipiunt cum frigore, eſt ſignum proprium. 5. Per paroxyſmos redit, eſt ſignum proprium.

QVÆSTIO. An purgandum in febb. putridis? N. quia purgantia calida ſunt & febrem accendunt. 2. Quia ſub cane & antecanem difficiles purgationes ob cal. ambientem, quanto magis ob febrilem? 3. quia

purgantia naturæ ſunt contraria. 4. quia non in principio nec augmento : cruda enim ſunt omnia : nec in ſtatu : natura enim à coctione turbatur, & melior eſt quies. *aph.* 29. *ſ.* 2. nec in declinatione : in ea enim nemo moritur,&c. reſtat quod in fine ſtatus ſit purgandum. *Zac. l.*1. *hiſt. 6. 3.*

An à putredine febris oriri poſſit ? N. 1. quia putredo calor non eſt. 2. quia omnia putrida refrigerantur tandem. 3. quia vapores minus calent quam cor. *Zac. refut. hiſt.*84. *l.*1.

FEBRIS cont. putrida. Diſtinguitur ab intermittente, quod intermittens ſemper cum magno horrore & rigore ingruat : illa raro cum parvo. Intermittens raro ultra 24 horas extenditur, cauſus linguæ nigredinem habet conjunctam : unde chirurgi linguam ſolam inepte curant. *For. l.*2.

FEBRIS tert. Interm. Inttermittit quia quovis paroxyſmo materia diſcutitur : quod probatur ex apyrexia. 2. quia facile diſcuti poteſt. 3. quia ſymptomata ut horror, nauſea, die vacuo recolligi novam materiam indicant.

Diff. exquiſita differt à notha : 1. quod exquiſita nunquam horas XII. raro 7. excedat. 2. quod rigor ſit vehemens & brevis. 3. quod ſtatim ſigna coctionis appareant.

S. *diagn.* Dignoſcitur à quotidiana rigore : in hac enim ſolus eſt horror ; durationeparo-

1. Febris, sug. e nimia stup. mortis,
Dest corpoj, et spina palens.

Is cui ea major cura sit bestiali,
pancreatis, sepatis, glandulas
mesenterij, et ibi cordis et
rebij. Arg. a. ng negligendi ja
oleant necesse e.
Bilis acris tempora: crassa
incenda. Humores leniter ven,
ant. Pituita fortiora agentibus
sunt comoda.
Sudoifera vehementia sin obst.

Febris continua s. bilioso corrupta.

Eff. Cicuta Jo. Rosefolij.

S: Simplex sit, tertia quaq die redit.
S: Duplex aut triplex, quotidie, et
differt 5 à quotidiana.

Finitur septeno ad senum circuitu.
Hippoc. IV. apho. LIX.

Diff. Exacta s. pura: notha, illegi-
tima, spuria.

Gentia. Vard. ben.
Hyssopi.
Crepidis.
Scrup. Ravendach. c. Fa. fl. Graij
& Delphinij Rosc.
Fa. ℞ Tabij.
Oarij tabij, Dan. Ludovic.
℞ Oab.
Eff. Card. Tutsh Ravendach. Diuretica.
Mag. Coriandri Tabij.
Exh. Sarmatici Caryophyllat. # Hoc de inter, ſe non ſemp ſe
alterij Cinnamomi. ſequit et eventy. Recte Febrin
Landia Nymphaea. Nec ex eis fuit aſſumend: Hec
Capsica tosta. a. Quippe ex Symptomatibz
Theriaca Scheborsta Osta. cognoſces.
p. S. Ambroſij. Empirica Antitintica. Vng. popul.
Lap. Cupri ex Aruj, Callistemis. & foliis aran.
Crassij tosta pt. Tab R. Dan. Epicarpium Stephanomelidis Oitz.
Callacea Tit. ofs.
Acalyphes
Blococarpaceæ.
Elixatezin farinacea ovatis c.
ſo. vtic. verben. & plantag.
Hypopedia Dodonej & Calagueſij.

paroxyſmi, caloris acrimonia, urina, pulſu.

CVRATIO. *Fern. l.2. m.m. c.3.* in febribus biliosis copioſam probat V.S. 1. quia tam bilis quam ſanguis vacuatur. 2. quia aliquando febb. bilioſæ hæmorrhagia ſolvuntur. 3. quia refrigerat. 4. quia plethora ſæpe eſt cauſa. Negat *Zac.* quia bilis ebullitio in metu eſt: unde à nimia hæmorrhagia Hipp. convulſionem fieri ait in aph.

In fine addenda ſunt melanogoga, frigida concedi poſſet in aſſuetis in ſtatu, materia cocta.

FEBRIS tert. duplex. Sæpe puratur eſſe quotidiana: ſed paroxyſmi duplicis tertianæ qui incidunt in dies impares modo & tempore ſibi ſunt æquales; qui vero in pares dies itidem ſunt ſibi æquales & differunt ab illis.

Curatur ut tertiana ſimplex. Specifica dantur fl. chamæm. centaur. minus. ſcabioſ. morſus diaboli, & plantago.

FEBRIS ſemitert. ſeu hemitritæa eſt vel *minor* quæ fit ex tertiana intermittente & quotidiana continua; vel *media* quæ fit è tertiana continua & quotidiana intermittente, vel *maior* quæ fit è quartana continua & tertiana intermittente.

Senn. " dicit eſſe febrem intermittentem cujuſcunque generis, quæ poſtea vel ob malignitatem vel aliam cauſam inflammationem ventric. epat. lienis, meſent. & pulm. faciat, unde febris continua ſeu febris con-

nua ſymptomatica ab inflammat. viſceris & intermittens. Reperit enim Spiegelius in cadaveribus ſemper inflammatos Sequuntur dyſenterias contagioſas, deſinunt in alvi fluxum, colicam:

CVRATIO. Ejus potior habeatur ratio quæ continuam facit, non tamen neglecta intermittente. Vnde quidam utraque miſcent cal. frig. utrique febri ſatisfactura. Verum hoc modo neutri morbo ſatis fit. per vices igitur exhibeantur. ſint purgantia lenia, non fortia.

FEBRIS Quotidiana. *Continua* ante diem 40 non terminatur, ſæpe non ante 60. Si paroxyſmus ſit longus, appetitus proſtratus, ſomnus longus; mortem minatur. ſæpe in cachexiam, hecticam, hydropem abit. *Intermitt. duplex*. cujus unicum habet ex. *For*. Latens vel lenta qua laboravit *For*. una cum hectica. 1. victus ratio opponatur ei quod magis urget. 2. digerentia & hecticam reſpiciant & quotidianam. 3. vacuationes & vomitus moveantur: cibi offerantur hora minoris acceſſionis. 4. reſtaurantia adhibe.

FEBRIS Quart. *Continua*. Semper ferè lethalis eſt. Vidit *For*. quendam qui inde melanch. factus cum medicum non admitteret, per ſeptimanas 12. & dies 3. alvum non egeſſit: poſtea per ſe ſeceſſum habuit & obiit.

Intermittens. Diſtinguitur ab aliis; quod primo & ſec. paroxyſmo vix percipiatur, nullus

Pot: amygdalozyla: Cerasia terrestria
Pracea: acidula.

Juno Juglandis potissima habeat,
Pirosoma vitis est, & quartanas,
Sponte defunt febres.

Caveendus ab emetico, & a sanguinis fluxibus. Mel. est ipso parotidibus, aute
post refrigeratoria.

Adjectionis vincta: Est ipsa,
cydia Tabo Com. de Warwick,
Stipelis expers.

∇ Cardiaca. Syr. Limon.
Tisana aegrotis & sanis
dicata.

Rara admodum. Non ipsa vidi,
nec accessiones ut, fere e tertiana
duplex, aut tripla quartana.

Juno rectis crudis.

Sed cauta, & gressu geometrico.

tempore pluvio apparere, si externa.
fuerit.

+ Jo victu inepte. Ex ipsa mentha
analepsia, & eupnoea.

Syn: Newbyerys, & Oxeoxerys,
& alap. fell. aut splenis obstru,
Rhoeas & tumores scyrhi
Mictu: Sarsa: Astrictu, an stomachi, Liberans.

Prognost.

Curas: per alexipharmaca et expellentia, diaphoretica, gualia ij Variolis
Jo. Lyenjis ap. Forest. lib. VI. obs. 8.
Eleth Liberans A. Gallen obs. XXIX.

per diuretica fusta Rondeletij de Dysenter. cap. XIIX.

Febris Latica: Ebrefine
الحمي اللزمة التي تسمي اللثقة
Jo. Jacchinus, aut Lucas, Jacobeinofa, Jadyleky, Jydaya, Jydaeffeky. Hippocratis Nofos.

Desinit facile ij Alumbor empyematicis
A. Fr. Lebrija.

Curs. Purgans fortior.
S. M. repetita.
Hemorroidis aptione.

Febris biliosa, ardens. raro ℞.
vel ęstima, vel intermittens.
Symptomata multa de gratia: ęsta-
lgia, Vjjlig, deliria, oris amaritie,
& siccitas, linguę aridtas, nigredo,
fissura, ardor stomachi, & sputa,
pulsus celeritas & frequentia, sitis,
inappetentia, nigredo corporis.

Febris raro symptomata distinguit ta-
de le Boë Sylvij: q frigida, calida,
Epialos, sticulosa, pemelica, car-
dialgica, tormenalis & colica, hy-
pochondriaca, stomatica, anginas
anthelosas, asthmatica, tussiculosas,
calculosas, arthritica, insanas, vo-
mitorias, cacostomias, sudatorias
Uretica, sputatorias, & omnibus
q: cap. Vid. cur. symptomata infra
f. 80. ℔℔℔℔.

Curatio.
℞. S. cautè instituenda q ęstima.
Js tertiana & post tertiam fa-
cessens. L. Garbette.

Lenientia.

Cathartica.

Sudorifera & Diaphoretica, q vere
Lenientia potiq & cathartica.

Diuretica.
℞ compos. Cristoforj 4ⁱ scrup.
[Barros 4 ℥ j.

Vichy aqua.
Pots q. horis. ℞ aq. acetos
℥ß. sem. citr. ℈j. CC. ung. ℥ß.
sacch. cand. alb. ℥ß. ℞ mij ß.
℔ß ℞ aq. j. ℔ß. vin. opt. ℔j.
sacch. alb. opt. ℔ 1/4. m. fiat cocht.
℔ß ℞ ℞ aq. Cinam. ℈j. sacch.
℔ß. Cauta hujus fiat cocht.

Vomitoria vox sang necessaria & stil

Fr. Deckers.

Hæmostatica arcana Cathartica.
Herculea Riveriana.

Cura difficilis. Tinctura dig
tiva: actiua brevis 11. apß. 25

Cura. Ven. d Kreutzkie. Spr. Limon. Hinc d Theodorakey, d Dec
Kerlecky Salutaris d Spiritsoro
negat.

Volks medicin Splenetica Schrift.
Bauer.
V Veriaul. Dekoantica.
Pyrocomy.
Lorg.
Ech. ff.
Ech. ff.
4 Oats: d 3vo 4 Oats
Elix. ff. cinnamomeg.
Haberbarg Dreß.
Pil. ech. gentiang angelikæ.
Opopan. Castoreatæ.
Elix. ff. terebinthinat.
Necropomp Diaphor. frig.
Vinum Camphoratum.
Hydrocranias Hyoc. Saccha.
Ovum recentiss. cum salibus.
Codrichtephanisch Lacte in ovo.

Stillicidia lenientia. Clysmata.
Hypnotica.
Hysteria, Hmelancholia.
Alterantia & corroborantia.
Vomitoria.
Diuretica.
Hidrotica. Gelatinæ Carnis?
Specifica Antitetanica.
Hungarisch Salviat.
Vinum Cinnabaricum.
Calendulæ cum vino.
S. absinthii Theriacalis.
Infus. tabaci barbati c vin.
Butyrum rancens Catonis.
Folia pentaphylli cum vino.
Pil. cum mumia Castoreata.

Febris erratica. Hλανής.
Ἐξέρχεται ἀπὸ Hλιακῶν καθῶς
Hles Colica de qua Lind cap Scheu
Med. Exerc. VIII. § IV.

Cura. S. M. è Salvatella.
Vomitoria levia.
Lenientia.
Clysmata.

Aloë fragata.
violata.

lus rigor pungens, sed quasi ossa frangens cum immensa pulsus tarditate & raritate. V. S. tentativa hic locum habet. Vtilis est usus nucl. persicorum & decoctum raparum *Crato ep.* 103. Spinam ungit ol. cham. exhibet & succum cardui sub forma sirup. postea decoctum raparum cum butyro. purgat cum sirup. viol. de pomis, elleb. ad ℈ j. *ep.* 112. etiam linteum aq. vitæ imbutum ingruente paroxysmo ventriculo applicat. ep. 113. *Monavius ep.* 129. tale secretum ponit ad quart. Re. cor leporis & eo modo quo pulmo vulpis præparetur: postea in pulverem redactum in 3. æquales portiones divisum tribus vicibus exhibeatur hora una ante paroxysmum cum vino albo vel alio liquore, si manifesta coctionis signa appareant. Specif. sunt rad. gent. plantag. ut & 3 j. rad. Imperat. succus verbenæ, absinth. chalybs

FEBRIS Quintana. Duas vidit *For.* sequentes quotidianam. unde authores eam à pituita adusta fieri volunt. Curatur ut quartana ~~cum hydrope.~~

FEBRIS erratica fit. 1. ob humoris transmutationem, ut cum bilis flava in atram degenerat. 2. ob victus errorem. 3. ob materiæ mixtæ confusionem.

FEBRIS hectica vel sequitur alios morbos ut ephemeram vel putridam, vel per se à causa procatarctica incipit ut ira, calore nunquam accidit, nisi præcedat ephemera.

Eſt vel ſimplex, vel putridam vel alium morbum habet conjunctum: ac tum lethalis eſt præterquam cum anaſarca.

Diff. gradus tres ſunt. 1. Cum ros ſeu rorida humiditas, quæ per minima ſpatia partium ſimilarium diſpergitur, abſumitur; & dicitur hectica ſine tabe, quæ curationem recipit. 2. Cum partes carnoſæ & adipoſæ abſumuntur, dicitur hectica tabida non exquiſita. Curationem recipit. 3. Cum partes fibroſæ ſiccantur, in qua cor exuſtum fit friabile, Hectica maraſmodes vel tabida exquiſita dicitur. Incurabilis eſt. Eſt enim maraſmus alius deurens, ut in hectica: alius frigidus & ſiccus, ut in hectica ſenectutis, vel ex morbo ſenecta dictus: alius ſyncopus qui calidus eſt reſp. febris & frig. reſp. ſyncopis.

S. *diagn.* Calor eſt æqualis: unde ægri ægrotare ſe non ſentiunt. Vna aut altera hora poſt cibum incaleſcunt, licet quinquies vel ſæpius de die exhibeatur; prout fit in calce, vel ſi lapidibus ignitis in balneo aqua affundatur. Pulſus parvus & celer. Vrina adipoſa inſeparabile hecticæ ſecundi gradus eſt ſignum, &c. Curavit *Fern.* quendam, cui urina tam pinguis ut pinguedo digitis auferri poſſet.

CVRATIO. In hectica ſimplici V. S. purgatio lethalis. Vnice humectandum, refrigerandum, ne tamen exiguus calor ſuffocetur, reficiendum. Cibus ſingulis 4 horis exhi-

Vid. de Sackur Gewächse zu Die Cultur.
Alex. Trallian. lib. IX. cap.

Hectica in plane Semitropica sive
Rachitis à scl. anatomicis
in plurimis observata à Bon.
Sydenhamio p. 1. † scl. p. 119.
potione Cathartica delicato
optivo ventre curata, et ven
sectio. Vl. l. c.

|| after this Leic inserit D. St. Jacques.
R. Mr. part. l. c. XVI. Tunic,
radicale incipit abscessus, modo
† absceptus E.

Diligenter distinguenda Hectica ab
ulcere pulmon. et abscessu, qui
gravit Ophthalmia, Diæa, et tot
fol. agit.

Balsam. Crysetic, ophioglossi, et
Cressæ c. V fl. vin.

Elotes Hyalinæ.
Ecth. filiar Lycopodii.
Cystoides Andromach Junipir.
Englisma Crotonica Citrus.
Abstinentes historiæ ven. Ill. Neurotica.
et Fr. Stahlian. vocata D. St. Jacques.

Hug regimen Eumathis Solticuda.

Liliaceæ & Asphodeleæ.

Testudinata Coeliaca.

Gastrocnemii thymici, testiculares,
cerebellosi, tuberosi.

glabri. Dorsiventres. Caponati. Glandes
femoris.

Ossa Regia pharisaica Seminaria.

exhibeatur. Per interna & Topica omnia. Veteres gelidam propinarunt à cibo ad ſatietatem in principio: in ſtatu enim moritur inde, vel hecticam ſenectutis incurrit. Commodius datur aq. hordei, cereviſia tenuis. Lac exhibebant à ʒ ij. ad ℔ j. ſenſim adſcendendo. Balneo item utebantur aquæ vel lactis tepidi. Topicis humectetur.

FEBRIS Hectica peſtilens. Signa ſunt, pulſus debilis, parvus, celer, ſyncope, jactatio, inquietudo, vigiliæ, delirium, ſomnolentia, febris æqualis: ſic ſine ullo dolore, viribus extinctis, decidunt *For. Senn.*

FEBRIS quart. tripl. dignoſcitur à quotidiana, quod in illa paroxyſmus primus fortis ſit, ſecundus mitior, tertius mitiſſimus & ſic primus quarto, ſecundus quinto, tertius ſexto reſpondet.

FEBRIS Symptomatica. 1. quæ inflamm. viſceris comitantur ut febris phlegmonodes, typhodes; lipyria, quæ curatur V. S. refrig. humect. internis, Topicis. *Fern.*

2. Febris lenta ex humore extra vaſa in viſceris ſubſtantia putrente.

3. Quæ corruptionem partis comitatur ut phthiſis.

4. Cum vel e[illegible]lacte, ſemine, menſibus corruptis, vermibus, febris excitatur; quo pertinet *daſz herzgeſpan* in infantibus ſeu hypochondriis; inflatio è crudis humoribus in primis viis collectis, qui putreſcere inci-

piunt & in flatus mutantur. ✝

FEBRIS epiala eſt cum uno eodemque tempore in eadem parte calor & frigus excitatur. Eſt febris intermittens. Vulgo dicitur fieri à frigidiſſ. ſeu vitrea pituita putreſcente. Rectius Platerus eam fieri ait, ſi principium unius paroxyſmi in finem alterius incidat, vel intermittens continuæ accedat. *For.* eam curat ut quotidianam.

FEBRIS Syncopalis vel bilioſa eſt eaque continua vel intermittens, vel pituitoſa, eaque itidem continua vel intermittens. Continua lethalis eſt.

CVRATIO variat pro ratione cauſæ. ſemper exhibeantur cardiaca quæ humorem morbificum corrigant. Omni ingenio reficiendum, per interna, externa à ſyncope ſuſcitentur. Si purgandi incidat neceſſitas cautiſſimè fiat per mannam, mel. roſ. ſolut. Crem. Tart. &c. Syncope crebra ab orificij ſuperioris debilitate fit.

FEBRIS Aſſodes eſt in qua ægri moleſte ſe habent, æſtuant inquieti, implacidi ſunt, anguntur, omnia faſtidiunt; intenſiſſimus adeſt dolor ſtomachi, hypochondriorum tenſio.

CAVSA eſt humor acris bilioſus ventriculi tunicis imbibitus.

Curatur detergente è decoct. hord. cum ſir. roſ. victu med. frig. hum. *For.*

FEBRIS elodes de qua pauci agunt, eſt

in.

† Vid. H. Reusneri obs. LXXI. c. not. mis.

F. Lippia, ab exsiccata S. miſlamaea [illegible] Vid. L. Diosc. [illegible]
Colere monte Superiente Solvit, ag. Hippon. Cor. lib. (..
M. S. † pleuritis Jebthyocolla similis de tej colorii, i [illegible]
bij aut ter repetita.

Vid. Ehrling.

---

ligotthymia, syncope.
Vomica empyema.
Phthisis, tabes.
Cachexia, dyscrasia.
frigus asthenos: Asthma.
Jecticus: Diarrhoea.

Chymosis ex ȝ̄ ſ̄ſ̄l. c. vitellor. ij.
Jusc. ȝ̄ij: c. ſyr. roſ. ſol.
Mana c. ȝ̄ij ff. cochl.
ȝ̄ Decoct. ȝ̄ij ſ̄ſ̄l. pur. ex Cicer.
d ȝ̄ij: ȝ ſyr. roſ. ſol.

in qua corpus resolvitur perpetuo sudore. Nam ubicunque sudores diu manant, ibi corpus resolvi est necesse.

Curatur siccantibus, serum vacuantibus, generalibus, Topicis.

FEBRIS pestilens differt à peste perniciei & contagionis vehementia, quæ in peste major. Malignæ minor adhuc pernicies inest & pauci moriuntur, ~~nulli~~ inficiuntur per contagium. Non dantur ephemeræ pestilentes, sed continuæ putridæ, imo & intermittentes secundum *Paraum* l. de peste.

S. *diagn.* Major est in principio virium imbecillitas quam pro febris natura vel caloris, pulsus parvus, urina sanis similis, sæpe & cruda, facies Hippocr. sopor vel vigiliæ exercent, delirium, vertigo, convulsio, vomitus, fluxus alvi, hæmorrhagiam narium in principio feb. malignam indicare observatum est. Maculæ varij coloris. Linguæ ariditas, nigrities, inflammatio quam *die Breun* vocant.

CVRATIO. Cum duo urgeant, vel malignitas vel febris, si illa magis urgeat, alexipharmacorum usus est magis necessarius: si hæc, ejus curatio est instituenda. Mox ergo sudorifera dentur quantum possibile temperata; materia enim coctionem non admittit, post V. secari potest. Lenes clysteres & eccoprotica utilia sunt, vomitus aliquando utilis, &c. Hinc repetenda alexipharmaca.

Præstans est el. seqq. *For.* ℞. mala Citria. n.2. aq. ros. affatim affusa & saccaro optimo ad dulcedinem aspersa, coque ad consistentiam electuarij.

FEBRIS Petechialis. Petechiæ à lentiginibus & aliis pustulis differunt febre, magnitudine, elatæ enim non sunt, non longæ sed rotundæ, instar pulicum morsus. Differt à puncturis pulicum, quod in puncturis in medio punctum appareat, quod semper manet etiamsi reliquum ruborem compressione, frictione pellas. Petechiæ si comprimuntur evanescunt, sed redeunt. Raræ sunt in facie ob arteriarum parvitatem, & frigus aeris repellens. Fiunt sine exulceratione, pruritu, protuberantia.

S. Progn. Si die critico copiosè erumpant, sequatur alleviatio, bonum: Si materia crudа existente, ut plerumque fit, lethales. Paucitas vel copia Petechiarum salutem vel mortem non certo prænunciant. Moriuntur quibus Petechiæ sunt nigræ, quibus in facie apparent; quibus urina supprimitur.

CVRATIO. Præmittatur lenitivum, sequatur V. S. ante quartum, post quartum omittatur. Sudorifera dentur. Si fluxus alvi supervenìat, non sistatur, nisi sit nimius, sed totum negotium naturæ committatur. Interim alterantibus & roborantibus utendum. Cordi, pulsibus, applicetur theriaca cum succ. citri. ol. scorpionum, & inunctio è nitro

Lac liquid. simpl. S. R. Folior. C. de Myelle. ℞ Gelu Rhinocerotis c. Vinc.
℞ Diaphoretic. Rob Sambuci, Bolarmeniac.
d. diaphoretic. ℞ Confectio Alkermes c. Oz.
M. CC. Calthy.
℞ Chij comptos. Augustan. o. p. G. V. c. d. diapsal. Galeo Specifico.
℞ ex toto Chaos c. Syr. ex toto Cit. Quercet. c. Bezoar Mineral.
℞ febrilis M. d. Rhinoc. c. Mand. d. vch. Gelu CC. Rhinoceros.
Syr. ac. Cit. c. ℞ Confectio, galegs. Unicorn. marin. c. Tr. rosar.
Theriacal. Opiumelle c. Bezoartico Cary.
Conf. Hyacinthin. ℞ Typhatic C. Elaphorandic.
Method. c. Conf. rosar. d. melliss. d. Bezoar.
Sudorifer. D. Remingtonij c. Cyth. Citria. Mary Schyny Neapol.
Virgin. Cordialis Bartol. Galleffi. Med. Bonon.
℞ Ther. M. D. Rhinoc. Mag. Lemn. Zizyphat. Galby.
Extract. momenti c. mag. ocul. Vrof. ℞ Lemn. Thigrans. diapsal.
Theriac. pt. Pimpl. Chij Conf. pulv. Cit. ℞ CCC.
d. Conf. Galli pt. add. alkerm. ℞ rosar. d. alia alexica.

Emendata comodissima, pro ℞ Antidoti Adebat. Riverij C. I. obs. XLVI

Ex Cassia c. tamarindis: E. Rudij d. P. Borelli exacto.
Sennâ Italica dr. Epith. Fernel. Lib. XV. ex Epithia
vel ex Hypoglossidis P. à Castro Lib. V. apf. III. vel Salerna. Jl. apf. IIX.
cap. antipharmacâ in Potu, pro Jul. pro Quad.
℞ tinct. Hyacinth. d. Coli Oz. Hyacinth. Jul. Hippolith. Bezoartic.
Pro diligenti observatione morbi ejus
morbi in visioscopio inventa. ℞ Gelu Unicorn. marin.
c. d. C. Rubiarum.
Eff. d. Syr. H. Cayophyllor. Sim. Pauli. exacto. ℞ Chelidon.
Tormentille.
Theriacalis.
Vinarij.
Galegæ.
Tragacanthæ.
℞ Chij, Paracelsi.
Lap. Bezoartic. ij. ter. p. noc.
Mag. Gemmæ.
Tr. Coralior.
Theriacæ Dosis.
℞ Cinch. Confectionis M. D. Rhinoc.
Antidoti pro. Dil. II. K. Hisp.
P. à Castro Mc. Oglat. Hippolith. c. Hyacinth. Malacca
Opiumelle Bezoartic. Caphuch. ley.
Hyacinthin. Capitalata Tamarindat.
Bezoar artificiale Brevior. c. Epith. Anglosti. lib.
℞ Hyacinth. c. Syr. Cinch. Cit. (Laxativa ex d. Epithe. Imi. vij.
d. Epithe. Imi. vij. Empirici
Hyacinthi.)
Eff. Diapsoris.
Marrubii.
Lil. gratiæ.
CC. Diaphoretic. Rhinoceros.
℞ Elaphobosci Sinensis.
Hedistroph. c. Mag. Smaragd.

pha a Celestino lib. II. c. XVII.

alia vide 9 febris ejusmodi pestilens
balica dapsplectica subita prop
gorij M: tempore de jun ex Ligonij
l. hist. Reg. Pol. Januarij Chada
ij pestilens Sabinarum.

Othis pestilens, sinensis ejusdem Pestis
tonsea tom. II. Consil. XXXI.

Hyar. Jan. an. 1562. grassata est
pestilens. Sequuta est pestis 1563. per
Universos Orbes. Vid. Cent. II. Conf.
ex Ger. LXIX.

citra festum S. Ja. qui vid. Jo.
Oberndorfer, de mort. Vngar. c. 6.
Quis sit subtilis et exigus, Avicen.
artaticus, Salutus vid. Jo. Hem.
ij l. apha. Hipp. XXIII.
vid. & infra p. 79.

Later adueho, sue Lympha ex-
rans maligna: d. Serosa se fluxi-
osa: Mirabilem potij, & crassa.
Volser gelenij de dig. fol. 7. d
1. ad 1. ad glene. II. mador corporis,
vapores humidi, vers. Nic. Leon.
cenj. Spy festinans 21 ij. ante dij
genal Hesp. Athenens. in Com. l. c.
Ex ij Judaeo quod Hippol. II. pl.
XIIX. c. Sudor lib. & flatib. ij
Com. Hesph:

ut ſupra. Per veſicantia commodè in corde vapores venenati derivantur. *Sd Sanct. vid. Supra p. 77*

FEBRIS Vngarica ſeu morbus Vngaricus, febris eſt peſtilentialis & prope ad peſtem accedit. Crato ad Synochas putridas, *Langius* ad cauſum refert, quippe ſummus eſt ardor, alij ad petechialem. Cæterum hic, licet aliquando, non tamen ſemper adſunt petechiæ: incipit anno 1566. #

CAVSA: *Rulandus & Iordanus* agnoſcunt ſummam malignitatem & ſummam cacochymiam idque benè. Cacochymiam autem eſſe à pituita contendunt. 1. Quia phlegmagoga in principio proſunt non vero V.S.# 2. exacerbatur circa noctem. 3. flante auſtro exacerbatur & graſſatur tempore pluvioſo. 4. quod adeſt dolor ventriculi. 5. quod per ſudorem & urinam terminetur. 6. quod ultra ſeptem vel 14. dies extendatur. 7. quod abſceſſu plerumque terminetur. Sennertus credit cauſum eſſe, ita tamen ut magna pituitæ copia adſit, non tamen ut cauſa.

S. *diagn.* Intenſiſſ. dolor capitis. Salivalis linguæ humiditas exſiccatur, & lingua ab atra accenſi ſanguinis fuligine obfuſcatur, [qui effectus *die breun* vocatur.] Ingruit cum horrore. Manu quaſi ducta dolorem ventriculi oſtendunt, cujus contactum non ferunt: eſt enim durus. Sitis inexhauſta, delirium. Omnes fere ſurditatem & parotidem incurrunt.

CVRATIO: Si fiat per contagium, præmisso eccoprotico mox ad alexipharmaca recurrendum. Si vero ventriculi sit dolor, anxietas, æstus, nausea, humores illi prius vel per purgantia vel vomitoria tollendi. per agar. fol. Sen. diaphænic. ros. Mes. &c. Vomitoria hic sæpe utilissima. Vacuatis humoribus, vel si non adfuerint, primo vel secundo die V. S. instituenda, etiamsi primo die maculæ appareant, Si modo vires ferant. Omnes fere qui in principio V. S. neglexerunt, obierunt. Si vomitus vel alvi fluxus adsit, tutius omittitur. Secetur Basilica, mediana, vel vena in pede, quæ omnium commodissa est præsertim in mulieribus. Tertio adhuc die institui potest. [Post tertium vomitoria, purgantia, V. S. lethalia.] Cucurbitulæ loco V. S. inferioribus partibus applicari possunt. postea alexipharmacis pugnandum, iis tamen quæ febrim non augent. Spec. liberant. 3 j. Lap. Bezo. CC. ~~flor. sulphu. succin.~~ ~~Zedoar.~~ omnia è citro. rad. scorson. & Bezo. omnia sunt efficacissima. Postea & diuretica dari possunt. Potus vinum non sit nec cerevisia. Potus decoctum sit CC. cum sp. vitriol. vel aq. hord. cum suc. citri.

FEBRIVM Symptomata. Dolor capitis curatur generalibus, Topicis. Multi laudant rad. raphani in taleolas incisas pedibusque sale & aceto prius mundatis appositas. Succus sedi & aloes Americanæ. Sedum enim

in

Vid. de cinere per Diuretica,
Diaphoretica efferebat Guil.
Rondeletij nat. urer ad A. Gellij
obs. XXIIX. add. (. II. Conf.
Epidem. XIX.

Regulus Hungaricus albuminata.
Epithem. (Spel. et V. Card. ben. et
Fallopij cit. ref.

Lenientia. Emenata.

Ech. agaric. cum. c. Syr. gser. Hedel.
Com. de Warwick. c. Sp. ros. Sol. aureo.
Vaporium c. spike.
Bolus Armen.
Paris tabg.
Bolus Armena. Rubricata.
V. ros. Angelica Bol Armena.
Hermodact. ex pulv. Diadragac. cum
extracto Glycyrr. Lanfr.
vid. p. Gal. 29:
tertio die, omissis aliis c. Sulphure
ex V. S. Joachimi Jungij cit. Hermodact. obs. IV.
Pulv. Gordon c. Fl. Eleosacch.
rad. Cichor. ana pect. c. Sacch. Gordon.
rad. Paronych. G. Lanfr.
Sulphur:
Sulphur cum Antimonio crudo.
Hiera c. Card. ben. et Cinq.
Hiera c. Agarico.
CC. Gelu Rosarum.
Cerussa bacalaureata Crocata. Jac.
ros. Salviat.
Lac c. Jejunio Sacch. et Hippocrate ex pulv. A. Gallij expulso.
V. H. Jo. Dee, Card. anij. I. Split Solanum Vid. Hippocr. et J. V. Rumley
obs. 82.
Emuls. Semin. Papaveris, Cucumeris, Cucurbitae, ex lacte.
Gelu CC. c. Pulpa.
Split. Hippocratis Salviat. c
Unicorn Groenlandic.
Bolus Armen. et Terra sigillata.
Bezoartica Minerales.
Vid. Cortic. R. Sel. et Nuc.
Epicrastica Sanguifera ex aqua Card. ben. aqua
Epithema. Hypopedia ex raphano: et Fuchsii Semata Jac. Martij:
potentilla, Jo. Cardan. ex lacte Jungij et Sim.
Epicrastica ex gallina, columbino, vitulino: vid. Pech. in
cibo et fab. mal. pulchre. Sect. IX. aphor.
XLIV.

Vid. Sch. ℥ Euchy. R. Mrs.
Diamoron, Diacarpon.
Mucagines cydon. Psyll. basilic.
malv. rem. sordi.
Butyr. rec. Ung. Dalz. R. M.
Gamarochylissima.
℥ express. rapar. tost.

Vigilia.
Hypostica d opiata vid. ap. J.
J. à Bruno mat. med.
d Euchy. R. Sch. ℥ Mrs.
Stomachi Sanitas R. Guarinoni
lib. 1. R. h. XVII. c. VII.

Morb. virginei. Febr. anomala.
[* Febr. v. Hippoc. colorib. diffe-
renter VI. Epid. Sect. 1. al. ru-
bicunda, al. pallida, al. livida.]
Icterus alb. Foet. virginei
color.
Symptomata Lacrimae, ℥ Ung
Leny oris & obstipatio.
Ca: externa: vitii praeg. obstructio,
interna: mediata, mesar. oinota
Suppressio, et Saltem diminuta.
plenitudo immediata: Phlegma

in tectis in maximo æstu succo turget, aëre vero pluvioso flaccescit, quod ea fere halitus sicciores pro alimento attrahat. Laudatur rad. rhodiæ ʒj. aq. ros. ℔. ß. coq. & decoctum cum linteo applicetur capiti ung. alabast. cum popul. suturæ coronal inungatur.

Linguæ ariditas corrigitur ~~rudere ex ossc sepiæ &~~ humectantibus etiam fortibus, uti aq. succ. sempervivi, sal. prunellæ. Spir. vitrioli, aq. hordei.

Sitis. Si ex pulmonum calore fiat, os aridum est, difficilis est sermo; qui potu non sedatur, sedatus illico recurrit.

Hic præstat frigidissimum aerem inspirare quam bibere: præstat ore continere gelidam, ceraſa condita, sul. lactuc. portul. condit. vel aq. gelida irrorata, Oxycrat. talcolas mali citrei. conserv. acetosæ talcol. cum. cucurb. saccharo prius eluantur. Crystall. Tamarind. fraga ribes, ore detineantur. decoctum rad. acetos. quod vinum rubrum refert. detur potus in vigore. Si à ventriculo causa, tollatur humor sc. acris calidus.

FEBRIS alba morbus est vel symptoma cum colore faciei pallido, virium languore, membrorum gravitate, cibi fastidio, cordis palpitatione, respiratione difficili, mœrore, pedum, palpebrarum, faciei tumore œdematoso, à depravata nutritione & crudorum humorum copia ex viscerum, hepatis, lienis, ventriculi prava dispositione genita,

& hinc vaſorum circa uterum & vicinorum viſcerum obſtructione ac inde menſtruorum ſuppreſſione orta. #

CVRATIO Eſt ut in leucophlegmatia, ita tamen ut uterus reſpiciatur; ac ut in menſium ſuppreſſione, ita tamen ut viſcera reſpiciantur. Leniens, V. S.# niſi fuerit inveterata, ſanguine, viribus corruptis, purg. aperient. ſudorifera, venus, niſi fuerit nimia cacochymia, conducunt, imprimis chalybs poſt univerſalia: Radix ſcorſoneræ quocumque modo ſumatur. Lapis Bezoar.

FEMORIS luxatio. Luxatio femoris.

FICVS. Verruca.

FICVS Cancroſus. *Fab. obſ.* 1. *c.* 1. Ficus cancroſus in oculo dextro. Præſcripta legitima victus ratione, injecto clyſtere, propinata aqua borr. acetoſ. beton. cum ſir. de ſuc. citri & granat. V. S. hirudinibus ſub auribus ejuſdem lateris & ſcapulis cucurb. applicatis, exhibito infuſo rhab. ſen. in aqua beton. euphrag. agrim. cum ſir. roſato, lotis pedibus in decocto rerum calidarum, oculum lavit aq. ſtillatitia adverſus cancrum, fronti intercipiens applicavit. Increſcente nihilominus tumore cum ex illo uno impetu fluxiſſent 73. unciæ ſanguinis cum dimidia, chirurgia exemtus eſt oculus. Ne fieret hæmorrhagia, metus ægri fecit, & injecta artubus dolorifica ligatura. Quare præſcriptus eſt potus lenitivus itemque cordialis, ex aq. bugl.

Curas dirijenda ad morbos, cat,
a symptomata urgentia.

Obstipatio aperienda: Dyspepsia
alleranda: Vomitus inhibendus
gitando: Hydrotica exhibenda,
si humores seroi sunt, corpus
ambitus: plethora S. M. minuenda: Pleuritis semper timenda: Pneumonia: Hepatitis: Encephalitis: Carditis danda.

Crem. ℞. ℞ Dulc.
vel ℞. — vel ℞ Dulc.
℞ vel ℞
roy o.c. — ℞ Dulc.
Mag. sepatic. rubr.
Dulc dictamnus, puleg. a (ic
stemus in pot.

Fissura labiorum.
Cá vt externa, venty, calor, crima
moda, aeria, aromatica.
vt interna Filipires aeros, bilis,
fe: viscer, intemperies cal.
Cucurb. Vniversalis, & tt topici,
Ag. gratiæ Dei, ros. plantg. fol.
querc, saniculæ.
Ol. Mastich. myrti, mouordicæ,
vitell. ovor. cerei, terebr.
Mel ros. colat.
Vngto populn. + Tut. + to.
Mucag. tragac. malvæ, S. cydon.

Fissura Vteri. Egyptiaca, vinc,
cyprs. i cervice ejd. & podice,
& intestino recto. Cucurb.
vt alibi; labiis, polypodij,
lingua, volsi cruci. plantag. sp[illegible].
i pilliis thuris, Dracc
Methridatia cc plantag. fol.
querc, centaurmod. alchimillæ.
fragariæ, saniculæ, filipendulæ.
Ol. Mastichin. myrti, myrtin. mo,
mordicæ, vitell. ovor.
Vngto ros. alb. Populneat.

bugl. rof. viol. meliff. ana ʒ j. ſir. de cortice citri, de acetof. ana ʒ j. conf. alkermes ʒ j. pulv. diambr. ʒ ß. Cordi applicatum interpunctum è flor. fol. ſem. pulv. Cordial. pulverizatis, goſſypio exceptis cum ſindone rubra. Ventriculus unctus eſt ungv. ſtomachico. Finita chirurg. pulvis autoris ad ſanguinem ſiſtendum cum ovi alb. copioſe eſt injectus, defenſivum frouti eſt applicatum, item digeſtivum plagæ. Ne autem natura eo denuo humores amandaret, ſetaceum inter primam & tertiam vertebram affigit.

FISSVRA Papillarum ſeu rhagades fit à ſuctione vehementi & humore bilioſo. A ſiccitate ut in aliis partibus hic fieri credibile non eſt. Præcavetur ſi ultimis tribus menſibus vel ſolo ultimo, calices duo è cera inſtar cupularum vel digitalium glandium formentur reſina abietis pleni & papillis apponantur & linteis retineantur: ubi reſina abſumta eſt, nova eſt infundenda. Topica ſunt mollientia, item ſuccus cancrorum cum flore lactis. Si dolorem in ipſa ſuctione inferant, appone papillis calicem ſtanneum argenteum perforatum papilla vaccæ recens mactatæ tectum. Sic enim infans ſuget & tamen labiis papillam non attinget. Generalia ſunt refrig. & purg. bilem. Eodem modo & reliquæ Rhagades curantur.

FISTVLA eſt ulcus ſinuoſum, album, anguſtum, calloſum, à pituita exic-

cata & non raro indolens.

S. *Pr.* fistulæ cum insigni ossium carie ut acetabuli, Ischii, quæ ad viscera penetrant, quæ sunt in parte insignibus nervis prædita, imbecillo corpore, prognosticis relinquendæ.

S. *diagn.* explorantur virgula plumbea, cerea candela. Si plures sint, injiciatur liquor, qui si simul per orificia omnia effluit ejusdem coloris, una est fistula.

Si per multos annos duravit & subito claudatur, lethalis.

CVRATIO est vel palliativa, cum per generalia, revulsiones, setaceum, Topica, vacuatur, revellitur materia, calcis aqua, item lixivium, aqua theriacalis. Vel vera quæ fit præmissis generalibus, item potione vulneraria. Callus removendus & prius orificium fistulæ dilatandum est vel igne vel ferro vel quod commodius est pyramidibus formatis è spongia, medulla Sambuci, rad. gentian. bryon. rapi, ut in fonticulis. Non incommode forte diu ante curationem fieret fonticulus ad diversionem in parte opposita. Callus postea tollitur vel ferro vel igne vel med. ung. apostol. cinere ficuum, decoct. rad. bryon. centaur. min. imprimis: vel fortioribus ut ægyptiaco. Differunt pro ratione ætatum, temperiei, &c. Ellebori nigri radix tuta non est. aq. viridis, quibus interdum totus callus instar vaginæ excernitur. Si frustra,

Inter interna gratia Gratissima
Epp. et Doct. Maguntini Lib. de
Magunt. Consil. VII. p. 120.

Contadi V[illegible] [illegible] & [illegible]. ci[illegible]
rato.

Ff. ♃ Paradisi.
Bell. Fis. & Chaudi.
Empiri Dial. Surgeri de
L. mirabili Cratij. Magenes.

Empiri Fisici & recta Surgici.

ſtra, in parte quæ ſectionem fert tota fiſtula aperiatur ferro, callus eximatur cultello vel igne, pars tamen probe muniatur. Oſſis caries curetur, Si adſit eſchara, amoveatur. *Nicol. Florentinus* ſeq. oſſa fracta & corrupta extrahere, malam carnem erodere & fiſtulam ſanare dicit. ℞. ſalem toſtum, tartarum, agaricum, pulv. melle excipiantur. vid. f. 570. l. 5.

FISTVLA thoracis. Incurabilis fere eſt 1. quod muſculi in perpetuo ſint motu. 2. quod pleura exanguis. 3. quod ſecari nequeat.

CVRATIO. Diæta ſiccante, potionibus vulnerariis, generalibus item & Topicis perficitur: injectionibus parum ægyptiaci addi poteſt. Si ingens adſit putredo, tubulus aureus, argenteus vel plumbeus in ſinum mittatur foraminibus multis pervius arctè revinctus, ſpongia magna vino & aq. vitæ imbuta inſtructus ad orificium, ut æger naribus & ore obturatis per illum ſaniem ſubinde ſecernat.

FISTVLA gingivarum curatur generalibus, decocto agrimoniæ cum alum. vel cauterio vel dentis evulſione ex ſententia Celſi. Gutta ammoniaci optimum remedium. *For.* mell. roſ. ʒ j. gutta una vel altera ol. vitriol. mixta optimum. *Crato ep.* 183.

FLVOR muliebris diſtinguitur ab ulcere, quod ab ulcere uteri fluens craſſius eſt &

fœtidius, parcius excernitur, coitum non fert: à ſemine, quod in fluore humor tenuis ſeu ichor continuo fluat. Cauſa eſt vitium vel uteri, vel totius, vel partis principis. Quædam à ſumto cathartico, quædam à balneo hoc incurrerunt.

Progn. Ducit ad hydropem, ulcus melanch. &c.

CVRATIO. 1. Vacuanda cauſa: tollenda partium intemperies: ſiccanda materia per generalia, Topica, etiam diuretica vide *Senn.* poſt per adſtringentia ſiccandum. *Senn. For.*

FORMA. In prima creatione data eſt rebus naturalibus, quæ cum ſui ſit communicativa, multiplicatur vel per ſemen, ut in viventibus quæ generare dicuntur, non cum fœtum, ſed cum ſemen generant: dantur autem in plantis diſtinctæ ab anima formæ, ut docet vis purgans in cadavere rhabarbari. Miſceri poſſunt iſtæ formæ: ſic forma pyri inſerti in pomum ei miſcetur. Forma item aſini & equæ, imo viri & mulieris, ſecundum *Senn.* Vel communicatur per atomos formas in ſe continentes unde ortus rerum omnium ſponte naſcentium.

FRACTVRA. Signa ſunt quod fruſta oſſis fracti tactu percipimus, eorum crepitantium ſtrepitum audimus, pars cava eſt unde os abſceſſit, gibba ubi ſe intulit, dolet & ſanæ parti eſt diſſimilis.

S. Pr.

Fluxus hepaticus. . . . . } q.s. Diambra: d: Dyascuteria.
Fluxus pestilentialis. . . }

Prima: Rumor experimentis à
Ige. diversis, pestilentiis, mal-
lanicis, seriis: Varii colores,
& Vrina collecta per aduersum
& diversis: extra Vrina per
modum servandus delatis.
Remota, Rumores pestilentes
genat.
D: acathami.
Ech. Cichoriarum.
P:l. Staroestine.
Ech. Polychrest urs.
Vtriusq. patentis.
melissæ.
aristolochiæ.
Spec. arom. rosat.
caryoph.
diacalamint.
diacicon.
Diambra.
Sacchari rosat. Calybeatis.
Fa. Coralli.
P:l. Hypocistidis & Ladani.
V. et Ess. rosmarini.
Conf. Galeopsios. c. fe Corall. alb.
Dett. gemmabali: rubi.
Infusi. rad. Caryophyllatis.

Aqua cinitas Actis:
Dett. Saffafras.
Baltzami Scarlet.
Conf. rosat. c. pearlas, Lunic.
Cinnam. c. fe off. Sachylon.
Vroisumarii.
metha Crispi.
Syr. de Cucur:
Diamoschi d.
Diacalamint. Empls & Galbanis Smaltiale.
Eyeathismata, dett Christ rad.
Vngta.
Pellaria.
Catapotia.
Laconica: Sudores assi.
Suffumigia: fol. Salviæ, Succini.
Pterum Cellenses, Badenses, Tunic.
Lixis. Sarment. vitis pro
Scelopyria.
D fol. quercus, tenellos.
Gumbolarum.
Diaberberis.

Fistula ani.

Curatio per Chirurgiam de qua ad.
Jnto: incipiens Dett. Marcelli
Severi.
per Interna: potiones Vlcerosas.
Dett Virgo virea.
Li. Sandali rubei & Sarsaparill. Dett. Lignorum exot.
Scopiæ & Hydatidis Salicis Siccæ.

ad curandas Vlceris. . . . } Tonica.
Diacalaiscos. }
Phœnicis gal: } ad easdem servandas }
Cerasorum syr: Amygdalarum. Rob. Boyle.

Diffen. vid. 4. Paulÿ Barbette p. 1.
Fin. c. 3. p. 2.
1. à fixum: ut fractum fixi,
vel fissum fuit. 2. à subjecto.
3. à symptom. signata c.
vuln. vitium. luxare &c.
H. : bit.

S. Pr. Quæ in longum fit citius curatur: reſtitutione enim opus non eſt. Si fiat in articulis periculoſiſſima eſt. Naſi, maxillæ, juguli, pectoris, ſcapularum, coſtæ, ſpinæ, tali, calcis, manus & plantæ pedis intra dies 20 & 24 conſolidantur: crurum & brachiorum intra 40. Oſſa medulloſa citius ſolidantur quam dura.

CVRATIO. Scopus primus eſt ut oſſa reſtituantur, quod fit extenſione, quam facilius ferunt humidiores: & repoſitione vel per manus vel per gloſſocomia, in quibus ubi ſatis extenſum eſt os, funis contentio eſt remittenda. Reſtituta oſſa intelligis ſi ſubito dolor ſedetur: ſi nihil inæquale ſentias, ſi ſano ſit ſimile. 2. ut oſſa reſtituta contineantur per med. ex ovi alb. q. ſ. bol. arm. ʒ ß: per *plagulas* (vocantur ſplenia) è triplicato vel quadruplicato linteo quæ cavitatem explent ut in poplite, vel gracilitatem partis æqualem reddunt ut in carpo. Per *Fernlam* qua cum deſtituamur hodie, fiunt ex papyro multa, tenuiſſimis ligni aſſulis, ita tamen ut lignum viride non ſit. *Fab. c.* 4. *obſ.* 98. è corio quod calceis in ſoleas ſupponitur, è ferri albi plumbive lamellis: circa extrema ſemper tenuiores ſint, qua parte fracturam attingunt craſſiores. Per *torulos* ſeu ceſticillos qui fiunt è bacillis digitum craſſis linteo involutis. In cruris & femoris fractura duo apponuntur à calce ad inguen ut rigore ſuo par-

tem immotam contineant. Per *capsulas* ex ferri albi laminis vel ligno. Vsus est in lecto, vel cum è lecto transferuntur. Per *fascias* quæ vel coriaceæ sunt, ut in nasi fractura, vel laneæ ut in inflammatione ubi constrictione opus non est, vel linteæ. Quævis pars ita est liganda prout eam volumus permanere. Si in dextro latere fractura sit eminentior, seu in parte sylvestri, à parte sylvestri ducendum fasciæ initium, ac in illo latere fortius stringatur; si in domestica, contra hodie prima fascia loco fracto vel luxato injicitur, ibique strictam densis gyris versus corpus ducunt. Secundam itidem injectam rarioribus gyris versus extrema ducunt. Tertia læsæ partis extremo injicitur & sursum lenitet obvoluta gyros secundæ & primæ decussatim secat & musculos per primum & secundum loco motos restituit. Postea ferulas applicant. Peracta deligatione rogandus est æger, num arctius constrictum sit membrum? Si affirmet, dissolvatur & laxior substituatur. Laxior inutilis est, arctior fluxionem accersit. Justæ deligationis signum est si altera die pars œdematoso tumore tumeat. Si pars duriter tumeat, arctior, si non tumeat, laxior est. Si arctior sit, altera die laxior substituatur, foveatur pars hydrelæo. alias ante 4. nihil est movendum. à 3. ad 7. pars gracilescit, quo septimo die arctius quam ante ligandum, quod Syptomata amplius non sunt in metu.

Fascias

Sup. Sant, e aglu deligan, et filius.
et Pauly Barbette fust. 1. Chir.
c. 3. 1. r.
Hui⁹ Quittenda fomentu⁹ c. hiu.
d Orelhozall. Bolo. stu.
Rue. Sc. Frac. dorjath.
Ph. Ol. ros. myrtin. Viola.
Euphr. Oxyacan. ℥.
℥. 4.

Fascias & plagulas oxycrato, si simplex sit fractura, vel vino rubro si cum vulnere, imburas esse oportet. Æstate crebrius humectentur. Vbi symptomata desierunt, ab irrigatione est desistendum, ne calli tardetur generatio. 3. Symptomata curentur, præcaveantur generalibus, Topicis. Callum generant alimenta viscida quæ tamen improbat *Fab. obs.* 92. *Cent.* 1. quod quidam inde in hydropem inciderint, quod multi absque eorum usu curati sint suc. primul. Ver. pulv. vel. suc. rad. agrimon. assumto : item pulv. lap. osteocollæ ad 3 j. cum aqua rad. symphyt. ptisan. vel alio jure singulis diebus jejuno stomacho propinatus mire callum generat, si præsertim Topicis quoque miscea-tur. *Fab. obs.* 90. *Cent.* 1. Topica sunt empl. diapalm. hieme barbarum vel nigrum æstate. In morbi progressu quidam fascias aq. roris marini imbuunt, quam efficacissimam esse scribunt in fracturis.

Generale. Si ossium extremitates, periosteum, carnem, pungunt, aperiendus est locus & eximendæ testulæ. Si periosteo soli hæreant, non tamen pungant, non eximantur. Si nec ossi nec periosteo hæreant, eximantur. Sæpe circumagendum metu anchyloseos. Si adsit inflammatio, restitutio non tentetur metu convulsionis, nunquam tamen ultra quartum extendatur restitutio. Collocentur partes eo situ qui minus est dolorifi-

cus. *Fab. cent.* I. *obſ.* 93. digitis glomus comprehendendus detur, ut media figura maneant. Brachium mitellâ geſtetur curvum ad angulum rectum. non altius ne nihil, nou humilius ne nimium affluat. pars ſemper. 1. molliter jaceat. 2. æqualiter. 3. altiuſcule.

FRACTVRA cum vulnere difficilius curatur. Oſſa enim ſunt reſtituenda & vulnus curandum. Si adſit inflammatio, repoſitio differatur donec præterierit. repoſito oſſe vulnus curandum. Deligatio fit vel faſciis latioribus, laxioribus quam in fract. ſine vulnere, & in emplaſtri, Catapl. imo faſciarum medio foramen relinquitur ut purgari queat vulnus, faſciæ ſolummodo oſſa contineant. Ferulæ non ſunt apponendæ. Capſulæ ſunt ex uſu. Vel deligatio fit unica faſcia & unica circumvolutione, quæ duplici triplicive linteo in plagulæ modum contexta ac oris ſuis dexterrime conſuta eſt tam lata, ut totum vulnus contegere poſſit. *Par. l.* 13. non prohibetur vacuatio puris.

FRACTVRA cruris cum vulnere. *Pareus l.* 14. In vulnere cruris ovi albumen, butyrum & farinam applicavit juſſitque ut pedem extenderet; ſi vulnus eximendis teſtulis non ſatis pateret, novacula amplificaret, digitis num teſtulæ ſint eximendæ, exploraret, manu ſanguinis thrombos exprimeret, deligaret debite poplitis & malleoli

Jo. Fred. Seip[?] arch. Puzanhi Epc.
Idem. Joseph Fred. Seip[?] Dis
ani[?] Joannis A. L. Barletta
l. c. f. 7.

cavitates, ſtupa linteo obvoluta expleret ne ceſticillorum duritie calx inflammaretur, pedem molliter æqualiter altiuſcule capſula munitum collocaret, tria vaſcula ſanguinis è baſilica ſiniſtra extraheret. Secundo apparatu vulneris oras ung. roſ. inunxit per dies 6. diutius uſurpatum occœcat poros, plagulas oxycrato & vino rubro irrigabat, per 9 dies nihil præter 12 pruna damaſcena & ſexpanis bucculas eſitabat. Potus erat aq. ſaccharata vel potus divinus, purgabatur bolo è caſſia & rheo. Vndecimo febris & fluxio invaſit quæ in abſceſſum abiit multo pure manantem, à portione puris ſuppreſſa & ligatione laxiore impetus etiam convulſivus oſſa reſtituta è ſua ſede ejecit; unde noua facienda erat repoſitio. febris ſeptimo die eſt terminata; digeſtivum poſtea detergens adhibuit cum pus erumperet. In fundum pulv. ceparum immiſit exemptis teſturlis, calli generationem cibis viſcidis acceleravit & ſic intra menſes 4. curatus fuit.

FRACTVRA cranij cum contuſione. Contuſio cum fractione cranij ſeu vulnere.

FRACTVRA cranij cum vulnere mening. Signa ſunt ſi ex ictu æger conciderit ſine ſenſu, auditu; ſi per nares, os, aures, oculos, ſanguis effluxerit, Si denique vomuerit: Si ſpecillo aſperitas ſentiatur oſſis: Si atramentum è ſola galla, ſi vitrioli acrimoniam metuamus, illitum & ſcalpris deraſum lineam reliquerit.

Diff. 1. fissura si adsit cum vulnere per dies 2. vel 3. opus naturæ committatur, radatur capillus, sanguinem sistens applicetur. Primo postea apparatu cutis musculosa cum pericranio, vitatis tamen temporibus & futuris secanda, à cranio revellenda & vel scalpro vel atramento investigetur fractura. Quo vero sis certior an fissura laminas geminas perruperit, imperandum ægro ut clauso ore & naso fortiter expiret: tum enim per fissuras exsudabit sanies cruenta. Tum linteis molliſſimis cum pulveribus cephalicis totum vulnus est implendum, doloris mitigationi incumbendum & ad 4. usque diem applicetur repellens è far. hord. & fabar. ana ʒ vj. ol. ros. ʒ iij. q. s. f. catapl. Secundo apparatu fissura scalpris est eluenda vel trepanon admovendum. Si parva fuerit unius laminæ fissura an studiose ad extremum usque sit eradenda, dubitat Senn. affirmat Aquapend. negat Celsus, cum Galenus moneat si fissura in longum porrigatur, ne ad finem eam prosequamur, in Europa etiam tam contumacia non sunt illa vulnera. Ossi raso nunquam humida nec unctuosa, sed pulv. cephalicos impone, nisi inflammatio in metu sit ob dolorem summum. Si meninges simul sint læsæ, osse aperto si non satis pateat, membrana detegenda, sanguinem sistens applicandum, imprimis celebre illud Galeni ex aloës p. una, thuris dimidia: ad dolorem instilletur

Abrantes Jung, vulgari Scriptoris, ejq
rerumoria inde, seu typogra-
phica explicatio & ol. Lin.
vid. J. C. Arantij; Hipp.
de Vrsk. cap. c. LXIIII.

De theriacj usu vid. nost. nostra ad
C. W. Cons. Egeder. III. vbi J. C. Arantij curatis; corrigendo
in memigothglace, cujs fig. ter
ap. Jo. Thed. à Mue Cen. Vis
vesal. lib. VII. p. 5.
Qter theriacj formicis et scpe ad
Euvid Pet. Marchetty Cons.
Cen. III.
ol. Asparitij Hispan. et suae aphone
capitis feliciter adhibiti mer
uerevid Fonseca tom. I. Cons.
LXXX. Cui tubij vbi offi
cula exhaberes, si collisio adsit,
sis mixtis sicuti ley
pgere, vt farin. fabar. cruj
c. oxymel. et ℔ Jreos ar
aristolochiae, aut empl. de be
tonica.

Arantij curatis; corrigendo
Paulj Aginetae locos, à Ja
F. Hildano et suis hoc
ptis, meliorj structura ex M
Cod. Gr. Bibl. Reg. ju
ng.

Vel dicunt ob calorē, qui gleabat
C. Porcelij; Haust. nat. c. LXII.

Garzarisuata vtilia obseruauit
Guil. Quarez, ea mortis
copiosa, per meningis-
d'Cotrich comparuit. P. M.
Regelij Ms.
Eruhina eadē ratione in principio
rejecit Jac. Berengarius Car-
pensis, vtpote ad salubritatē aspe-
ctum, vt loquitur, h. u. ad-
mittebat.

ſtilletur ſanguis columbinus qui etiam detergit, ad deterſionem mel roſatum cum ſuc. apii imo Ægyptiaco. *Matthiolus* unice ol. ovorum commendat. Vtile eſt oleum hyperici, maſtich. & ungu. cephal. quæ vide ap. *Senn.* terebinth. cum aq. vitæ ſuc. calamint, nepetæ. Multi duræ meningi ol. roſat. & alia humect. applicant quia roborat, fluxum prohibet. Alij ſola ſiccantia requirunt: quia tympanum & nervi ſiccantibus gaudent, item omnia ulcera: quia oleum nervos offendit: quia frigus nervis inimicum. *Senn.* diſtinguit: ſi membrana ſit alba, pura, illæſa, ſiccantia ſunt ex uſu ut mel. roſ. cum guttis iv. aq. vitæ: ſi vero membrana non plane illæſa ſit & inflammatio à dolore ſit in metu, utile eſt oleum roſ. omphac. deinde variat pro ratione temperiei: in mollibus & pueris ol. roſ. convenit; in robuſtis reſina abietis, vel ol. hyperic. admiſce: ſi ſicciot, plus reſinæ quam olei: æſtate ol. roſ. hyeme reſ. abietis. Dura mater ob aerem ſemper motum amittit & ſuperficies ejus in ſquammas reſolvitur, interdum cum fœtore quo inexercitati terrentur; ſed conſuetum, hoc eſt & ſuperficiale, eluitur mell. roſato. *Senn.* in hoc caſu in clyſtere præſcripſit rad. pæon. ʒ j. ſem. pæon. ʒ ij. Oſſis ſquammæ vi non evellantur ſed motus illarum, non lapſus, promoveatur; calli generatio promoveatur.

2. Contuſio, cum os deprimitur ita tamen

ut in multas testas non sit effractum. Revocatur cucurb. cum magna flamma, sed hoc fluxionem facit: æger ore, naribus clausis spiritum sursum exprimat, quod in pueris succedit, vel tenax emplastrum imponatur, vel attollatur terebello vel tripode. Ossa sine fine ferruminat empl. è gum. hederæ.

3. Effractura, cùm os in testas diffractum intro deprimitur, testulæ illæ eximendæ, vel rostris exscindendum os vel scalpris & volsellis cum malleo plumbeo est effringendum. Interdum os ita depressum in natiuam æqualitatem residit.

4. Sedes: cum concutientis vestigium ossi manet impressum: revocatur ut contusio.

5. Resonitus, cum vel pars alia, vel lamina alia findatur quam icta sit. Conjicitur, autem locus contrafissuræ si raso capillitio emplastrum imponatur è pice liq. cera tereb. aloe: hinc enim si quis locus tumidior, humidior, mollior, apparuerit, huic fissuram subesse verisimile est; adeo ut æger etiam tale nihil cogitans cogatur subinde manum ei parti admovere.

S. *Prognost.* Quatuor sunt fracturæ quibus decipi chirurgus potest. 1. cum fissura subest capillaris. 2. cum interna lamina findi-tur, exteriore illibata. 3. cum os depressum ilico in nativum locum resilit. 4. cum altera parte os ictum est, altera fissum. *Fab. Cent. 1. obs. 17.* In fractura cranij ira lethalis

fuit,

pharmaca. L. Beta.
V. L. sue [illegible] L. M. nonis
i clettora.
Refig. à Sennedauta.
Anodyna. Diuret. adstr.
Foly Sanguinis, Sod. alts. ol. ova. ol. lini.
Balneum Balneis Sederis. L. Sambuci med. ord. Camphor.

---

vim Pomonia. Ischiadicos.
Satyriasis Sonnij, rectij Epilepsij
affectus. Dolor abdominis.
Pars alta: Vlcus i gressus hodierni
cerebri.
Diff. à Salacitate
Cura: Dieta. Remedia. Diuretica
Sordes, Cibus.

fuit, *obſ.*19. actus Venereus, *obſ.*20. ſtrepitus nimius, riſus immoderatus, ſternutatio. *obſ.*24. aër religioſiſſime calidus ſit. *Fab. c.3. obſ.*22. familiaris eſt in vulneribus & contuſionibus capitis cucupha & rad. caryophyll. fol. fl. beton. &c.

An à FVLMINE tactum cadauer. Renuntiatio.

FVNGI. Sæpe è foramine per terebrum facto fungi emergunt, caro ſcil. rubra, fungoſa. Subjectum eſt meninx læſa. Cauſa vitioſi humores craſſi. Curantur vacuantibus, item Topicis. ℞. *Sabin.* pulv. ʒ ij. ochræ ʒ j. f. pulvis qui adſperſus eos conſumit. *Par. Fabr.* alium pulv. habet.

FVROR uterinus eſt delirium cum immani Veneris appetitu, ortum à ſeminis & uteri calore toti communicato.

Curatur refrigerantibus, V. S. purgantibus bilem atram. Appropriata, ſemen extinguentia ſunt, lactuca, nymphæa, ſalix, portulaca, vitex, ruta, anethum, ſem. cannabis, imprimis coralla, Smaragdus. Cuncta trita & teſtibus circumlita venerem extinguunt. Refrigerandum per interna & Topica. Aquam caſtitatis vide ap. *Senn. l.*1. *p.*2. *c.*10. *l.*4. *p.*2. *ſ.*3. *c.*5.

FVRFVRES ſeu porrigo, fit ab ichore ſalſo, bilioſo etiam. Habetur aliquibus pro validi cerebri ſigno. Nihil periculi portendit.

Curatur generalibus, Topicis, mollientibus: post detergentibus, ut urina, muria, decocto lupinorum cum fuligine, suc. scillæ. scarificatio, hirudines utiles sunt.

FVRVNCVLVS. Pustula.

GALLICA lues. Lues venerea.

GANGLIVM tumor est circa articulorum ossa quæ sola cute teguntur. Causa est nervi vel tendinis imbecillitas, ex ictu, labore; unde alimentum convertere non potest. Pertinet ad Scirrhos, non œdemata, ut strumæ. Differt ab atheromate tumoris inæqualitate & renitentia. Curatur generalibus. Topica sunt mollientia, postea ad calorem ganglium discutiens. appone vel manibus cystim rumpe: laminam plumbeam impone, seca, ure si liceat; in articulis non licet. Suppuratio procuretur si reliqua frustra sint.

GANGRÆNA der *Heisse brand*. prout sphacelus *der Kalte brand*. Fit 1. à frigore nimio. 2. à venenata qualitate. 3. prohibita transpiratione vel ab humorum copia ut in inflammat. 4. à calore externo nimio. 5. alimenti & caloris influentis defectu. Quæ causæ omnem calorem nativum extinguunt. *Signa*. Si à causa 1. præcedit dolor pungens, rubor, tandem frigus, stupor. Si à 2. Syncope, febris continua, delirium adest. Si à 3. dolor & pulsatio citra materiæ resolutionem & suppurationem imminuitur color lividus, fœtor. Pars si nigra sit, marmore frigidior,

℣. S. Cyprianę:

℞ S. Staphidis agriæ, Selenij, gentian. menthastri, prasij. ℥. de St. Jacobæ. Hydrargyri rosei minima, ℈ß.

℞ Hiᵗ cautione opᵒ ē, ne aerisa citiꝰ aut frequentiꝰ, aut ℞ impudenter dicere audeᵃ. Liceᵗ vim vulgare sophᵃ malevolentiæ

not scipi ℈ß seing.

ol. Serpent. tutch. S. anguis ℈ß Limonis ℈ß ol. Lavendulæ ℈ß libanoto.

Lotionꝭ cap. hujusmodi.

Liceᵗ (cerasi malevolæ, te

Cardiaca ... omittenda.

Ayuga pyramidalis: Sicaulis,
cal. d fig. VI. ag. Sebiz.
part. IV. sect. IX. c. X.
Spec. Rel. Pa- d J. J. à B.
Fauna Suec.

— absinth. O. 4. Junip.

O absinth. Card. ben. anis,
Scordij, centaurij min.
Cal. null. Caryophyllat. D: Stanny,
Hyss, Jen cedary, Jacea H!
anis solsch, Gentian. Scab.
Rej, Petasites.
H. Scordij, melissa, Rigan.
Calamintha, Rosmar. Salv,
reja, Salvia, Hyssop. artemis.
Sol, Fol. Lauri.
Fraxin. Laur. Lauri, myrti,
Styrax.
Sem. Foenic. Cari, Dauci Cret.
Cumini, anesi.
L. Sp. Sassafras, Rhodij.
Aloë.
O. Ogeum. O. Scabiosis.

gidior, molliſſima: ſi penitus nec ſentiat nec moveatur, ſi valde fœteat & ſanies viridis affluat, ſphacelus eam tenet. Sæpe tamen aliquis motus deprehenditur adhuc etiam in ſphacelo, cum ſc. caput muſculi illæſum, tendinem ſyderatum movet, quo ne fallamur cavendum.

CVRATIO. Vacuetur humor ſi adſit. diæta inſtituatur. Semper cor per in & externa roboretur. Si à frigore & nondum adſit gangræna, pars frigida vel nive fricetur, *Senn.* de gangr. poſtea theriaca cum vino detur ut ſudet. Vbi refrigeratio nonnihil mitigata eſt, lenes frictiones ex oleo amygd. am. & item fotus è lacte decoctionis roris marini utilis eſt. Si autem præſens ſit gangræna, ſcarificationes potius adhibendæ ut in ſeq. &c.

Si à cauſa 2. præter generalia, V. S. purgantia non valida, ſudorifera & cardiaca locum habent, & 1. Inciſiones ſunt faciendæ ſi ad os penetret, vitatis vaſis, vel ſcarificatio ſufficit, vel urendum. 2. lavandæ ſunt plagæ decocto acri detergente è ſcordio quod imprimis hic utile eſt, rad. angel. 3. ægyptiacum cum peniculis inſere plagis, toties donec caro mortua novacula reſcindenda ſit conſumpta; quod carnis odor, color, ſenſus indicabunt. 4. Toti parti catapl. defic. reſolu. eſt applicandum, 5. Supra partem affectam adſtringens.

Si à cauſa 5. Repellens locum non habet, niſi manifeſta adſit gangræna.

Si ſphacelus adſit, quidam in parte ſana ſectionem faciunt, quidam in demortua quod in hac ſymptom. ut hæmorrh. metus non ſit. *Senn.* diſtinguit: Si putredo non latius ſerpat ſed ceſſet, quod ubi fit, circa partem affectam circulus exacte rubeus & exquiſiti ſenſus apparet, ſectio fiat in parte mortua, alias non approbat *Senn.* Paræi modum quo ſanguinem ſiſtit, *vid. Senn.* Sæpe ægri diu pedem ante dies aliquot abſciſſum dolere querantur.

Datur quoque gangræna ſcorbutica, quæ incipit plerumque à cauſa interna abſque ulla cauſa manifeſta circa pedis extremum cum nigris & purpureis maculis, ulcere cruſtoſo ſicco, ſaniem non reddente. Vltra ſex menſes extenditur aliquando. Occupat tendines, qui non tam cito ac caro putreſcunt, cum dolore intenſiſſimo.

GARGAREONIS inflammatio. Inflammatio gurgulionis.

GINGIVARVM fiſtula. Fiſtula gingiuarum.

GINGIVARVM inflammatio. Tumor.

GLOBO inflictum vulnus. Vulnus globo inflictum. *vid. Clin.*

GONORRHOEA fit vel à retentrice læſa, ab intemperie frigida & humida, vel

ſemine

Gibber, dens ille pulmonis affectus.

Gingivarum putritus.

Gingivarum scolentia. Curat. Universalia antiscorbutica &
Scorbutici.

Gingivarum erosio & ulcera.
Curat. ibid., antiscorb. & siccantia ulcerosa.

Glans penis imperforata.
Malos. Curat. Circumcisio
quid. sup.

Glans non recta, sed sub
tus perforata. Vid. Hypospadiaeus.

Diff. ut a polluto nocturno:
ὀνειρώξις, ut κοίτασμα,
seu ἀποκένωσις ἀκάθαρτος,
gal: S. ἀφροδίσια ἄπλοα,
Sola.
Prog. fidelis, si maiores

Ol. menth.
Pastillin.
Vin.
Myrrhin.
Aromatic. Crabonis.
Herniz Ofz.
Vitz gulemens.

Vit. t pitrita Spermatica, ad dens
fiones seminis à partib. thippon.
I. Bapt. Sinibald, V. Genealth.
XIII.

Syr. fi Sepatic.
V Lumbric.
V ad gonorrhoeam Curic:
Amygala dulcib.
Bals. Nation c. ol. Limon.
Antidot. Diatessar.
Confect. Alkerm.
Antidot. Lanii. Melissophyllic.
Herniz Regiens Agaricator.

Vin. Canar. Ch. Jul. Dun.
Aqua arom. Syr. Mathiol.
Syr. e Corall.
Conf. Salviz cum ℔.
Pil. ℔. Cal. arom. ℔.
Cort. aurant. ℔.
Spec. arom. rof. ā cum ℔.
Diacydal. diamb.
Diacydon. c. Spec.
℔ Corall.

Vein equilcens ex rheumatismo fas
niolo, Sepè et ex diuturno. Vid. J
ex Geog. Virtungij Acta notabiliu
& recenfiu ex Syllogo ura obf.
Med. Epifagm. LXVII.

Caffia c. tereb. & Pulv. Oculo.
Emul. Sem. Cucurb. c. ℔ tereb.
℔ c. Cabalin. & Conf. malv. ā ā cum
altheæ, Veslingij expurgo.
Refina Guaiaci Renealmij.

Ott Semnolacis c. ℔ alb.
Lac tritum cum Asteriscus injecti.
Injectio alcalica.
Pulv. ad Statices D. de Sylacques,
R. Mf.
Theriac. vet. c. Conf. Hyacinthina,
Cath. Sennæ, & Croco ā.

semine aquoso & acri expultricem irritante. Sine sensu est. Si ab intemperie, corrigitur contrariis, imprimis aq. suc. menthæ, balneis adstringentibus, siccantibus, per generalia & Topica. Distinguendum tamen accurate, an semen an humor pituitosus effluat. Diæta sit siccans, calida. Facit tabem dorsalem quæ cum gonorrhœa semper est

GONORRHOEA Venerea est inflammatio parastatum ab impuro contactu cum saniē acri, dolore, ardore urinæ, tensione penis, quæ vel per decennium durare potest.

CVRATIO. In principio refrigeretur & humectetur, per clysteres, lenientia, V. S. generalia, Topica. In declinatione adhibeantur resolventia, ut terebinthina. Si inter mejendum intolerabilis sit ardor, urinam reddat demersâ mentula in matulam lacte vel aq. tepente plenam. Si ulcus fiat, detergentia injiciantur, ut aq. hord. sir. ros. aq. plantag. mell. ros. *Paræus* addit sæpe ægyptiaci modicum. Cicatrix inducatur injectione siccante & adstringente. Si frustra, ad Guajacum recurre.

GVLÆ obstructio. Obstructio gulæ.

GVLÆ paralysis. Paralysis œsophagi.

GVRGVLIONIS inflammatio. Inflammatio gurgulionis.

GVRGVLIONIS procidentia. Procidentia gurgulionis.

GVTTA rosacea. Aliquando rubedo præter naturam absque pustulis, vesicis vel vlceribus adest, aliquando cum pustulis & vesicis, aliquando cum ulcere, quæ postæma etiam *noli me tangere* vocatur. Inficit præcipue nasum, † ideò sæpè valdè increscit.

CAVSA: sanguis fervidus crassus, vitio hepatis genitus, qui ob crassitiem nec remeare nec discuti potest. Difficulter curatur.

CVRATIO. Sanguis refrigerandus per diætam, V.S. cucurb. scarif. & generalia, purgationem humoris biliosi.* Topica sunt aq. omnium fl. quæ destillatur è stercore bubulo, facies prius vapore aq. tepidæ molliatur. lac virginale. aq. lil. alb. Sigill. salomon. fl. fabar. &c.

GVTTA serena. Oculi vitia.

HÆMOPTYSIS. Causa est ruptura vasis, quę cognoscitur ex multi sanguinis fluxione & confertim facta, & ex causa procatarctica, ictu, lapsu, ira, tussi valida. Vel erosio: tumque præcessit destillatio acris, vel esus acrium, tristitia: particulæ ejiciuntur cum tussi, sputa cruenta per intervalla tantum ejiciuntur. Vel anastomosis & non confertim sed paulatim sanguis modicus ejicitur, ut à venere. Reliqua signa absunt.

CAVSA remota est consuetæ vacuationis suppressio, lienis, hepatis vitium.

Subjectum. Si simplici exspuitione excernatur, è gingivis est; si per exscreationem, è fauci-

Gulæ inflamao.

Gula siccitas

Gula tuberculum s. tuma.

Emuly. Nucl. ffic. d S. Cardiaca.
Dth bulb. til. alb.
Pin. thymall. c. rad. polygonati.
Lig. Li. ac Virginis.
Bulbus Li.

Cæ: aragonum, diacicer, cyper,
diaspermi.
Ad quas refert debent th
Varicas pulmon, à th 33
tuma, adfect, et rang.
Vid. Hufn. Catalpin VI.
art. Med. c. XV.

I. A
I A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

faucibus; ſi copioſus vacuetur & adſint capitis affecti indicia, è capite; ſi vomitu è ventriculo; ſi tuſſi, è pectore.

S. Diagn. Si tuſſis ſit longa, è pectore oritur ob viæ longitudinem: ſi brevis, ex trachea: ſi mediocris è pulmonibus. Sanguis nigricans, grumoſus, interdum & fœtidus è pectore prodit. Spumæ ſimilis ex rubro albicans, è pulmonum ſubſtantia. Sanguis paucus ex trachea. Dolor obtuſus vel nullus pulmones affectos indicat, dolor magnus pectus.

S. Progn. Hæmoptyſis è pectore periculoſa, è pulmonibus magis, ex aſpera arteria minus: quia vaſa pectoris minora ſunt & ſanies in thoracem effunditur. Peſſima eſt ulceratio, minus mala ruptura; apertio facile curatur. Vlcus pectoris curabile, pulmonis non.

CVRATIO. Si fiat per rupturam, apertionem, unica eſt indicatio conſolidandi & ſanguinem ſiſtendi. Ergo ſi à tuſſi rupta ſit vena, ſuſpendatur omnibus modis catarrhus. Vide catarrh. poſtea ſiſtendus ſanguis per omnis generis revulſiones, qualitas ſanguinis excedens temperetur, bilis purgetur per mitiora, vitanda aloë & ſcam. omnibus medicamentis mel miſceatur quod vias aperiat. Poſtea ſolidandum per ſir. de Symphyto *Fern.* quem vide apud *Senn.* ʒ iv. ſuc. urticæ per dies 6. mane ſumatur, lap. hæmatites ʒ j. cum

aq. vel ſuc. polygon. Trallianus dat ℈ iv. datur in rotul. elect. infuſ. donec menſtruum rubeſcat. vide hæmorrhag. ſi omnia fruſtra, laudanum opiatum exhibendum vel aliud narcoticum. Chamædryos diuturnus uſus utiliſſ. Crato ep. 184. *Rul.* ſem. urticæ, *Manard.* rad. lappæ laudat. Si ex eroſa vena pectoris pus effluat, vel etiam ſputum cum ſanguine, curatur ut phthiſis quæ ab eroſis pulmonibus fit.

HÆMORRHAGIA critica. Criſes.

HÆMORRH. narium. Cauſa eſt vel anaſtomoſis: vel copia ſanguinis & adſunt ſigna plethoræ: vel irritatio expultricis ab humore acri & tum ſigna adſunt cacochymiæ: vel retentricis imbecillitas & tum ſæpius ex intervallo ex leviſſimis cauſis fluit ſanguis; vel ab externis ut irritatio, titillatio, illitus calidorum: vel diæreſis, vel diapedeſis ſi ſanguis ſit aqueus, ſi pituitoſa cacochymia infeſtet.

Diff. Fit vel è venis narium vel craſſæ meningis tertij ſinus, & tum ad revulſionem Topica occipiti applicanda monet *Bauh.* ſæpe ex arteria fluit. Critica non eſt ſiſtenda.

Progn. Melancholici & pituitoſi eam difficilius ferunt.

CVRATIO. Si per anaſtomoſin à plethora, ea eſt tollenda & ſanguis à naribus revellendus per V. S. è directo & fiat foramen anguſtum, detrahatur per vices ℥ j. ℥ ij. vel etiam

Oxyerath cum ff. S. Gdon. prepar. alb. d Sumach.

Prisma plantaginata.

Dett Simellon d mastich d. de St. Jacques. Ms.

Dett Chius c. fo. Limon. Fonseca l. c.

Dett L. S: d Lentiscini c. Sandalino.
Idem d. Camerario, d Butch Silvestrig.

Syr. plantag. c fo. comfos. Argent.

Loes Typhlis c. Saccharo. vos.

Philon. Persic. c. bolo Armen. pl.

Pastillos c. Diapendio Matth: Gradensis.

Gummos pris dissolvich attenuantib
d incidentib.

Pothema sfolid antia. l. Syphia
d Emplastica
qd. lig Euchir.

Oxymel. Squillit. c. Gum. Arab.
ij fl. aedach. Theophil.
Kentmann. R. Ms.

St. Lentisch Oach Zad.
grav. Ms. d Jo. Bapt.
Thelij expush.

Tragema albin Argentinens:
Cap. semat. Syl. d
Polo Syl. ad Lentiscini pt.

Purgantia. qvid. sint tria, Cholagoga,
Melanagoga, d Onthagoga.

Revellentia d derivantia.

Lenientia Revendata Detinta.

Expurgata Exterenda.

Tabula ex facino.

Dispnoeæ frigidæ.
Hypochondrij fomentatio fuj.

Conf. Syncinth. Hemathitica et
opiata e Plantag.
et Cinq. Cort.

Plantag. Cort.

Et l.
Fluxus dysenteria manifesta docent
ta gelo.
Astringentia, refrigerantia,
refrigerantia s. emplastica.
Fuj drac. compositi fortiter
Croc. et Cl. Corall. Coelestin.
Laudan. Opiat. Philonia.
Isterica Hyp. adstring. Hepatic.
e rosis ficus, myrtin. Hodon.
Cons. ros. rub. Cort.
myrtin. fl. Cichorij.
Cons. Lactuc. Hyp.
rad. Cichor.
Succharin.

iam ʒ iv. per cucurbit. ventoſ. ſepati applicatas, quæ tamen inflammationem ſepatis excitarunt. Melius ſiſtunt ſi pedi è directo applicentur, imo ambobus ſi ſanguis è nare utraque ſtillet, ea tamen cautione adhibita, ne diu in eodem loco maneant, ſed antequam deliquium animi ſuperveniat, detrahantur *For.* ſcarificatæ ſuris, ſcapulis applicentur, ligatura dolorifica artubus injicienda. Frictiones cum ſale & aceto fiant. Non niſi revulſione peracta per Topica & interna ſiſtatur ſanguis. Interna ſub quavis forma. *For.* ſtercus porcinum bolo arm. mixtum, ne agnoſceretur, exhibuit. Seq. etiam incurabilem fere hæmorrhagiam ſtitit.

℞. ſem. portul. plantag. acetoſ. endiv. papav. albi ana ʒ j. rad. conſol. maj. ʒ j. coq. in aq. ſ. ad ʒ ix. colat. adde ſir. myrt. granat. papav. nymph. ana ʒ ß. m. ſuccus urticæ & ſemen. lap. hæmat. Vltīma anchora ſunt narcotica. Seq. *Heurnius* in ſecretis habet. ℞. Sem. pap. alb. ʒ ß. hyoſcya. alb. ℈ j. lap. hæmat. ℈ j. corall. rubr. ʒ j. m. f. pulv. cum conſerv. roſ. ʒ vj. pro una vice. Idem ℞. aq. urticæ ʒ j. pulv. cran. hum. ℈ j. m. ſuc. urt. portul. plantag. millefol.

Per Topica. fimus porcinus naribus applicatus, aq. gel. carpis manuum affuſa ſi febris adſit. Os repletum teneatur aq. gelida, ſi quid naribus attrahitur, quod perpetuum eſt. ſuc. urtic. plant. naribus indantur, anacolle-

mata item, epithemata, fotus, cinis chartarum alb. in nares mittatur. Fruſtum cretæ annulari contentum è directo. Teſtes foveantur frigida, ſpongia oxycrato imbuta axillis ſubmittatur. rad. pæon. linguæ ſubjiciatur. lapis carpion. ore detentus. radix nigellæ maſticata naribus appoſita. Thalerus Imp. fortiter intercilio applicatur loris. Fl. Bellidis min. manu detentæ. Iidem intra ſumti ſanguinem concretum promptiſſ. reſolvunt. uſnea. aq. ſperm. ranar.

Si à materiæ acrimonia, purgari bilis debet & temperari.

Si per diapedeſin, humores ſeroſi purgentur. decoct. ligu. cibi ſint incraſſantes, &c. *Heurnius* primo utitur cucurb. ventoſ. pedi, epati appl. poſtea & ſecundæ cervicis vertebræ: deinde fricț. ligat. poſtea V. S. tandem Topica & interna. Muſcus ille crepitus lupi dictus.

HÆMORRH. vulnerum. Fit à ſolutione continui Venarum & arteriarum. Difficilius curatur, ſi arteria ſecundum longitudinem vel oblique ſecetur, quam ſi transverſim diſſecetur. Sæpe enim medici ſuadent, ſi ſanguis ſiſti nequeat, ut arteria transverſim diſſecetur.

CVRATIO. Adhibitis quæ ſupra dicta ſunt, primo vulneris vel potius vaſis orificium eſt occludendum, vel compreſſione digitorum, donec thrombus concreſcat, vel

cum

Ech. Prentzetij.
Stæniola Compos. rotlij.
℥ subtilitz obvoy rec. expulsoy.
℞ Sem. cam. c. Oetz ij.
Rad. Agnotij, tormentilæ: Vtric.
millefolij.
Scrophular.
Centinodij.
Graell. fil.
Linimentu gallar.
agnotichum.
Turis et telar. aran.
Frontale ℞ Hyos. alb. Oij: et aro calleno ad Sphagnides ex cod.
Oxycrat.
℥ argillacey G. Mastichis ℳ.
℞ succotrin ℈ ij mirabol.
Epithimum ex regnia anbricata. ℔ß.
Epithapsia ex fol. scrophul. Betonic. Lauri. Salvatic.
Hypomastidesia ex ℥ buforum. Xerophagia abstergentia.
Ligatura fichinis Gerundæ. Pediluvia dulcificantia.

mata item, epithemata, fotus, cinis chartarum alb. in nares mittatur. Fruſtum cretæ annulari contentum è directo. Teſtes foveantur frigida, ſpongia oxycrato imbuta axillis ſubmittatur. rad. pæon. linguæ ſubjiciatur. lapis carpion. ore detentus. radix nigellæ maſticata naribus appoſita. Thalerus Imp. fortiter intercilio applicatur loris. Fl. Bellidis min. manu detentæ. Iidem intra ſumti ſanguinem concretum promptiſſ. reſolvunt. uſnea. aq. ſperm. ranar.

Si à materiæ acrimonia, purgari bilis debet & temperari.

Si per diapedeſin, humores ſeroſi purgentur. decoct. ligu. cibi ſint incraſſantes, &c. *Heurnius* primo utitur cucurb. ventoſ. pedi, epati appl. poſtea & ſecundæ cervicis vertebræ: deinde fricț. ligat. poſtea V. S. tandem Topica & interna. Muſcus ille crepitus lupi dictus.

HÆMORRH. vulnerum. Fit à ſolutione continui Venarum & arteriarum. Difficilius curatur, ſi arteria ſecundum longitudinem vel oblique ſecetur, quam ſi transverſim diſſecetur. Sæpe enim medici ſuadent, ſi ſanguis ſiſti nequeat, ut arteria transverſim diſſecetur.

CVRATIO. Adhibitis quæ ſupra dicta ſunt, primo vulneris vel potius vaſis orificium eſt occludendum, vel compreſſione digitorum, donec thrombus concreſcat, vel

cum

Ech. Prentzsty.
Spiniola comp. rotlij.
℥ subtilitz obos rec. expulsorz.

℈ sem. cam. c. Oetzj.
Rad stegnolij, trachmatij: vlcer.
millefolij.
Semperiu.
centinodij.
gruell. fil.

Linimentz gallar.
agnotichz.
Pulv. d telar. aran.
Frontale ℈ ß ℔ o. alb. Ovj: et ana collema ad sphagitidez et co
oxycratz.
℥ argillacez G. Mastichj Mj.
Rad tormentz ℈ ij pulv.
Epinictium ex resina subacta. ℔.
Epicrocis ex fol. scoriz Cupr. Sodz Liberatig.
Hypomasthalesis ex ℈ butyri. Xerospongia abstergentis.
Ligaturz fictilium operandz. Pedilavia dulcificatia.

cum hoc in arteriis locum non habeat, in quibus ſanguis non concreſcit, & raro in venis, vas digitis aut med. obſtruatur. Commodiſſ. eſt fungus crepitus lupi dictus, vel Gal. illud tritum. Intercipientia ſupra partem affectam ponantur. Si fruſtra, *Par.* jubet vaſis oſculum radicem verſus acu filove cum carnis tanta portione quantam pars permittit comprehendere ac vincire, cui fini cogimur aliquando cutem, quæ vas illud tegit, dividere ac tarde vinculum reſolvere. Quod ſi hoc partis non ferat conditio, eſcharotica, quæ cruſtam inducunt, adhibenda, quæ improbat *Senn.* & potius eorum loco vitriolum laudat, quod non niſi uſtum cauſticum eſt, crudum v. vehementer adſtringit & parum urit. Quidam pulv. crudi vitrioli inſpergunt, alij commode in liquorem diſſolvunt & adhibent, niſi nervi ſubſint. Interdum vas in lucem protractum cogimur reſcindere, ut moles partium extremitatem ejus comprimat. Quidam ineunte vere, cum ranæ ſperma primum projiciunt, accipiunt craſſioris linei panni q. ſ. hoc ſpermate ran. ſæpius lavant ſolique ſiccandum exponunt, idque ter quaterve repetunt & ſic ſiccato linteo tempore uſus præciſam partem vulnere duplo majorem vulneri imponunt.

HÆMORRHOIDES Ani externæ duæ ſunt, interna à vena porta una. Diff. Sunt vel apertæ vel cæcæ in ano vel inteſtino

vel ſphinctere. Cæcæ ſunt vel veſicales à pituita, vel verrucales à ſanguine melancholico, vel uvales, vel morales mariſcæ dictæ. Dolor non eſt in venis, quæ ſenſu carent, ſed partibus vicinis à diſtenſione.

CAUSA. eſt anaſtomoſis Venarum à ſanguine craſſo aduſto. Purgantibus validis ut aloe, irritantur: quod qui negant, ſcutica digni ſunt. Internæ non niſi ſpeculo ani explorantur.

Pr. aph. 11. *ſ.* 6. In dolore hæmorrhoidum, niſi mature ſuccuratur, inflammatio vel ulcus fit. Cœcas tumentes, niſi maxime tumeant & magnum dolorem inferant, præſtat naturæ committere, quam aperire, magnæ effuſiones à V. externa fiunt.

CURATIO. Cœcæ ſi tumeant, ut vacuetur ſanguis danda eſt opera, frictione aſpera facta, fol. mercurial. pariet. borrag. frig. ſuc. betæ, cyclam. centaur. min. ne autem dolor excitetur, anodyna addantur. Ol. Samb. & liquor qui è flor. verbaſci inſolatis in vitro fit, mire confert dolori ſi illinas. Scrophular. chelidon. minus extra, intra mire operatur.

Si vero magnus ſit dolor & inflammatio metuatur, V. ſecetur in brachio, poſtea etiam ad malleolum, ſi non ſedetur, hirudines poſt V. S. applicentur, quibus elapſis fluat ſanguis donec ſponte ſiſtatur, vel æger ſuper balneum aq. calidæ ſedeat, cuius vapore ſanguis movetur,

Diff. magnæ, parvæ, mediocres.
linæ, ternæ, quaternæ, plures
pauciores. Internæ, externæ.
ficiales, Vvales, morales, vlcera
les. Genitæ, à vlcera vera,
& à vlcera falsa. Dolorificæ,
indolentes. Febrosæ & sanio-
sæ, vel ichorosæ. Melancholicæ,
cacochymicæ, deflexionem facientes,
pleiosæ. Cœcæ S. clausæ, vel
fistulosæ.

Curare, una salute apta seruanda.
VI. apta. XII.
Manibus solvunt. VI. apt. XI.

Vid. Valerianæ.

Ol. Mundicæ.
Cryſomelæ Linæ.
vid. Salicis.
ex tom. amoris R. Lindanæ & Al. Helichij.
Qui ex tonsi codicc. Jacobæ. A. Gasseri.
Vnctio popularis c. cal. & pinq. gallinæ. Crocata. C. Hoffmanni.

Dels Cathc. Scabca. Carican. c. Ol
ℏ.

V fl. Tuffilag. ol. ros.
Jambuj. Viol.
Scrophularia. Jasabuj
Cynoglossa. Nymph.

Vesto ros. ol. Verbasj.
Popeles. N. Jud. c.
alabastrites. aurg.),
refjeram gal.: vitell. ovi.
Cynoglossa.
Scrophularia. ℏ.
anodyna.

Lil. Alböticg. Linaria c. vitello ovj.
Narcissus. Cremor tartari cj in aceto Bory
ℏ
Hirudines.
Aphis c. Scalpello intuita.
Fuchsius ab. c. fol. fcg.
Ab fi lectz Galenicus.
Centaur. min.
Aung. Polekey Cyperus gal. Cremor tartari cj in aceto Bory
Enemata acria c. thiem
Diacologuttid. d.
Rute & Osypis.
Turundy alöticg Sellerosus.

Bally. ℏ Rid.
Butyr Scrophularia.
Verbasj.
Linckey Solanj. hucusj.
Ping. Gallin. pomata Crocata.
Butyr ros. c. Catanin. ℏ.

vetur, vaſculo aquæ innatante quod ſanguinem excipiat, vel cornicula extrahatur. Dolor ſedatur anodynis refrigerantibus injectis & applicatis, humectantibus etiam; imprimis ol. viol. etiam ad ʒj. injectum. Quædam ſuberiſ ligniei cinerem cum vitell. ovi & ol. roſ. ſubactum appoſuit pro miraculo. Sectio tuta non eſt, quia facillime fit ulcus. purgatio à hiera ardorem & tumores in ano ac hæmorrh. ciet. *Solen.* item fricț. part. infern. ſuffitus è matric. cocta in vino. *Idem.*

Si vero nunquam fluere conſueverint, nec ſpes ſit eas fluxuras, danda opera (præmiſſis forte generalibus & purg. ſec. *For.*) ut exſiccentur per digerentia & exſiccantia, ut bol. arm. verbaſc. ſcrofular. plantag. milleſ. hyperic. ſcabioſ. cynogloſſ. rad. chelid. min. ſub forma fotus, inſeſſus, vaporis. Fumus ſulphuris. Capæ cum butyro coctæ. *Amatus* cum cætera eſſent fruſtra, pomum arantium excavatum ol. roſ. & ſem. lavendulæ impletum ad cineres calidos admovit, calide applicuit & ſæpe renovavit. Si parcius fluant, viæ molliendæ, danda aloe. Si nimium fluant, curandum revellentibus, alterantibus, adſtringentibus. Præſervatio fit per purgantia &c. *Rulandus* ſibi ipſi ſtitit applicatis alternis ſacculis rubr. & contuſis glandibus vel fol. quercus in aceto diu coctis.

Obſervavit *Senn. Plat. Fern.* ſæpe è podice ſine ſanguine & dolore mucoſas & ſubal-

bidas ſordes, quas falſo nonnulli pro pure habent, excerni multo tempore, poſt longos morbos melancholicos, equitationem. Materia è ſanguine corrupto fit, ut in fluore muliebri, albumini ovorum ſimilis. vid. Topica.

HÆMORRHOIDES Vteri. Vt in ano ſic & in uteri cervice fiunt hæmorrh. ſi venæ in illo loco diſtendantur: exploran-tur ſpeculo. vid. Gynæca.

CVRATIO. præmiſſis generalibus dolor quovis modo ſedetur per inſeſſum, &c. Si dolor abſit vel mitigatus ſit, ſi ſanguinem non fundant, ſed tumeant, ſolummodo veteres eas ſcarificabant, ſed potius digerentibus & ſiccantibus ſiccentur. Si valde turgeant, ut vacuentur danda opera, per mollientia ſub forma vaporis, & frictione, appoſitione hirudinum: ultimum eſt ſectio, quæ tamen eſt periculoſa.

Dolent ac ſolo dolore à menſtruo dignoſcuntur.

HEMICRANIA. Dolor capitis.

HEPATIS inflammatio. Inflammatio hepatis. Hepatitis.

HEPATIS obſtructio. Obſtructio hepatis.

HEPATIS ſcirrhus. Scirrhus hepatis.

HERNIA inteſtinalis. Cauſa proceſſus peritonæi vel ruptura vel laxatio. # Prius negat *Fab. ep. cent. 3.* annexa. quia in aneu-

Κήλη. Rami: Ἔντερος.

riſmare,

Hæmorrhoides narium.

Hæmorrhoidis curatio Dr. H. d
vall. quæ sunt post Universitatē.
ad l. acinis Lentiscinis, et Solani vel,
Ficarij Lauræ siccatis.
Amygdalarum Cranmochyso mixtæ Rob. Boyle.
Infectis Glosteorte Cremio Phi.

Cum eo vix differt à veris Hæmorrhoidibus, sive fluant, sive
secus fluāt.
Omnia sodij c. vino Phi.
Pinj. ardej Bellarij c. Cynosbodijs.

Hepatis ulcus. vid. vlcus.
corrosio. vid. vlcus: et stomach.

Hæ à cui externis et internis; sensibus,
gustatione, casu, egestae diriorij,
vomitu violento, tussi ferina,
oneris gestatae vt elevatae, partu
laborioso, fœtus inhumanus difficili
operatione, Vociferatae, tubæ
inflatae, spy cohibitione.

Thomas Gl. d Glasdisputientia
Jun. d ficta ad Stbenda.
Vid.: Ma ag. J. J. à Brunyk mat.
mes. Vt d custodientia, qz
aby fiunt Catapl. d Enemata.

riſmate, exomphalo, varice, arteria, peritonæum & vena dilatatur : quia in ſectione herniæ conſtrictio & ligatura illius proceſſus fieri non poſſet, diſruptæ enim partes diſtrahuntur.

Sign. Tumor durus modò magnus modò ferè evaneſcens in ſcroto digitis preſſus remeat cum murmure & dolore : ſi rumpatur peritonæum, ſubito oritur, ſi laxatum, ſenſim. Sæpe teſtis naturæ ignavia in inguine reſtitat, dolorem, tumorem faciens, heruiam mentiens. Curatur ſaltu, &c. Epiplocele ſine dolore & murmure intro pellitur.

CVRATIO. Inteſtinum reponendum : ſi ob flatus & fæcum duritiem reſtitui non poſſit, violentius non ſunt impellenda, ſed prius applicandum molliens reſolvens. Si fruſtra, clyſter reſolvens injiciatur : ſi etiam hoc fruſtra, conſenſu amicorum in ſcroto facienda eſt ſectio, ut peritonæi ruptura major fiat. Sic repoſito inteſtino peritonæum ſutura claudatur. Si flatus ſint à pituita, difficilis eſt curatio, valida enim diſcutientia flatus augent, in quo caſu quidam ol. amygd. dul. dant, tutius glandes & clyſteres pituitam educunt. Sectio de qua ſupra, rariſſime prodeſt. *Senn.* ſæpe homicidij ſuſcipicionem medico facit.

Continetur repoſitum inteſtinum ſubligaculo.# Diæta ſit conſolidans, adſtringens. Interna quoque talia. Poſt videndum ut alvi excrementa ſint mollia. Quoties alvus red-

ditur, manu cohibenda inteſtina. Supinus per aliquot dies in lecto ſe contineat. Topica ſint ſymph. maius, ſanicula, jacea alba & nigra, Sigillum Salomonis, pentaphyllum, Tormentilla, nuces, cupreſſ. filix fœmina, piloſella, perfoliata, herniaria, herba Hollerana dicta, quod Hollerius ſcribat ſuccum ejus herbæ per 9 dies cum vino rubro potum hernias perfecte curare. rad. caryophyllat. è quibus interna fiunt ſub quavis forma æque ac Topica. Curatio per punctum aureum, ut vocant, fit modis tribus, vel cum filo linteo, vel virgula plumbea, vel virgula aurea. *Par. l.7.* Caſtrationi *Pareus* nunquam ſubſcribit, niſi vel gangræna vel ſarcocele eos invaſerit, *Platerus* alium modum habet, quo citra ſectionem herniæ curantur. vide *Senn.*

HERNIA inguinalis. Tumor rotundus in inguine qui facile intro pellitur.

CVRATIO. *For. l.27.* eam curavit eccoprotico clyſtere, fotu molliente & reſolvente, repoſitis inteſtinis: locus inunctus eſt ol. ovor. myrt. hyperic. ana q. ſ. mox per plures dies ceratum contra rupturam applicat & ſubligaculum. Potus erat cereviſia infuſionis conſolid. maj. cum ſacch. vel claretum decoctionis rad. conſolid. ſigill. Sal. glycyrrh. ana ʒ ß. herba valeriana, nepet. conſol. min. oſmund. plantag. fl. roſ. rub. ana m. ß. ſem. aniſi ʒ j. [alij dant flores calendulæ cum vino ex ovo ſorbili:] quidam dabat pulverem ver-

mium

Ligua vesicul. Ulmeas.
ol. ℥ anthus D. Sigleij ℥ij.

Vnc. Crassule Theophylli Marchi Cumani.
Symphyti Simonis Latij Med. Vindobonensis & A. Gazæi.
Magnetis Episcopi. Grossij ep. th.

Jutera: Pempelij c. bñ. ℥ adianti nigri ℥ 40. ℔.
Vini Michaelenij. alchemillæ ℥ pancrini ma
Lagoctonia cr. Teto gsolitæ maj. ℥ rad. Filipendulæ. ℔. Carl
Bet tyrolæ aratæ. M
Rhizoph. & muscj albi Sponsiadæ.
rad. Cichorij albi Cunitiles.
pulsatillæ, rubiæ tinctor, aristolochiæ.
Hypoglossi. Virgaureæ, agrimoniæ,
Lunariæ bolbyti, gsolidæ saracenicæ.
fragariæ, bucaphicæ, Tussilaginis,
eupatorij Avicennæ, filicis sem.
tab. querc. ℥ij. Cinabolythrij
Mann:
fl. Tussilaginis. Sem. Psoliatæ.
Galliopsidis. Osteocollæ.
Hæmatitis.

Nos e alia ℥ij curan. ℥ intestinalis,
ij spec. n. lacatis emplastræ
pictonej ℥ aggitis intestina
plabitat. in ferotin, ij illa
vesic. anteriora magis, ℥
vaginæ deutr.

Ol. ℥ anthos Argentinensis.

#Vulgò sic dicta: à relatione anteriori tunicæ Uveæ. Vocatur vena P. Barbette R. Med. lib. IV. c. X. Juncta cum ad stringentibus. Gangrenas diuturnas explendas

#Nos seng to, plerumq; n. ginng
ig aquosa: Hydrophthalmoides
ὑδροκνεφαλοκήλη.

Plerumq; junguntur ventosis
d: dg: ὑδροφθαλμοκήλη.
Interdum et carnosis, dvocatur
ὑδεοβαλκοκήλη.

#Juxta per arteriam postic: aut oc
rig per basin labiri Superalendant
Diff. Cantinck vt inter Scotch &
Dantzig: vt inter dantzig dels
tronden: vt inter Gouw & alkm
Juicen. ὑστεροφερής, δεύτεροφερ.
ä: Externe: Compasmentes, alli,
dentes, sentientes. Justemq:
vitæ vitia.

mium terr. *For.* feliciſſime utitur rad. Sig. Sal.

HERNIA uteri. Non occurrit apud authores. *Senn.* Vnicum habet exemplum. *Doringius in Epiſt. ad G. Fab.* adhuc duo recenſet. Fit cum uterus in inguen decumbit & ibi ſenſim accreſcente fœtu in majorem tumorem attollitur. Curatur ſola ſectione.

HERNIA ventoſa. *Sign.* Tumor ſcroti ſine pondere aut gravitate cum ſono. Facile curatur.

CVRATIO. generalibus flatum & pituitam tollentibus, Topicis reſolv. ſectione non curatur.

HERNIA aquoſa. Sæpe ſequitur hydropem vel comitatur potius. Rarò in ſcroto generatur, defluit per venas à renibus. Cum unum latus ſaltem affectum eſt, nunquam teſtis dexter, ſed ſiniſter, ob materiam ſpermaticam laborat.

S. diſtinguitur à Sarcocele ſola pellucidi-tate, tumor in abdomen ſe non recipit, licet prematur. Si in ſcroto ſit, teſtes tactui occurrunt, ſcrotum tumet. Si inter erythroidem tunicam, tumor eſt ovalis, teſtis viſum & tactum fugit, ſi in uno tantum latere ſit tumor.

CVRATIO. Si ſiniſter teſtis laboret & non ſiniſter vitioſus ſit, vel plane à cura abſtinendum, vel ſcrotum tantum in inferiore parte incidendum, ut ſeroſus humor effluat,

quod ſingulis annis in ſexagenario feliciter fecit *Griffonius ap. Fab.* Si renes non laborent, aqua vacuatur vel inſenſibiliter per reſolv. & diſcutientia: ſi fruſtra, præter univerſalia ſcrotum ſcalpello aperiatur ſi in ſcroto hæreat aqua: ſi in tunicis, tutum non eſt. Si cum hydrocele caro circa teſticulum concreverit, ut in ægro *Fabr.* caute tractetur, *cent.* 4. *obſ.* 65. reſcindatur teſtis, ſi fieri poſſit, ut & ſi ab aqua teſtis putreat, quod ex fœtore & odore ſcitur.

HERNIA carnoſa raro in ſiniſtro latere oritur ob vas ſpermat. Fit è ſanguine craſſo ut verrucæ.

S. Tumor durus ſine inguinis tumore ſenſim auctus, figura teſtem refert. ab Hydrocele pelluciditate dignoſcitur. Iuvenis cum ob amici ingreſſum in coitu ſemen retineret, Sarcocelen incurrit. *obſ.* 64. *Cent.* 4.

CVRATIO. Vniverſalibus præmiſſis, in principio repellentibus utendum, poſt ſiccantibus vel chirurgia, qua totus teſtis eximitur. *For.* aliquot curavit. Qui cacochymum, imbecillum, ſenem, aut guloſum præſumſerit curare ſectione, manifeſtiſſimè deſiderat homicida vocari. Suadent autores tutius eſſe non aggredi curam. Pulvis rad. ononid. ſumtus, utiliſſimus.

HERNIA varicoſa, ramex varicoſus ſeu cirſocele eſt varix: tactu & viſu exploratur.

Catapl. ex farin. faber. oroh; c. Vin. d. ol. Laurin. rut. —
S: testis corrupty affs foveat, sectione — vaisi, focus c
curary debet, & alitea ung pt.
V:d. Marcelly Curary obs. X. c.
vestis uris.
Empl de Ac. fuli. Bets Med. Ay.
Cerat. ex f. Carang et Sem. Hydrocarbany. expusto Jo. Rewo

[Rao valde obscura! [ob Var Grmatis?]
Sed u. hoc e dicere? Et vasa in
utroq latera Grmatica Hgue
peria, ut in sic suis gelid; fuerat.
perilla a. ng intelliger venas
tub, sed & arterias, & lymphas
ductus, & denig & nervos, ad
uri [cali eptian unctio, &
vett. erat, accurationem.]

Cerat. [averda Suppuranta & emollientia.
Empl Diapalm ex Unis: expusto Matthioli. Com. 3 III. Diosc. c. X
& lentiny ℥ i.

Catapl. ex alb. farin. faber. — A. Gaffery.
Et hodie Capun.
Sufficit farin.
Empl & melilot. Caricatur.
Fodicans alter Paracelsi: expusto Guil: Quarej ay. F

Klebotky Ay. [Non differt à varice, nisi loco s. parte affa
Cat. Sive venas dilatans copia &
Graffitic: aliqua sanitas, nec
cessitas, aliqua est ignorita,
Etymologia, significatus, Scatus,
Testicul: frequentissime in Juris

Repellentia, absorbentia, adstringentia.

Ol. lil. alb.

Balsama mollia.

Empla emollientia: Diachylon c. gum. fil. Saxon.

Epithemata resolvere et calefacere.

Spiritus c. sacc.

Calef. gfolet. maj. e regione resolvit. A. Gaffery.

Empla, tolo &c. d pomphol., ge in Lth. HR.

CVRATIO. *For.* præter generalia empl. de mucag. & ammon. applicat. *Parœus* ſectione curat ut varices. *Senn.* hanc periculoſam ait & teſtes potius in ſubligaculo ſuſpenſos gerendos, & adſtringentia applicanda, ut aq. nuc. cupreſſ. alij molliunt, poſtea reſolvunt ut *For.*

HERNIA umbilicalis. Sæpe fit, cum inteſtina & omentum in umbilicum laxatum decumbunt.

S. Si ab inteſtinis, tumor mollis non eſt nec durus, ſuppreſſo ſpiritu increſcit; ubi æger ſupinus decumbit, inteſtina plerumque cum ſtrepitu & rugitu in ſuum locum regrediuntur. Si ab omento, tumor ad baſin latus, in vertice anguſtus eſt.

Pr. In infantibus facilè, in adultis difficilimè curatur.

CVRAT. præter generalia & Topica ut ſupra, *For.* in infantibus, repoſitis inteſtinis, quatuor rotulas ad formam ſtuferi è corio rubro conficit oxycroceo obductas. Primam per dies 4. apponit, qua ſublata aliam apponit. Idem ol. ovorum laudat. Faſcia umbilicalis tuta eſt, ſectio non tuta, præſertim in infantibus. [Cum tumorem aperuiſſet chirurgus in infante, inteſtina cum anima ſunt effuſa. *Par.*]

HERNIA umbilicalis aquoſa. S. Tumor laxus cum fluctuatione, preſſus non minuitur nec augetur, ad candelam lucidus apparet.

Progn. In Infante periculo vacat. In adulto (cum hydrope) periculosus.

CVRATIO. Nutrici diæta sicca imperetur, adulto vacuandum serum. # Topica sint resolventia, in infantibus cataplasma ex arnoglos. & lentibus simul coctis utile est. Si frustra, facienda est incisio, quod probat *Laur. Fabr. Hild. & Senn.* hernia umbilici flatulenta curatur, ut hernia supr. sed difficulter.

HERNIA umb. carnosa. Sig. Tumor digitis non cedens, licet æger supinus jaceat. Curam chirurgicam non admittit *Paræus. Benivenius, Fabr. Cent. 5. obs. 62.* fungum carnosum cancrum referentem, filo sensim magis constricto absumsere.

HERNIA Gutturalis, Bronchocele, est tumor inter asperam arteriam & cutem, quo modò caro hebes, modò humor aliquis melli aquæve similis, sæpe cum pilis continetur. *Platerus* solum flatum causam esse statuit: causam remotam vero avulsionem cutis cum membrana ab aspera arteria; prius negat *Senn.* # primo applicentur adstringentia, post siccantia resolventia.

HERPES miliaris à bile flava sincera oritur tenuiore: exedens à bile acriore, ulcera facit parva serpentia, excoriationem sine altitudine cum livore. Male nomine formicæ multis venit.

CVRATIO. Per generalia. Continens causa primo refrig. ut lactuc. &c. indicat, ubi

fervor

Quò ſit, ut ſanus purgari, & ſi vulnus
purgare expediat, ſanet: Illud Hippon.
γνώμη, ἀγὼν, ἐλάχιστον.

Inter ſe ſimilia ſunt, & ſynonyma.
Ætij opinione γνῶσις, & ἐπιστήμη. Varioſa.
Eadem ſtatim plenius ex aqua
poſt. Vid. J. Lang. Lib. I. epiſt. 43.
& lib. III. ep. 4.
Quæ ſint Phlegmatica curari poſſe,
& quæ non: & ſalſa caput vacuum,
auribus. Externis adhibendis auribus.
Fortalis, ſchacej. Bath Sidon,
tia, ingens Lib. Topica
& ſalſitatis & efficacitatis.
Acta S. inveſtigans & ſalſitatis
quæ validitatis. Specifica
ingenitenda. Halicyrugia &c.
Cauſij, Ouoid. ſtipend. Scroſa,
Varie, Lauij. Filij matricis oſſ.
oſſa ſepiæ. & Brondocelis Cuer.
Cataplaſma Phlebotomiæ &c. Vnc.
V. J. Sem. Lauij.
Emplaſtra Diachylon
Sectiones ſimplex oſſium & viciniæ
Sphygmi cardiæ, & arteriæ
pulſuum.

Ptisana rhodosaccharata.
Oolemas ʒ iij. c. oxymel. A. M. vij
mixt.
Succ. Epithymati, Ebu Rasoiz.
Oxygala peponosmatis c. Sp. glycyrr.
Bull. Liwat.

Extract. Ag. plantag. c. Sp. Limon. de
Fonseca.

Pulter corpor carnos, mundus
ingr. d. seminos, stirpium.
Confectio tot corpor virginalis.
& refrigerans dolorosa.

a: vapa, vel humor aeris, epide
tice irritans.

Diff. Sanus, alij, alij a proteus.
valemudine, natio. Critic
Sepe salutaris Hipp. aph. LIIX.
& symptomatic.
Long, brevis. Continuus, inter
polatus. Typic, erratic. Simplex
complicatus.

fervor remiſit, digerentia, diſcutientia utilia ſunt. Si puſtulæ adſint, refrig. non ſint humida ſed ſicca, ut fol. ſalic. polyg. *Aquapendens* ſeq. ſæpe uſus eſt. ℞. ſucc. Tabac. ʒ iij. ceræ citrin. ʒ ij. reſ. pini ʒ j. ß. tereb. ʒ j. ol. myrrh. q. ſ. f. Cerat. *For.* fol. Tuſſilag. appoſuit. certiſſ. auxilium in ung. enulato cum Merc. expertus eſt *Paræus*. Commendatur ol. è virgula deſiccatæ betulæ ad vas ſtanneum collectum. Si indies ſe latius diffundat, margines ulceris oleo vitrioli vel aqua fortis continges. Hoc pacto inſanabilia ulcera curavit *Par. l.* 6.

HORDEOLVM. Palpebrarum vitia.

HORROR Gradu differt à rigore. Subjectum eſt muſculus. Cauſa expultrix irritata; & ſic ad fac. naturalis ſymptomata pertinet: quia tamen animalis virtus ad noxij expulſionem quoque inſurgit, ad animalia ſymptomata refertur. Remotam Gal. & multi ſtatuunt refrigerationem & motum calidi influentis à centro ad circumferentiam & contra. Verum in rigore à bile excitato, item ubi acria ulceri imponuntur aut ſcintilla in corpus incidit, rigor refrigerationem præcedit. Ergo cauſa eſt res moleſta in ambitu corporis ſubito partes ſentientes vellicans & expultricem ſtimulans. Sententia Gal. aliquando obtinet. In febb. rigor fit à vellicatione partium ſenſilium ut ventriculi, &c. ita tamen ut partes in ambitu corporis & muſcu-

los in consensum trahat, ut & è vaporibus eo transmissis.

CVRATIO peculiaris huic non debetur. Sequitur enim alios morbos. In febb. dorsum calidis ut ol. chamæm. inungendum.

HVMERI luxatio. Luxatio humeri.

HVNGARICVS morbus. Febris hungarica.

HYDATIS palpebræ. Palpebrarum vitia.

HYDROCELE. Hernia aquosa.

HYDROPS Ascites est tumor abdominis, scroti, femorum, pedum, ab humore aqueo, qui interdum diaphragma premit, sæpe, in thoracem transudat, unde tussicula, quique tractu temporis putrescit, unde febris, sitis à vaporibus salsis. Generatur aqua à partibus inter ventriculum & renes; epar, in anasarca, non in ascite: læderetur enim totum corpus, nisi forte id infici tandem dicamus. Colligitur aqua in abdominis cavitate, non obæpatis vitium, nec viarum ad renes angustiam, sed paucam mictionem: parce mingunt, quia aq. in illis locis subsistit. Subsistit ob lienis attractricem læsam ejusque vasorum obstructionem, scirrhum. Minima enim pars seri per venas ad renes vehitur. Maxima pars è ventriculo ~~per vas brevè~~ à liene attrahitur & inde per arterias ad renes derivatur. A sanguificatione sola læsa fieri non potest: licet enim in sanguinem cru-

Laterum calfacit vino gariofilat.

Succi: Calami aromat.
Foenic. melissæ.
absinth. Xylaloes.
Junip. ech. Corij.

Lagena alba regalis.
Acto Sinapios pleni.
Sacculi Origanj.
Millefolij, avenæ, hirtici.
Nucl. Cerasor. & Prunor. Asphodeli, infarcti.

Ol. Junip. Ol. Lil. alb. Ol. amygd.
Lauri. dulc. Fœnic.
rutac. Caryophyl. Caj.
+ Castorei. Myrrhæ. Cinamomi.
Cost.

Hydrocephalus: Hydrops partium, vid. p. 123.
loci capitis.

Diff. magna, med. minor.
Materia ad Hydatides ptinet.
Alij ab ossa, alij secundum.
Alij inter cutis & pericran, alij
inter pericran & dura, alij
inter dura & mater, dura,
alij inter mater pia & cerebri
substa, p incurabilis.
Rarior à transmissione,
frequentior à cacochymia acc.

Curatio fit evacuando ea per Vide fol. sequens.
hydragoga: H ch per hydro-
tica & diuretica.
Errhina.
Vesicatoria.
Diaphoretica, absorbentia,
siccantia.
Chirurgia (p vid. seq to.

Externa ex pice Burgund. L. S^o ma-
rinum, L. frangulæ, & rad. Iridis flo-
rent. Empl. Franc. & S. A.
+ melilot. c. Emplastr. de L.
Mastich.

+ Per Vas breve ffis tubo rectio
meat ab arteriis adusq. tu-
nicas & Corionis, & Velli,
qis singulare vasor genus comea,
ti dr, & potulentor humores ex
ventriculo ad lienes deducunt.
Sed cystis ovarior successor
optes ilor voluntates demon,
strandi destituit. Ni lymph
ductus potij hoc negotio valeant,
& infectiua manifesta a potij
via, & ch cystis ex his & lacteis
Asellianis, diuersis ex his in
epiploicas, & cavas, cor, ar-
terias, & Universi corp, mgra
ch ad renes, & vesicas.

Obstructio hydropica, non parva,
seu interceptionis alicujus,
vel suppressionis alicujus partis.
Hæc a. fit a suppressione seri,
effluvii, aut ejusdem alicujus.
Ab inhibitione motus vitiosi
humoris malefici aliis.
minus alicujus sensorii, ut
visus auditus, vitiosus, aut læsi
partis interni.
Hepatis atonia: cacochymia
acrimonia

Ob Vasa deferentia, hæmorrhoidas
fluxus, separata, aliasque partibus emu-
gentia, aut corpore restagnare
sta, aut verosimile apparet, hydro-
phobiam calor, & arteriosus
minus vigor circumfusi, ideo
fiunt.

oedema totius corporis; anasarca.
Prima intemperies, interna.
Externa Varia: aër frigidus:
madidus frigus; ob ventos ab
australes, ob pluvias, fluctuum
olens, humor, ob vinum ob
frigeratum, natatus & lotiones in
frigida.
Interna: multi cibi & potus
frigidi, ob diminutos, frigus exhaustum
calorem ortum, ejusd. minus ob
fusiones.

Vid. Vll. cap. XXIX.

dum chylus mutari queat, ut in anasarca, non tamen in aquam totus mutari potest, & licet mutatus, à renibus tamen excerni posset. Defluit in abdominis cavitatem & omentum per venas per modum anastomoseos & diapedesis & solutæ unitatis : aqua sæpe est citrina: 1a biliosa, 2a serosa 3. lymphatica.

S. Tumor pedum semper adest, maxime circa vesperam & post exercitia. Intumescunt sæpe pedes in convalescentibus è morbis acutis & chronicis à ciborum copia vel causa externa, qui tumor periculum non minatur, si modo mature succurras.

Pr. Anasarca tutior est, quia minus lædit fac. naturalis & sanguis propius ad naturalem sanguinem accedit quam aqua. Ascites si à scirrho fiat, periculosior est tympanite, cætera tympanite gravior est ascite. Si ab hepatis vitio fiat, tussis facile fit & alvus dura est. Si mollis & liquida sit alvus citra allevationem, partes, ut venæ circa ilia, æstu hectico laborant & in causa sunt : in quo casu cathartica sæpe letalia sunt. Si sequatur morbos melancholicos, à lienis est vitio, etiam in agone constituti bene sperant, quod mirum: citius in servis quam liberis, juvenibus quam senibus, curatur. Quibus firma sunt viscera, iis in principio morbus solvitur sæpe vomitu, diarrhœa, sudore, urina.

CVRATIO. 1. Varianda sunt remedia. 2. abstinendum per aliquot dies intercalares.

à medicatione. 3. ad fortia non veniamus niſi mitiora fruſtra fuerint. 4. forma potius ſit ſicca.

Vacuatur cauſa continens catharſi, rarius vomitu, ſi in abdomine & meſenterio oberret; ſudore & urina, ſi cis hepar. Cathartica ſunt, præter vulgaria, ſuccus è rad. vel corticе mediano ebuli cum aq. hord. vel paſſul. expreſſus, non coctus: coctus enim exoleſcit, ad ℥ j. Exprimitur ex acinis baccarum Sambuci oleum, ut è ſemine lini, quod ad ʒ j. datur. Extractum è granis ebuli. Granum vel ſemen ricini unum vel alterum excorticatum: dicuntur grana Tilli: gummi gottæ, quod aliqui ſuccum ricini eſſe putant. Succus iridis noſtratis cum mell. paſſul. tragac. per ſe enim datum fauces exurit. Elaterium tam vehemens non eſt, ut vulgo audit; adduntur mucagines. Spiritus vitæ aureus Rul. qui pleriſque nihil aliud eſt quam eſſentia Trochiſc. Alhandal. Seq. commendat vel præſcr. *For.* ℞. ſpec. Indi min. ʒ j. ß. rad. Mechoac. ∋ iv. rad. enul. pimpinell. ana ∋ ß. f. pulvis: tertia pars detur cum vino. vel ℞. rad. ireos, ebul. petroſ. apij, bruſci, enul. (filicis) ana ʒ j. hyſſop. centaur. abſint. fol. Sambuc. quæ optima ſunt, ſatureiæ, Ceterach. cuſcut. ana. m. j. medianorum cort. Samb. gratiol. beton. ana m. ß. rad. rub. tinct. cal. aromat. inciſi ana ʒ ij. ſem. aniſi, dauci ana ʒ j. ß. ſem. cartham. contuſ. ℥ ß. folior.

ſen.

G. Hannikers Epistola Vid. Cl.
Consil. Eydea. XLIII.
De Hydrope V. S. ij apicedijchi minoris
vid. Jerem. Erhardi Med. Hyd.
in Gl. Med. Hondij.

Hydropis cura per epicrasin: per
sidrosin: & per paracentesin
novo instrumento Barbettiano,
& vid. in Chirurg.
Syn. è Jo. Jacob. Hagenbuchij.
Elate è Jo. vel. Nic.
è Soldanella Bern. Hessenij & Horat. Tursellini.
Syn. Hamij Sol. & Diascordij Andr. & Nicolai. c. Rhabarb.
Diacarthami. Hydragogus Fernelij. maj. & min.
Diaturbith c. Rhab. Scheffij.
Pil. ex Elate. Consult. Gratiolij & Horatij Tursellini.
Euphorbij. G. Crataeum. assimij denuo.
Hydragogi. G. Gotthardi.
Extr. Jacob. amarior. è turbinibus Lambecij.
Mechoacan. Rhabarb. prod. ariolum Lambecij.
Resina Euphorbij Cocta. Pityusa litoralis Venetae Cocta J. Pacij.
Ex Mechoacan c. Succolate G. Caldeni.
Crocometallini ex vino Oxi.
Hieralogium Galeni Lambecij Petri Vinij.
Ex Chrysippo ex emiss. sud. Persii.
Extr. Stimmonteos Galeni ex Succ. Viol. Rosat.
Galeni Parac: Schrifft ex Rhodomelite.
Electu Oxymel. Pari:
Justus Myrtacumbes Lambecij & Lavendelij.
Syn. Rhabarbacumbes Jo. Fracastorij.

[illegible] Hydropis seruj incipiendo à
roborare Septic. Aloysij Bellocal
R. Med. Mss. p. 23.

Roborantia Septica d. Cardiaca
vid. Suo to.
Eminet: Vi. Coalor.
Coff. alKerm.
va. Ap. Mirj:
Elix. pp. absinthiat.
Terebinth. ab.

Vsorum fibr. d. Fl. sambuc.
Conf. Buglossi vitalistica Crata.
Antheror Rosar. Crocostica.
Cuscolytor Tamariscin.
Mosstorarym animatum Cicoriar.

Dimetica vid. Suo to.

Aperitiua: Ag. d.
va.
vO.
Fec. arj.
Oji ab Volatilia.
Buton.
Cortices d. Capparis.
Mag. mandibul. Cuj.

ſen. ʒ j ß. polyp. qu. ʒ ß. ſ. geniſt. m. ß. ſem. junip. ʒ j Soldanell. m. ß. uvarum paſſ. ʒ j. glycyrrh. raſ. ʒ ß. zinz. cinam. ana ʒ j. coq. in aq. ſ. ad ℔ j ß. colat. adde ſir. de Byzant. de eupator. de calamint. ana ʒ j. f. decoctum. vel ℞. fol. Sen. ʒ ß. ſem. aniſ. ʒ j. fol. mezer. ʒ ß. rad. Ireos virid. parum contuſ. ʒ iij ß. ſoldanell. ʒ ß. infunde in ʒ ix. ſeri lactis facta prius ebullitione, expreſſ. add. ʒ ij. mell. roſ. col. pro 2. doſibus. Si adſit febris *For.* pro mezereo ponit ʒ j ß. Rhab. ſpicæ ℈ j. vel ℞. ſuc. ireos ʒ ß. aq. caſei ʒ ij ß. mellis crudi ʒ j ß. bulliant & colentur. adde ſpicæ nard. ℈ ß. cinamomi ℈ j. diagrid. gr. iij. Topica purgantia applicentur. Roborant hepatica & ſucc. cochlear. ad ʒ j. ſumtus quotidie. *Crato ep.* 123. offert maguo cum ſucceſſu extract. rad. Ireos. Hyoſcyamum pedibus ſupponit ep. eadem. *For.* ſolo uſu allij multos curavit.

Topica ſunt ℞. ung agrip. ʒ ij. ſuc. ebul. vel ſambuc. ʒ j. coq. ad ſuc. conſumt. fiat litus pro ventre & pedibus. Si ſcirrhus adſit, mollientia applicentur. Vetula quædam ranas, rubetas dictas, vivas in ollam conjecit, cum ol. oliv. decoxit, eo oleo cum miraculo pedes & ventrem inunxit. Seq. arcanum eſt *For.* ℞. rad. ebul. rec. m. vj. rad. bryon. ℔ j. corticis exter. ſamb. m. iiij. fol. cucum. aſin. m. ij. caul. rubr. m. vj. fol. malv. m. ij. fol. alth. m. iij. furfur. m. m. V. fl. chamæmel. m. iij. fl. melil. m. ij. abſint. ſicc. m. iij.

coq. inſ. q. aq. ſ. piſtentur; adde ungu. agrip. ʒ iij. far. hord. ℔. ß. f. cataplaſm. pro cruribus ad genua uſque. vel ℞. ſuc. ireos, ſuc. rad. ebul. & rad. ſamb. & ſuc. bryon. ana ʒ j. ung. agrip. ʒ iij. coq. ut f. ung. molle. mulier ab applicato pedi veſicatorio mortua *Fab. obſ. 49. c.1.* Gradus ait, mirabiliter ad ſe attrahere aquoſitatem, ſi ranæ vivæ in balneo artificiali ponantur. Paracentеſis, quæ locum habet cum viribus conſtantibus, viſceribus integris; aliâs brevi intumeſcit venter & reliqua fruſtranea ſunt, cum umbilicus in amplam & lucidam veſicam attollitur. *Sanctorius* dicit inſtrumento ita dilatari vaſa umbilicalia poſſe, ut aquam vacuare poſſint. Si non tumeat infra umbilicum, ad latus dextrum ſi hepar; ſiniſtrum ſi lien laboret, tribus vel quatuor digitis à linea alba ſecetur, immittatur fiſtula linteis clauſa, ut non niſi medico volente ſenſim quid vacuetur, ut in empyemate. aperitur commode ſcrotum, ut docet *Fab. Cent. 1. obſ.* 48. In omnibus hydropicis Rondelet. Pancreas induratum vidit.

Sudor niſi ſponte natura eo ducat, vix prodeſt. Interna ſunt & inſenſibiliter aq. tollunt ſales theriacales ſudoriferi, abſinth, chalybs, fotus & topica reſolventia. Spongia vino imbuta cui ſal ſulfur & artemiſia incoxerint. Sitis non tollitur aqua ſed oxycrato ℥ v vel vj.

Si febris adſit, frigida calidis miſceantur, æs uſtum formatum in pil. cum mell. ad ʒ j.

Diæthica Quia non niſi ſemel ſe offerre ſepiſ per ſudores curaſſe, dato Unicorn Groenlandico. H. Bartholin C. IV. Hiſt. XIV. vel

Diaphoretica d Hidropica vid. Iusto.
Ioh. f: S: Greatry c. Rip. Chy.
Absinthites Nardapistus
Vinum Valeriana[tum]
Vinum asarinum Cicoriatum. Jer. Martij.
Trochisci viperini, H. Mercurialis.
Vinum Camaros[tachyos]. Hh.
Eff. Caryophyllor. c. o[leo] Sassafarino.
Vinum hepaticum Gregorii, Junij d Rhegij. Jacobi Fabricavlg.
Vitelli Greatti. Ioh. Jacob. Leonbergi Tercerensis S. Thalath Curij Brixiensis.
Hanc Vid. in Chirurgicis. Cerasuchysi c. o[leo] Scorp.
Empt è hæred. Curij Fab. Offi volat. Helmontian.

|| Vid. eund. Com. in Eberhin. lib.
seu
add. Nicol. Curtij. IV. obs.

Ex Senatu Padurica, Jo. Michaelis
Epist. Ms.

Non to in Cibis alijs rebus observandum.
Ex plerisq; rebus male affectis &
verosimile: Ex Universalibus
propositionibus, ut Logicis, Grammaticis,
in Medicina, in Jurisprudentia, &
in multis alijs Scientijs sunt.
Ut plurimum falsæ.

Vaporarium Thermale: Fumarijs &
Balneatorijs Puteolanis similia.
Semidolia d Spelunca Neapolitana.
Spelunca Thermar S. Helenæ.
Aloys. Bellocatij Pa. Ms.

Tabellæ Pharmaceuticæ: Rebatæ bene c. aq. Th.
Cinnab. Venetiis Papæ.
Calcantum Africanum Hipponense.
d Galeni.
Opium Nobile Acetosum. Hagenbuchius.
Remedia arcana & Camarij
Augustini Cæsi.
Henry Smith

Hydrops pericardij.
Curat 24 pulmonis sere, gloss.
Dodon. 11. R. 92. Hyra, ygros, الماء مجتمع في خريت القلب
gasta in medijs cordis, unus
vita Ebusforo 1. R. 4. vide
Gal. de caus. ca. aromatica
ysemat c. Vsnicalij.
— Ti Geoffyllig.
Arantissimus Echinophlebes.

Jschias. s. Dda Jschiadig. Vid. artritis: d: podagra.

Differ.

ca: à bile, calida: à pituita
frigida. Venj à sero nunc crassiorj, nunc subtiliorj.
Cura p ca varianda.

Purgantia.
Hermodactylata J. Vesingij c. Ti Cly.
Cary opolsinum Trid. Belli.
Daucydium balsy c. Syr. ros. sol. aureo, d Selleborato.

Subsidiaria.
Diaphoretica, Balsy speciatim. G. V.
Bezoartica, minerale O. D. H. Cale.
— Diajuste.
— Gudjaq.

Phoenigij ex Iberide d Dod. Mauroruphaij.
Cantharis sub genu.
Exercitia Orchestica.
Καλαλγν ὑβ Ὑόκκ, aq. Galeni. καλαλγδ Apollonij Alex.
Vsiones Aegyptiae d Cornutj Canadij Pharmacop.
ὠφελεῖν Hippocr. καὶ ἀνώδυνος ejd.

Disentheria externa.
Emplg Diapissae Arabum.
Diatrion Pepperitum Mesuae. L. Foreij.
Malachinum — Myrobalanum.
Diaphoretica Mynsichti.
Jschiadig Ang. Sax.

Interdum utabis, ? Hippocr. # lib.
de arte: Nihil autem ut ego
opto autem.

Sed ipse ab ego ego Etymologista;
sed ἐγὼ ἐγὼ ἐγώ, inflao.

Hydragoga:
Syr. e Sp. Jacob. Syr. Soldanella

Cola ventriculi d crispos robo-
randa: Obstructiones a-
tollendæ apientibz.
Roborantia ventriculo conciliandæ.

Diaraphanum.
Stitticitat. Dam.
Diacorin.
Ol. Calam. aron.
Cedrin.
Carj d.
Cumin.
Fœnic.
Paleg
majoran.
Hyssopi.
Rosmarin.

d Terebinth. c. Vitello ovj.
V Theriacalis c. Ʒj.
Salviæ conjs.
Card. ben. c. vin.
Lil. convall.
Foeniculi.
anis.
Junip.
Calam. aron.

vel 3 jß. Supra talum 4. d. utiliter cutis aperitur ſcalpello paulo quam in V. S. altius & ſale confricatur ne ſanguis concreſcat: Sicque aqua educitur feliciter. fol. hyoſcyam. pedibus ſuppone. Hydrops ex colliquatione fit in feb. ardente à calore exurente, curatur refrigerantibus calorem, & vacuantibus aquam.

HYDROPS Tympanites vix differt ab aſcite. Raro enim flatum abſque aqua & contra reperias. Vocatur & hydrops ſiccus.

CAVSA eſt flatus in abdomine incluſus, imo & inteſtinis ex *obſ. Plateri*, *Smetij*. Flatus fiunt è materia craſſa, præſertim bile atra, & calore per ſe quidem ſatis forti, reſpectu materiæ tamen debiliori. In tympanite calor fere eſt adurens, materia autem melancholica.

S. *diagn.* Venter ſonum reddit inſtar tympani.

CVRATIO. Materia eſt evacuanda, cauſa flatuum tollenda, flatus diſcutiendi. Semper carminativa ſuperent purgantia. Arculanus ſingulare remedium putat eſſe, ſi in clyſtere ſolvantur 3 iij. elect. de bac. lauri, diſcutiendum per interna & topica. empl. è bac. lauri. Si calida non juvent, ad frigida tranſeundum. Miraculi inſtar ſe habet cereviſia decoctionis fl. chamæmeli.

In leucophlegmatia vel anaſarca V. S. convenit, ſi à ſuppreſſione fiat, curatur ut cachexia.

HYDROPS Uteri vel in cavitate est uteri, vel in tunicis uteri, vel in vasis uteri, vel ~~clauditur cysti,~~ vel non. Est vel cum fœtu vel sine. Plerumque fœtum enecat, sæpissime ingravidationem mentitur. *Causa* vel transmittitur aliunde, vel in utero generatur: suppressio mensium. S. distinguitur ab imprægnatione quod hydrops uteri æqualiter juxta uteri amplitudinem extendatur. Si ultra decimum extendatur mensem. quotidie & posterioribus mensibus ingravescit: in imprægnatione contra symptomata, quæ primis mensibus affligunt, posterioribus remittunt. Mammæ quæ solidæ sunt, molles fiunt. In hydrope uteri sanguis aliquis effluit. Distinguitur à mola pondere, ab inflatione uteri pondere & sonitu: ab hydrope ventris, quod oriatur à partibus superioribus, & pergat ad inferiores. In hydrope uteri contra. cum in cavitate hæret, os uteri clausum est, cum ~~incysti~~ connivet. Si totum corpus bene se habeat & præcesserit partus laboriosus, ab uteri vitio fit. *Pr.* Si aqua non sit corrupta, non acris, quod ex symptomatis colligitur, curatur processu temporis.

CVRATIO. Si è suppressis mensibus sit, ij ~~evacuandi~~, etiam V. S. In reliquis tamen casibus utilis non est: aqua, per injectiones, diuretica, per pessos purgantes, externa, vomitum sternutationem, clysteres. Fonticuli utiles non sunt.

HY-

Vs. Femel. V. pstol. XV.

Fit ꝺ per ꝺuadecoctiõ, vel
per Ecrcuatiõ ab alijs
partib. Et vicijs vitiosis, ꝺ
ab Vtero imbecillitate.

Diagn. Tumor ventris larg, molliꝭ,
sonitꝰ aque fluctuantis ꝺ
motu de latere ad latꝰ, aque
emanatio per pudenda, ꝙ. Hipp.
sch. IV. Epid. IV. c. 79. anhe,
tudo grauior, dyspnoea, grauo
lentia pedũ, alijꝭ impedimẽta
fluxꝰ ꝺ genitũ ꝺ impedita.

Hydropica. Diuretica. Hitrotica. Diaphoretica, ꝙ insensibiliter
ꝓspirant: angla, Stapl.
fonta, ola, Vngta.
Herina, Aq, Oxy, Cam.
tudines, si ꝺ ola vgeat, topica,
ꝺ enemata.
Emenologetica, si in anis assit
fluxꝰ.
Viscerũ intemperies ꝺ imbecillitas
tollenda.

Diaphoretica, ꝙ Hermetica
Pyrocanj.
Ꝑ. Sudorifer.
Vinũ serratũ.
Hydrocephalica c. Arcanis
Ol. Chab.
Balsamꝰ. Oxy.
flaginij,
Vterinacalij c. Oleis
Oxy

Veneto. Epistagm. obs. VII.
Juster figura prop. 4. Observ.
III. sect. X. h. IV. c. XIV.
& f. XIV. h. IV. c. III. recens.
sect: c ... ...
1). ... versione: dolor dorsi
febris lenis.
Cr: ag. ... ... per abstr.
... grandines pulmonis:
pulmonis Gälitz in pleura;
Vomica

... c. Gamarolithis ...
renosis Exephtis.

... Helmij.
... Obstetr.
Sanctorius Sanctorius
Agricola Fl.
Arcaeus Fl.
Fa. Junius
Eff. Medicus Jur:
Fa. Conll. Lac flor.

Hydrops pect. & pulm. Distinguit:
à Med. Sect. 10: Quis causis fiat
ut hic potius. Hydrops u- tho,
racis fiat quam cum emacie-
tate Hydrops vesicalis pulmonis.
Vocatur Hydropica Hippocr. Hydatidis
Dif. Dropsy à pulm. Symptoma-
tis à corde, à cerebro, à abdom.
partib.

Et sine gestione & potu, quia
visit & E.
Emunctio per vices, non assertis
& semel. VI. obs. XXVII.
(# Quia non curavit sectis, sed à Medico
sectionis E, sensit misereminè ad
sectis. Cons. Jo. Schenck. lib. II. obs. 61
& Cent. IV. Cons: 1. mag. Epidem. c. 35.

HYDROPS pectoris raro agnoscitur frequens tamen est: à capite destillare tantam copiam probabile non est: sed vel generatur in thorace vel transmittitur.

Sign. dolor gravans pectoris. Sonitus cum movetur corpus. Tussis sicca. Suffocationis periculum imprimis per somnum primum, sitis, appetitus dejectio, color faciei pallidus, intumescunt sæpe pedes.

Progn. Raro curatur. Semel curatus facile revertitur in hydropem.

CVR. Aqua vacuanda per vices, per purgantia. Hipp. sectionem thoracis instituit viscеribus integris. Per diuretica quibus seipsum curavit per annos viginti Maximil. II. Imp. cumque impediretur ille motus, suffocatus est. *Crato ep.* 137. *Senn.* sectionem in principio laudat.

HYDROCEPHALVS Qui vel intra vel extra cranium subsistit. Affluit per anastomoses & diapedeses venarum. In infantibus fit à violenta obstetricatione.

Sign. Si extra cranium hæreat, tactu exploratur. Si intra, illacrymantur oculi & difficulter clauduntur, & lethalis est.

CVR. Præmissis generalibus vacuantibus si ætas ferat, pars primo est mollienda, post resolventia tentanda. sp. vini cum 4. parte aq. scabios. item aquam calcis vivæ abjecta calce commendat in pueris Aquapendens. Si frustra hæc fint, cauterium occipiti appona-

tur. Sectionis processum vide apud *Sen.* Tandem cerebrum siccantia adhibeantur, *Fab. obs.* 10. *C.* 1. invenit in anterioribus cerebri ventriculis 18. ℔. aq. limpidæ.

HYPOCHONDRIACA affectio. Affectio hypochondriaca.

HYPOPYON. Oculi vitia.

ICTERVS flavus, viverra, aurigo, morbus regius & suffusio fellis.

Si ab angustia meatuum vel vesicula fellis fiat, feces alvi candicant, febris abest, adest gravitas, repente oboritur citra virium jacturam, si med. efficacia nihil profuerint, à calculo oritur angustia. Si hepatis affecti sint signa, illud affectum est. Si diu duret hydropem minatur.

CVR. Primo aperiendum, imprimis per cuscutam, qua nihil præstantius, crocum agrimon. marrub. centaur. min. chamæd. absinth. utilis est lapis flavus in felle tauri repertus. ʒ j. lumbric. terr. cum succ. cichor. rad. chelidon. maj. enulæ, Tartar. vitriolat. cremor Tartari vino chalybeato dilutus, spiritus salis. decoctum ex fragor. m. iij. passul. ʒ iv. marrub. m. ß. in infantibus sem. aquileg. possunt & aperientia & purgantia. misceri. Post vacuandum. *Gal. l. de vi purg.* prorsus negat hic V. S. *For.* ea utitur, si adsit plethora. Purgantia valida esse possunt. *For.* in puerpera icterica dedit el. de suc. ros. ʒ ß. rhabarb. ℈ j. diagrid. gr. j. spic. gr. III. cum aq. melis. lupul.

Sympt. Coll. Chron. Lenta opiat? Rayer Vir.
Mitridat. c. Conf. Ros. Ab.

V. v. Ess. Θ. hyo. scordij. Diuphoretica.

Ess. [illegible] Jacobaeae.
Ess. [illegible] Centaurij.
Ess. [illegible] Salviae.
Ess. [illegible] Absinthij.
Ess. [illegible] Graminis.
Ess. [illegible] hyo. stoechados.
Ess. [illegible] Card. ben.
Ess. [illegible] Rorismarini.
Ess. [illegible] Lauend. spicae.
Ess. [illegible] Betonicae.
Ess. [illegible] Millefolij.
Ess. [illegible] Salviae.
Ess. [illegible] Hepatica roborantia.
Ess. [illegible] Cichorij.
Ess. [illegible] Taraxaci.
Ess. [illegible] Endiuiae.
Ess. [illegible] Fumariae.
Ess. [illegible] Lichenis cynoglossi.
Ess. [illegible] Scolopendrij.
Ess. [illegible] Capparum.
Ess. [illegible] Hepatica.
Ess. [illegible] Agrimoniae.
Ess. [illegible] Hyssopi.
Ess. [illegible] Hematoxylon.
Ess. [illegible] Myrtillorum.
Ess. [illegible] Mentastri.
Ess. [illegible] Acetosellae.
Ess. [illegible] Diuretica ex Antiscorbutica: Aquam
Ess. [illegible] Cochleariae.
Ess. [illegible] Nasturtij.
Ess. [illegible] Raphani.
Ess. [illegible] Sinapeos.
Ess. [illegible] Ammoniacum.
Ess. [illegible] Asa foetida.
Ess. [illegible] Myrrha.
Ess. [illegible] Sagapenum.
Ess. [illegible] Galbanum.
Ess. [illegible] Opopanax.
Ess. [illegible] Castoreum.
Ess. [illegible] Succinum.
Ess. [illegible] Cornu Cervi.
Ess. [illegible] Ebur.
Ess. [illegible] Antimonium diaphoreticum.
Ess. [illegible] Mercurius dulcis.
Ess. [illegible] Mercurius vitae.
Ess. [illegible] Mercurius corrosivus.
Ess. [illegible] Mercurius sublimatus.
Ess. [illegible] Mercurius praecipitatus.
Ess. [illegible] Mercurius Vomitorius, hic ac Purgans
Ess. [illegible] fuerit. Sin vero a morbo, sanans
Ess. [illegible] sit ac curabilis.
Ess. [illegible] Antidotus Ni.
Ess. [illegible] Diaphoretica.
Ess. [illegible] Nitrata.
Ess. [illegible] Diaphoretica.
Ess. [illegible] Stomachica.

Ess. [illegible] Cinnamomi.
Ess. [illegible] Caryophyllorum.
Ess. [illegible] Nucis Moschatae.
Ess. [illegible] Macis.
Ess. [illegible] Cardamomi.
Ess. [illegible] Zingiberis.
Ess. [illegible] Galangae.
Ess. [illegible] Cubebarum.
Ess. [illegible] Piperis.
Ess. [illegible] Pimentae.
Ess. [illegible] Cassiae lignae.
Ess. [illegible] Cassiae fistulae.
Ess. [illegible] Tamarindorum.
Ess. [illegible] Rhabarbari.
Ess. [illegible] Myrobalanorum.
Ess. [illegible] Aloes.
Ess. [illegible] Succi Liquiritiae.
Ess. [illegible] Succi Absinthij.
Ess. [illegible] Succi Taraxaci.
Ess. [illegible] Succi Cichorij.
Ess. [illegible] Succi Endiuiae.
Ess. [illegible] Succi Fumariae.
Ess. [illegible] Succi Scolopendrij.
Ess. [illegible] Succi Capparum.
Ess. [illegible] Succi Agrimoniae.
Ess. [illegible] Succi Hyssopi.
Ess. [illegible] Succi Myrtillorum.
Ess. [illegible] Succi Mentastri.
Ess. [illegible] Succi Acetosellae.
Ess. [illegible] Succi Cochleariae.
Ess. [illegible] Succi Nasturtij.
Ess. [illegible] Succi Raphani.
Ess. [illegible] Succi Sinapeos.
Ess. [illegible] Succi Limonum.
Ess. [illegible] Succi Aurantiorum.
Ess. [illegible] Succi Citrij.
Ess. [illegible] Succi Granatorum.
Ess. [illegible] Succi Ribesiorum.
Ess. [illegible] Succi Berberis.
Ess. [illegible] Succi Myrtillorum.
Ess. [illegible] Succi Vitis Idaeae.
Ess. [illegible] Succi Rubi Idaei.
Ess. [illegible] Succi Fragorum.
Ess. [illegible] Succi Cerasorum.
Ess. [illegible] Succi Prunorum.
Ess. [illegible] Succi Pomorum.
Ess. [illegible] Succi Pyrorum.
Ess. [illegible] Succi Cydoniorum.
Ess. [illegible] Succi Mororum.
Ess. [illegible] Succi Fragorum.
Ess. [illegible] Succi Cerasorum.
Ess. [illegible] Succi Prunorum.
Ess. [illegible] Succi Pomorum.
Ess. [illegible] Succi Pyrorum.
Ess. [illegible] Succi Cydoniorum.
Ess. [illegible] Succi Mororum.
Ess. [illegible] Succi Fragorum.
Ess. [illegible] Succi Cerasorum.
Ess. [illegible] Succi Prunorum.
Ess. [illegible] Succi Pomorum.
Ess. [illegible] Succi Pyrorum.
Ess. [illegible] Succi Cydoniorum.
Ess. [illegible] Succi Mororum.

pul. fænic. ana ʒ j. pro una. Solutæ obſtructionis ſignum eſt, quando feces alvi iterum colore flavo tinguntur, & urinæ flavedo remittit.

Si à colica, cum ſc. à pituita & flatibus obſtruitur meatus cholœdochus, curatur ut colica, è colica icterus, ex ictero colica.

Si ab hepatis calore, nimia bilis copia & hinc febris oritur, urina & fæces flavæ ſunt, pedes & manus calent.

CVR. V. S. convenit, ſi adſit plethora. Intemperies corrigenda, cauſa vacuanda.

Si criticus ſit, urina & fæces naturalem colorem retinent. Curari non debet. Si ſymptomaticus ſit die non critico, non cocta materia ingruit: Tollitur curata febre, *& alia Symptoma*

Si ab inflammatione hepatis fiat, curatur ut phlegmone.

Si à veneno, curatur alexipharmacis. # *& veneu arsenic lig.*

Rondeletius gravidis ſanitatem pollicetur ſi ſeqq. carpo & pedibus ſupponantur. ℞. fol. viſc. querc. m. ij. chelidon. marrub. ana m. ß. contundantur in mortario cum pauco vino. Sequenti Par. utitur. ℞. ſtercoris anſer. ʒ ij. vini alb. ʒ iij. fiat potus duabus horis ante paſtum. *Quere.* ſtercoris anſer. ʒ j. vel ʒ ß. exhibet. vel ſterc. gall. alb. ʒ ß. per dies 4.

ICTERVS niger vulgo à liene fieri creditur, cum humor mel. non attrahitur. *Platerus* cauſam eſſe bilem vult p. n. quæ in veſicula fellis colligitur ac in venis meſarai-

cis corrupta est, & viridem ac nigrum colorem è corruptione acquisivit; ~~quia in liene nulla cavitas, nullus sinus, nec in venam cavam deferri posset: quia subito invadit.~~ Curatur ut ictterus flavus, chalybe, &c. Si color non cesset, discutiendus est sudorifetis, balneo etiam sicco, & post balneum abstergatur corpus emulsione sem. cannabis. Tinca piscis per dorsum dissectus abdomini vel plantis pedum applicatus hum. flavum & nigrum attrahit.

IECORIS inflammatio. Inflammatio hepatis.

IECORIS obstructio. Obstructio hepatis.

IECORIS scirrhus. Scirrhus hepatis.

IGNIS silvestris. Pustula.

ILEVS est motus intestinorum inversus, in quo nec chylus perfecte distribuitur & feces retinentur & tandem per os rejiciuntur.

CAVSA. Vulgo docetur fieri ab inflammatione intestinorum, à duritie & copia fecum, ab hernia, à veneno. Cæterum Senn. non credit posse fieri ab obstructione intestinorum tenuium; feces enim per os egredi non possent; sed statuit prout in vomitu fibræ circulares ventriculi; ita in ileo intestinorum tenuium in causa esse; quia clysteres in ileo sæpe per vomitum rejiciuntur, imo & glandes. Causa autem illius motus est inflammatio intestinorum. 2. fecum retentio. 3. exulce-

Ex extensa: venenum adsumptum, ab
ossibus, scabiosis, et melancholicis.

Contra Serum Sanguinis. Fracas. et Inflam
abscessus. Ductus Lymphatici.

Ex ablatis. Unde venenum ab
hepate pharmaca regerit. Obstructio
arteriae, et gangraena, et
si videantur inter Icteritias
et Calculosa cliparch, aut
Scabies adhaerit. Gradibil Calyx
Stabilis R. D. Ductus.
Ductus Calybeatus.
Mag. Capitis. Musc:
Cruz Capiens c. Ductus.
Ductus.
Acidulae Oes.

Fracti inspirans, ut
spiritus, topica admo
Vesicatoria.
Polygonat.
Relidon. maj.
Linaria.
R. tiliae.
Scrophularia
R. Verbasci.
Ductus Sanguiferi, Cicer. Papil
Cantholicus Serum OR. Chan
Ductus. Cantharidis major

de qua vid. Colica
Obstructio, Coarctatio, Exulcerat,
Morbus S. Volutio.
Coarctant Tumores et abscessus:
Exulcerant Tumores acres, et
mordaces, venena acria.

Symptomata aeth: tormina, lipothymia, ructus inanes, fel ex stigio dysuria.

Bals. Judaicorsh.
Ech. ashkenaz:
Bas.
Lauban. Oelsn.

Pyrenaic. stigiach, delirium, gentilis.

May. d Esh. polyspodiz: d Germin. V.d. ventris Auricolica.
Fa. Coral.
v Sei.
v Scabiosa.

Singulare Hydrargyrus ecclesiasch.
V.d. Epilepsia. mag. XLIII.
Globuli Dei, d ecclesiasch.
ex R. Hermodactico.

ulceratio. Plerumque tenuia occupat, aliquando & craſſa inteſtina.#

S. *Diagn.* Alvus ſuppreſſa, vomitus major quam in colica, dolor minor. Si tenuia ſint affecta, vomitus, nauſea major.

Progn. Omnis ileus periculoſus; ubi feces evomuntur, exitalis, *aph.* 44. *ſ.*6. *aph.*10. *ſ.*7. intra 4. dies interimit.

CVRATIO. Mollientia ſunt ex uſu, interna, Topica, ℥ j. ol. amygd. d. unice proſunt: ſemper foveatur podex mollientibus, abdomini applicentur mollientia, balneum utile eſt, juſcula pinguia, clyſteres mollientes.

Si ab inflammat. curatur, ut inflammatio inteſtinorum. Si à fecibus duratis, curatur ut colica. Si curari non poſſit Hippocrates folle inteſtina inflata à ſtercoribus ſeparat & poſtea clyſterem injicit. Si ab hernia, curatur ut hernia.

IMAGINATIO per ſe non alterat nec movet, quia eſt potentia apprehendens ejuſque actio immanens; ſed per accidens, quatenus facit vel appetitum vel odium; ſicque trahitur in conſenſum facultas motiva ſeu naturalis, quæ humores & ſpecies vel mittit vel retrahit. Morbos producit ob ſolum terrorem & timorem, quo humores moventur & corrumpuntur. Si vero imaginatio ſit naſi magni, naſus magnus non fit. Per ſe non curat morbum ſed quatenus confidentiam

facit & gaudium. Fœtum afficit in mala conformatione ob animi pathemata & inde natum motum humorum & ſpirituum, quo facultas formatrix turbatur. In determinata conformatione, ut ſanguineæ maculæ mori inſtar, imaginatrix formatrici ejuſmodi ſchema exhibet vel per pathemata animi, vel quatenus anima matris ſic affecta afficit animam in femine, hæc fœtum.

IMPETIGO Græcorum [nihil aliud eſt quam lepra.] Celſus quoque lepram impetiginem vocat.] Latinis, ut Plinio, impetigo ſeu lichen eſt cutis aſperitas cum puſtulis ſiccis & magno pruritu ad vicina ſerpens. [*Fern.* 4. facit impetiginis ſpecies. 1. pruritum. 2. impetig. ſeu lichen. 3. Pſoram quæ eſt cum puſtulis. 4. Lepram.]

CAUSA *Fernel.* eſt bilis aut pituita putrida. *Senn.* tenuis & acris ſuccus Craſſo immixtus, ſalſo, ſeroſo, mixto.

Cura eadem eſt ac in Saphato.

IN APPETENTIA. Anorexia.

INCUBUS eſt reſpirationis, actionumque animalium læſio cum imaginatione ponderis.

CAUSA. *Senn.* ſæpe cauſam vaporem craſſum poſteriorem cerebri partem obſtruentem eſſe vult. *Plat.* vero & *Fern.* pituitam & melancholiam circa præcordia hærentem, qua per crapulam vel cruditatem turgeſcente, diaphragma pulmoneſque premun-

Ad cutem & Rumores & vapores tales
curant.

Ad partes aliquas resident tollenda
Vide infra corrigenda.
pil. Stomachicæ. Vitell. ovi deglutien

tur, craſſo autem vapore in fauces & cerebrum exhalante vox ſupprimatur, ſenſus turbetur. Conjungi poſſunt hæ duæ cauſæ.

Pr. Apoplexiam minatur aut melancholiam. mala ſi partim vigilantes opprimat & ſi ſudor frigidus ſequatur.

CVRATIO. A paroxyſmo excitetur æger: Curetur ut apoplexia per generalia & Topica. Pellis lupina pro tegmine capitis inter dormiendum commendatur. Aniſi ſemen lecto inſperſum odore juvare creditur. Infantibus ob nimiam edacitatem familiaris eſt, quare ingeſto cibo non ſtatim dormiant. mel. lingendum exhibeatur. rad. pæon. ʒ j. infundatur in ℥ iv. cereviſiæ pro potu.

INFANTIVM alvus ſuppreſſa. Alvus ſuppreſſa in infantibus.

INFANTIVM regimen. Reſciſſo umbilico, ſi infans ſit plethoricus, effluat ſanguis, ſi macilentus, manu intro prematur ſanguis, paucioribus tamen variolis laborabit infans, ſi non manu ſanguis intro prematur ex obſ. *Riol.* Si ſubruber eſt & clare plorat, ſanus eſt lavetur vino decoct. roſ. fol. myrti, &c. Galenus ſale conſpergi jubet, ſed male. Cretaceum excrementum ori interno adhærens, linteolo bacillo alligato imbuto med. ex ol. amygd. d. mell. & ſacch. defricetur, articuli omnes communes explicentur. Antequam ei mamma præbeatur, mel. vel ſir. roſ. cum ol. amygd. d. & ſacch. exhibe. Qui-

dam non nisi purgatis lochiis lac maternum infanti convenire volunt. Sed considerandæ lactis conditio. Malum si sit, non detur: si serosum sit non nocere, sed plurimum prodesse vult *Spigel.* lumen intensum nec candela ei prope admoveatur, decumbat per mensem in dorso, postea in latere; lumen recte oculis sit oppositum: quare cunarum latera velo claudenda ut unus profectus antrò tantum pateat. Cunæ pensiles meliores. Somno plus indulgeant quam vigiliis. quotidie molliter fricandum est corpus infantis. Post menses quatuor manus & brachia fasciis liberari possunt: nunquam uni mammæ tantum assuescat, sic enim una tantùm manu utetur, post menses aliquot puls fiat ex farina triticea tosta parumper, vel pane albissimo: solida ante dentitionem non ingerenda. Cum dentes erumpunt, solidioribus assuescendum. Non nimis mature cogatur ut pedibus insistat. Curriculo includatur ut ambulare discat: circulo caput cingatur, infans à lacte removendus non est antequam dentium numerum completum habeat. Commodius ablactatur crescente Luna, veré & autumno.

INFANTIVM febres. Vel è lacte corrupto vel dentitione vel vermibus oriuntur. Nutrix vel mater purgetur diacatholico, sir. ros. &c. alterantia infantibus exhibeantur. ut suc. sir. viol. sir. acetos. citri, aq. cichor. endiv. viol. &c. spina ungatur mucag.

sem.

sem. psyll. cum oleo viol. & cera. adstringens ut ol. cydon. ventriculo applica. *Heurnius* seq. laudat. ℞. conserv. ſ. viol. ʒ ij. borrag. ʒ ß. pulp. cass. rec. tract. ʒ j. mucag. sem. psyll. ʒ ß. ʒ j. vel ʒ ij. pro dosi dari possunt sir. ros. viol. de cich. cum rhab. man. cass. &c. *Senn.* vidit infantem obisse à guttis iij. ol. succini à vetula in epilepsia exhibitis. Commodissime alvus solvitur glandibus & Clysteribus, sero lactis & sir. ros.

Siriasis est inflammatio cerebri & membranarum, quam sincipitis & oculorum cavitas sequitur. Fit à sang. pituitoso putrescente, item lacte calidiore. Vocatur à mulieribus das blart. schiessen, quod scil. membrana fonticuli procidat & foveam faciat. Intra triduum plerumque interimit: alvus subducenda est. ol. rosac. inungitur fonticulo, post additur ol. chamæm. nutrix utatur frig. & humidis, degat in aere frigidiore.

Pavor in somno, si à vermibus, à febre accidat, suo modo curatur. Si à lacte corrupto, tollitur vomitu; mell. ros. solut. cum lacte confect. de hyacint. vel corall. exhibeantur. Dens lupi, corallia, cornua, scarabæi lucanici, quem volantem cervum vocant, extra appenduntur.

Vigiliæ. Si à lacte corrupto fiant, tollantur. Si à vermibus, tollantur. Nutrix, nequaquam infans, somnifera sumat mediocria. lotiones pedum potius utiles sunt ex aneth.

fol. malv. salic. vitis,&c. plantæ pedum medulla ossium cervinorum utiliter inunguntur. Capiti tuto ol. anethinum recens applicatur naribus ol. viol. cum pauco suc. lactucæ illinatur.

Humiditas aurium. qua, nisi curetur, ossa erosa surditatem faciunt. dolor est sedandus lacte tep. ol. ros. viol. croco ad absterssionem utile est mel. rosac. & aq. mellis per turundam indita. Item radix ireos,myrrha, crocus, alumen vino dilutum. Tonsill. inflamm. repellent. curatur,ut sir. è ros. sic.

Linguæ vinculum solvunt sæpe obstetrices ungue vel acie nummi, sed sæpe sine necessitate hoc agunt: ut tutissima est,sic aliquando exitialis fuit. Sæpe opus non est incisione. Nihil carnei inciditur,sed nerveum omne. Si denuo coalescat,denuo incidatur. *Fabr.* fratrem suum ad annum 4. mutum incisione curavit,ut semper articulate loqueretur. *Cent.* 3. *obs.* 28. Vid. Lingua. de Haug loglossi.

Catarrhus. Curatur si diæta servetur, nutrici decoctum pectorale detur. Infanti clysteres vel eccoprot. vel vomitus procuretur ol. amygd. dulc. dentur expectorantia. pectus ungatur, sternutatio moveatur, &c.

Tormina ventris. *Heurnius* in primo cochleari pultis saccharatæ ℈ j. sem. anis. pulv. commodissime dat, clysteres, solutiva, Topica prosunt. decoctum vel aq. cardiacæ herbæ datur ab obstetricibus in torminibus ab inflatione,

Nonæ ℔ ℔ ℔

obstabat.

Epomphalia A. Gallerij ex mell. Crocod
farin. Turkiq. obs. XV.

(De his vid. Exercit. meas de Vena
Pedicelli, et de regeneratis
Capillaribus infarctum.

tione, idque recte: herba enim illa cardialgiæ maxime medetur: unde nomen.

Alvi fluxus tempore dentitionis fit à febre, vigiliis, à dolore. Febris calor agitat humores. Curatur ut diarrhæa.

Lumbrici. Signa, os saliva abundat, somnus turbulentus, nares scalpunt, sæpius masticare videntur, tussis sicca. Præservatio fit per diætam. Ante cibum detur decoctum sebesten vel rotul. diaturbit cum rhab. decoct. rad. gram. auricul. muris, suc. limon. citri, guttæ ij. sp. Vitriol. Amara infantes non fuerunt, curantur corallin. sem. santonici, rad. diptamn. alb. CC. aq. & decoct. rad. gram. Commode iis antepileptica miscentur. Si febris adsit, frigidis utendum ut suc. limon. granat. aurant. aceto, CC. Bezoar. lac injiciatur, amara extra applicentur. *Heurnius* seq. commendat in infantibus. ℞. sir. de cichor. cum rhabarb. à ʒ ij. ad ʒ ß. aq. graminis ʒ j. datur pro una alternis diebus. vide Vermes.

Dracunculi, quoniam dracunculis similes sunt, quibus Indi laborant, Die mitteſſer. *Senn.* veros vermes esse vult proferentes capita instar pilorum nigrorum. Compungitur quasi acu eis dorsum, huc illuc se jactant, macie afficiuntur. *Heurnius* ait, manu ad ruborem fricandam spinam & scapulas, postea sola avulsa è lardo pelle, & apparebunt pili. *Paræus* curat fotu aq. tepentis, post litu è melle & farina hordeacea, capita, quæ tunc

exerunt, tenuibus vollellis evelluntur.

Dudith. ep.27. curavit ab iis liberos ſuos balneo, cui injicitur panis in micas fricati manip. cineris parum; elotis pueris, aqua colata, panis innumeros pilos oſtendebat, ſecundo die pauciores, poſtea humeros inunxit farina aceto mixta, qua abluta fiebant tubercula parva, cultello abraſa, dracunculi dicta. niſi autem ocius abraderentur, intro ſe recondebant, unde vermiculi eſſe creduntur à Polonis vetulis.

INFLAMMATIO, Phlegmone, eſt tumor cum calore, rubore, tumore, tenſione à copia, renitentia & pulſu, quibus ab erysipelate diſcernitur. Vel reſolvitur vel ſuppuratur vel in ſcirrhum abit vel gangrænam.

CVRATIO. CAVSA antecedens, ſanguis ſcil. alterandus, vacuandus, revellendus, intercipiendus. altetandus per frigida & humida reſp. febris. Vacuandus per inediam, V.S. purgationem, ſi adſit cacochymia: revellendus per V. S. cucurb. ligat: intercipiendus adſtringentibus ſupra partem admotis & diæta incraſſante. Si affluat ob calorem, dolorem, hic ſedandus, ille ventilandus. Topica in principio ſint repellentia, in augmento adde reſolventia, ita tamen ut illa præponderent; in ſtatu æquales ſint repellentium & reſolv. vires, in declinat. ſola reſolventia. Partis affectæ quoque conſideretur temperies: ſic aliter in carne, aliter in nervo curandum:

diguitas,

Quissa Chone c. Vin. Lambert & A. Gaffery.
Ol. mandibul. equor, H Reufuery.

J. C. Cauling distinguit inter vas,
micator & pilor interantes,
& prop. sua Empirica vadit,
qualis Vid. d. mag. animadversio
in Exerc. de bean. Capit. Infant.

* oculos? et faciem ruber, tui in lentia, insomnia, collisio dentis, oblivio,

Dyss. à ca, & Dys. Lipyr, initia. si biliosa, gravior. Dispathetica: et Sympathetica in diaphragmate inflammato.

dignitas, ſic cor vehemẽtibus non eſt tentandum : ſitus, ſic in profundo fiat fortia requirunt. Via brevior ſemper eſt eligenda. Somnus matutinus conceditur. movetur enim tum ſanguis qui per ſomnum intro trahitur. Si in pus non abeat ſanguis, nec reſolvatur, ſcarificationes utiliſſimæ ſunt. Si ſuppuretur, curetur ut ſuppuratio.

INFLAMMATIO Cerebri ſeu phrenitis ab inflammat. cerebri vel membranarum vel utriuſque. Oritur à ſanguine biliоſo. Interdum læditur memoria ; interdum ſola phantaſia.

Sign. Febris continua, delirium, vomitus virulentus, inſenſibilitas, linguæ aſperitas, reſpiratio magna & rara, urina modo flammea modò alba : in paraphrenitide reſpiratio ſæpe eſt parva, adeſt præcordiorum tenſio, phrenitidem præſagientia nulla adfuerunt. Si ſolum cerebrum ſit affectum, actiones omnes animales abolentur, excepto motu validiſſimo.

Progn. In lethargum ſæpe abit, item in convulſionem, dyſenteriam. Vrinæ pellucidæ & feces albæ calamitoſæ. Si antea furore perciti ſubito quieſcant & dormire putentur, moriuntur. Phreneticis, Maniacis, peſte infectis non prope eſt aſſidendum, nec digiti ori admovendi. *For.* Lud. de Leonibus ſic læſum narrat. *Fab. cent.* 1. *obſ.* 84. ſe à mulie-re phrenetica demorſum narrat.

CVRATIO. Causa est revellenda per V.S. basilicæ, postea medianæ, derivanda per V.S. frontis, narium, sub lingua. Vulnus angustum infligatur. Etiam post tertium diem si vires ferant. *For.* per cucurb. scarif. ligatur, &c. Intercipientia temporibus applicanda. Vacuanda per vere cathartica, cum morbus sit acutissimus ac materia turgeat, si Cacochymia adsit, alteranda bilem præparantibus, Topica in principio sint [repellentia] in robustis æstivo tempore frigida, alias tepida, in augmento addenda resolventia, &c. epithemata frigida hepati, cordi, applicentur. Somnus hypnoticis cautissime inducatur. Chymici laudant sp. terræ sigillatæ sine ullo additamento destillatum, ~~flavum~~ & acidum ad ℈ j. exhibitum. Monendi sunt ut mejant, loci fovendi decoct. pariet, &c. Si offendatur tenebris, in locum lucidum & contra transferatur.

INFLAMMATIO Gurgulionis. Gargareon, [gurgulio, plectrum] glandula est pendula, quæ si infra tumeat, supra gracilis sit, uvula: Si supra æque ac infra in longum tumeat, columella vocatur.]

Progn. Subnigram Chirurgia attingere non debet: si seces, periculum est hæmorrhagiæ insigne. Si exscindas phthisis in metu est.

CVRATIO. Præmissis universalibus Topica sint primo repellentia, addi tamen mel. semper

Cura dirigenda ad cas d ad Symptos
mata.

Arteriotomia. D. St. Jacques.

Regis & repentina, i coſ & cauſ.

Convenit huc Dyſenteria.
Veſicatoria: fricationes & ligaturæ
inferiorꝝ: balnea.
Enema.
Unctiones & Embrocha diſcutientes.
Epithemata Vegetalia: Fulmo ariet.
Gallinæ & Columbæ diſſectæ.
Alba ſicca ſive aquæ diaphanæ, quæ
ſepti ſi ſyncopticæ: ut Hyſte-
rica, ſe cardiaca & alexipharma-
ca ſpecifica.
Victus ſub refrigerans & humectans.
Sitis moleſtior ſupprimi ſolita.

Sp. oeſtriphyllij & Cryſtallo
minerali & margarit.
D. & St. Jacques.

Epithemata Hypochondriaca Sau
dalina c. Diamargarit.

Reuſnery. c. Stypt. Cauſtic
Ladani & Hyp. ſuffitiu

Diagnoſis multis certis ſignis ocularis
inſpectione.

V. S. ſuppreſſæ.
Anorexia, dyſpnoea, fricationes,
ligaturæ.
Scarificatio V. S. ſublingua.
Cucurbitulæ c. & S. ſcarificatæ?

+ ex sacris. vel partheno.

Veraikewáy Xy : ens acutissima ex omnibus
ly inferius, humane multo apparentibus
neq; mikeiq; neq; exterq;.
Ouwáy Xy, cadys fere, sed ex humore
Kacakewáy Xy, mikeana sed ex hu-
more externo.
Kacabwáy Xy, levissa & tenuissa,
ex sola cerussa & olla.
Spuria : vel febris expers, à stabat
pestifera : vel c. febri.

Vid. de regina Cardiaca Cant. IV.
Consil. in exotic. LVI.

ſemper poteſt. In declinatione reſolv. mollientia adde, facile enim in ſcirrhum abit. Externa antequam influxit adſtringentia ſint, lateribus aſp. arteriæ appoſita. Cum facta eſt fluxio, extra molliendum, gargariſmi tamen principio ſint repellentes, &c. Si ſuppuretur, ea promoveatur gargariſmo. Si non ſponte, ferro aperiatur. Et ſi gangræna imminеat, ægyptiacum locum habet. Si fruſtra, uvula, quæ non amplius tumet nec rubet, chirurgia eſt exſcindenda, quod ultimum eſt remedium. Ante & poſt gargar. ſint adſtringentia; ubi rubet, ibi ſuffocationem ex hæmorrh. minatur. Vel cum inſtrumento & filo conſtringatur quotidie arctius. hæmorrhagia cautério inhibetur. Rul. fumum ʒ j. carabes alb.ore excipit & capiti ʒ j. ferment. vet. per diem & unam per noctem imponit. Cerata comeſta hanc inflammationem faciunt.

INFLAMMATIO faucium Anginæ prima ſpecies eſt, cum ambitus faucium interior inflammatur, tumore intus ac foris apparente. 2. cum muſculi externi faucium, colli, oſſis hyoidis, œſophagi, afficiuntur; tumore ſeſe ad pectus diffundente. 3. cum interni laryngis muſculi afficiuntur, ut nec extra nec intra tumor appareat. Orthopnœam infert & ægri linguam exerunt inſtar canum. Vnde cynanche dicitur. Secunda paraſynanche vocatur. Angina Dod. nulla eſt. Prima

Synanche dicitur. Quæ ex vertebrarum colli luxatione fit, notha est.

Progn. leviſſima eſt paraſynanche; hinc ſynanche, hinc paracynanche, quæ quarta eſt ſpecies ubi externi gutturis, muſculi inflammantur tumore intus apparente: peſſima cynanche. Vox obſcura, ſpuma circa os, lingua nigra, ſputum crudum, lethalia.

CVRATIO. Præmiſſis revellentibus, derivantibus, ut V. S. in cubito, ſub lingua: ſi febris præceſſerit vel ſimul invaſerit, quia materia eſt errabunda & turget, purgandum eſſe docet experientia. Si inflammatio præcedat & ſequatur febris, tam commoda non eſt. Sed cito hoc fiat: ut mane facta V. S. veſperi detur purgans; 4. enim die vel ſuppuratur vel reſolvitur vel occidit. Sed diligentiſſime cavendum, ne medicamentum vomitum moveat, metus enim eſt ſtrangulationis, vel clyſteres potius & tutius injiciuntur. Gargariſmi ſint repellentes imprimis, ut ℞. aq. caprif. plantag. nucum ana ʒ iij. fl. roſ. ſic. p. j. coq. in colat. diſſolv. ſir. granat. diamor. ana ʒ j. m. *For.* In infantibus linctus utiles ſunt. Fumi non ſunt commodi. ſuc. cort. virid. nucum depuratus cum melle commendatur à Gal. à levioribus inchoandum. decoctum avenæ. fol. ceraſ. arb. Monent medici etiam in principio aliquid diſcutientium adhibendum, ne humor, qui jam influxit, nimis impingatur. In declinatione etiam adſtrin-

#

Cucurbitulæ c. scarificatione, Epithymi.
Pediluvijs, frictione inferiorum extremorum, ligaturis, enematibus.
Purgantibus.
Vomitoria ex Vrticæ Rad: aliisq; nonnisi primo die sumenda, cathartica secundo inocent. Fid. Settala ex Barbetti Pr. Med. Lib. II. c. 1. p. 50.
Vpericelle Cij. Ladanj. Zij. expulsi Ch. Rulandi.

Garg. ex Vin. d ℔ i. Petr. Sedere finocchi
Cathic. Jambuci, d ℔ i. Salviæ. is epidemia.
Dett. Li: mpulsatiu O. ℔. - - S Repellentia vitanda is malignæ angina, ne epilepsia subsequatur.

Digerentia.
Si opus sit ex Extractis, Syruporum.
Crudezza mitigando doloj.

Saffrochyli pruellas.
Specific. flor. Cinare Salzig.
Ol. fl. Pseudosij c. Sp. vin.
Lentilogistalis cydoniata.

℞ Alij Pfeunt Cinereg Drepanid.
Calmetzy rad. Irer elixt ℞
gamaroz
Cochleas } c. melle.
Nostrg
Catapl. Cameciffi, parietar. & melissh
c. Diverbsh. & plantag.

℞ Cij D. St. Jacobi ad lib.
Pumicis.

Suffitus Sulphuris.
Rad. Syringodendri c. ol. amygd. d.
Succ. Hb. Capparodendris.
Oxycroc. Cor c. ol. amygd. d.
Glycolargyri Cumalis potorij.
Linimentū ol. amygd. al. Emulsh:
فطر الاقطي

Vid. Jusculum Leoglossor
pro Stabia generosa q. H. f.
Aperiendum.
Clysma aeneis pro gelanatis, la-
gynobomia, Cyd. q. Nicol.
Fontanus.

ſtringentia addenda, ne pars per ſe mollis nimis molliatur. *For.* in declin. nidum unum hirund. # conciſum pro gargariſmo præſcribit cum plumis. Alij pro ſecreto habent cancrorum cinerem, vel album græcum, vel ſtercus gallinæ cum melle quod illinunt. Semper detergentia miſceantur: in omnibus enim inflammationibus, quæ tenui cute teguntur, aliquid tranſſudat, detergentibus eluendum. Rondelet. cum affluit humor ſe & multos alios ab angina, ſcrofulis, vindicavit adſtringentibus, quod licet fieri poſſit ubi corpus purum eſt, & pauca fluxio, ſic in magna lethale. Topica ſint mollientia, poſt diſcutientia. Ventoſæ mento vel 2. & 4. vertebræ applicentur, ſi fauces, vel muſculi earum ſint affecti. Si ſuppuretur, maturantia ſunt adhibenda: poſtea aperiatur abſceſſus vociferatione & prono capite, ne pus in pulmones defluat. Nonnulli in rerum omnium deſperatione ſub maxillis vel ſupra collum profundas ſcarificationes inſtituunt, quibus nunc pure nunc ſanguine effluente, ægri levati ſunt. Lignum hederæ ſpecificum eſſe creditur, ſi cochlear inde fiat vel vas quo utaris. Vltimum eſt laryngotomia ſub larynge inter tertium & 4. annulum. Per fiſtulam faucibus inſertam & veſicam ſuillam alimentum liq. injicitur. Eryſipelas in facie ſupervenions, bonum. in colli externa parte

INFLAMMATIO pulmonis. Pe-

ripneumoniæ causa est sanguis etiam biliosus, licet enim ab aliis ob tenuitatem pulmonem penetrare dicatur, tamen cum à pleuritide, quæ sæpe fit à bilioso sanguine, fiat peripneumonia, nihil officit: prout enim aqua in spongia hæret, sic & hic. Causæ autem fluxionis sunt, ut in reliquis internis inflammationibus, humores pravi, quos cum materia ablegat, simul sanguinem expellit.

Sign. Difficultas spirandi major est quam in pleuritide, quam Hippocrates sublimem vocat: dolor est gravativus, nisi forte pleura simul sit affecta quod plerumque fit. Lingua flava est lentore multo obducta, maxillæ rubent. Sitis magna, paralysis sæpe fit rugurgitante sanguine in arterias inter coles nervos comprimentes. Sputum primo sanie, mox cruore tinctum cum stertore quodam.

Progn. Periculosior est pleuritide. sputum nullum vel parum, dolorem non levans malum. *aph.* 16. *s.* 6. sternutationes malæ.

CURATIO. præmissis revellentibus si ab angina fiat, V. S. repeti potest. postea omni ingenio sputum promovendum. Oxymel reliquis mistum convenientissimum est. Topica & reliqua eodem modo fiunt ac in pleuritide.

INFLAMMATIO pleuræ non semper, sed cum superior pars affecta est, conjunctam habet peripneumoniam. Non omnis dolor lateris est pleuritis, ut cujus meminit

Inflamac. & suppurac. linguae
&c.

Curac. M. S. bis ante ter ex
vena med. & semel ex
venulis hypoglottidis.
Gargarism. ex dcto fic. d. vesp.

Suppurata ablatis frigore &c. dctis
tolli & facil. ante mell. resp.

Opapaveratis.
Oeguesi sacchariq. Roman.

interna, vel externa.
Supra, ad manus, et deorsum.
et interna, hypochondriaca.

Diff. et Vera, vel Spuria.
benigna, maligna,
sicca ἀπλυτος, humida.
levis, vehemens.
Solitaria, complicata.
κεφαλογενής, υστερογενής.
Epidemia, sporadica.

Causa externa, fixa, excrementa, cibi,
labor, demissio à balneo.
Causa antecedens, fixa, egressio
febris visitis: Signa, sudores.
Interna signa, per impetum
pus, humoris mixti.
Remota, plethora et cacochymia,
mia, mensis. Suppressio, hæ-
morrhoidis suppressarum, V. S.
Causa intermissa.
ἀναστοιχεῖα, διαιρέσεις, ἔκτασις,
διάστασις, διατύπωσις.
Solutio spasmi vel διαφόρησις et
ἐκπύησις. Suppuratio. vel
ἀναλυσις, vel finalis, et
diarrhœa, sed raro.
Ἀπλυτος vel diuturna, vel tan-
dem finalis.

nit *Heurnius Querc.* c.8. à vermibus excitatus in morbillis, ſcorbuto, à flatu. Eſt autem pleuritis inflammatio pleuræ & mediaſtini à ſanguine calidiore cum dolore punctorio, febre continua vel tertio quoque die vel alternis vel quotidie, pro ratione cauſæ, affligens, cum difficili & parva reſp. pulſu duro, tuſſi vehementi.

S. *diagn* è ſputo & inſpir. petuntur. Si non adſit febris, non tuſſis, nulla exſpuitio, à flatu eſt. *Progn.* Si primo ſtatim die appareat pus coctum, quodque facile ejicitur, brevis erit morbus ſive ſeptimo die terminabitur. Omnia ſputa ſincera, mala, excepto ſanguinis. Vrina mala malum, bona non ſemper bonum. Peſſimum nihil exſpuere, minus malum tenuia tantum. Vel tranſit in alium affectum vel reſolvitur, &c.

CVRATIO. Humor affluens revellendus, derivandus, qui jam affluxit tollendus, dolori medendum & viribus. Ergo ſi levis ſit pleuritis, fotus molliens & reſolvens adhiberi poteſt, vel potius ſi gravior, mediana vel Baſilica ob revulſionem in parte oppoſita, poſt fluxus ceſſationem eadem in latere affecto ad derivationem, aperiatur. Si ſanguis ex arteria affluat V. S. parum prodeſt, repellere, intercipere non licet. *For.* in eodem latere, non ſolum ante, ſed & poſt quartum diem, imo octav. venam ſecat; etiam tempore maturationis parum detrahit, ſed cautè, vi-

ribus fortibus & si summus dolor urgeat. In pueris cucurb. applicari possunt. Si tarde vocetur medicus, in parte affecta V. S. utilis est. Si à suppressis mensibus & tempus purgationis menstruæ instet, & subita facta sit suppressio, in talo aperienda est vena. Si non instet & sensim facta sit suppressio, more solito in brachio seca. Postea fotus moll. resolv. applicari potest, & febris & malignitatis si adsit habenda diligens ratio. his præmissis, si cacochymia adsit & materia ad alvum inclinet, quod è murmure, fecibus liquidis, anxietate conjicitur, purgandum die secunda, quarta, quinta cum sc. fluxio desiit, quod 5. fere die fit *For.* etiam septimo die exhibuit diacathol. ʒ vj. cass. ʒ ß. ʒ iv. decoct. pect. sir. capill. V. ʒ j. Rhabarb. sen. mechoac. agaric. & eccoprotica utilia; à pilulis & vomitoriis multi mortui, Rondeletus clysteres commendat. Febri alterantia, malignitati alexipharmaca debentur, quæ tamen morbum tacite respiciant. His præmissis specifica exhiberi possunt: [licet enim morbus sit manifestus, malignitas tamen peculiaris adest, cui medentur specifica.] Item expectorantia quæ incidunt vel incrassant pro varietate sputi. Post septimum si dolor maneat, Aetius & Celsius cucurbitas scarif. lateri affecto applicant. Vnde certe vel summum commodum vel summum dammum sperandum censet *Senn.* pauci hoc ferunt, non usurpandum

Diamorpha sacchariana.

Vid. Euchir. R. Ms. Tab. ij

In fl. papav. rhoead. crocata.
Papaveratus, cij Corallia ad l. dij
Lucul. Thymena antipleuri,
fig D. Hoffelij.

Specifica: Dentar agri.
Castoris.
Lucij piscis.

Lapp. Germ.
Scarus.
Salix lepor.
Capreolus.
Priap tauri
Corv.
Gamarolitis.
Spuma Cij.
Lucij alb. Rh.
Rad. Lapp. maj.
aristolochiæ.
Vis. Cij pueri.
Cortices avellanæ rubr.
Fl. papav. err.
Sem. Cardui Mar.
benedicti.

V. Tragacanthæ.
Vglacij Martij.
Liquor Hippocrat.
Lapp. tinctorum.
Manati Americani.
Flores Bugl.
Corallia rubra.
Spir Hirciny fœc.
Hepar Cerv. Septembris. Villis
Rad. Scabiosæ. Jo. Pontan
Lucidus clarificatus capsar. N.
Soperiat.
Nasturt. Schroet. Bauhin.
Mag. Myrobalanor. Syngij.
Fl. Eryngij.
Ulmi.
Card. ben.
Cij. Vol

sitis hepatis inflammatio. *obs.* 47. *c.* 2. à cucurbitis hepatis regioni applicatis in hæmorrhagia narium, cui inflammatio successit. unde *Senn.* potius adstringentia quam cucurb. hepati apponit.

Progn. Sæpe lethalis est. ~~quæ gibbam tenet, asthma, tussim magis facit: quæ cavam vomitum.~~ Illa periculosior ob symptom. Solvitur aliquando hæmorrhag. Critica è nare dextra, sudoribus bonis & urina multa si gibba laboret; si pars cava, fecibus. vomitibus. Si secentur, pus amurcæ simile lethale.

CVRATIO, fiat revulsio per V. S. ante 4. *For.* Aetius etiam post 4. tum in lateris dextri Basilica. Si hepatis gibbus laboret, mere eccoprotica valent; si cava, clysteres tantum. Si illa, diuretica valent, hic non. Interna sint refrig. imprimis cichor. endiv. taraxac. suc. lim. Si mitior sit, agrimon. capil. V. addantur; dulcia noxia. Cocta vel diureticis ut sir. de endiv. byzant. &c. educenda vel eccoproticis pro ratione subjecti affecti, in declinatione etiam mechoac. agar. &c. addantur. Topica statim post V. S. sint repellentia frig. vel cal. ne tamen scirrhus fiat ol. de capp. adde: & talia adstringentia etiam in declinatione conveniunt resolventibus mixta. Topica non frigida applicanda actu. Omni studio præcavendum ne suppuretur. Si nequeat, Topica sint suppurantia. Si pus in intestina feratur, puris acrimoniam temperantia

Diamoros Sacharinus.

Vid. Euchir. R. MS. Feb.ij

Tr. Fl. papav. hybrid. crocata.
O papaveratus, cij Corollis add. dij,
Tr. Hyacinthus antiphonarij,
tis D. Hasselbij.

Specifica: Dentar agij.
Castorei.
Lucij pisc.

Lapp. Germ.
Picard.
Tabi teper.
Capreolus.
Priap tauri
Cervi.
Gamarolistij.
Gemma Chi.
Lucij alb. Fish.
Rad. Lappe maj.
aristolochiæ.
L. Visci querci.
Corticer avellanæ rubr.
Fl. papav. err.
Sem. Cardui Mar.
benedicti.
O Hyssopi.
V Stoechados Sacharatæ
pauper. Filo.
Rad. angelicæ Hi.
D. pimpinellæ Hispanicæ
Cicerbitæ Filo.
betonicæ.

V Digitalis.
Vglandis Martis.
Lignor Hippocastani.
Lapp. tiburon.
Mandr. Americani.
Flores Bugl.
Corallii rubr.
Spir Hirundinis sicc.
Hepar Cervi Septembris. Vilingæ.
Sacul. Scabiosæ. Jo. Pontani.
Limaces clarificatæ capan. N.
Doperi.
Nucum, Schaeta Bauhi.
Mag. Myrobalanor Syrupi.
Fl. Cyani.
O Violar.
Card. ben.
CC. Vol.
Scabios
Fuligin.
Hyssopi. O
O Salvæ.
O Rutæ.
Gemma Chi.
Resinæ Mineralis

Empl. Treos. ℞ empl. Barbett.
℥ Cumin. ʒ
℥ mucilag. Treacly. c. o°o Cas.
Succumeh ʒ.
Dia Tylon c. gum. Cumminh
c. o°o Cas ʒ.
Balsam. medlitum Coch.

Tussa deft, dentitio, dolor dentij
hypochondrij: febris ardens, ʒs
sitis, acuta: vomitus, cibi fa,
tidij: singultus. Vapl. ℥ IIX.
Color deterius: Urina cruda,
crassa, turbida: dyspnoea a
compressione diaphragmatis:
vomitus bilis viridis, aeruginos,
fe, & ejectio ejus.
Spuma spis vt pus, unde
expsita: vt pit. lil. melanch.
Unde illegitima.
Extravasata spis, crassi vt pus
vasis, vt ophis a copia, tenui tabi

pandum nisi in valido post diem 14. Si neque resolvatur neque suppuretur, suppuratio promovenda. Si resolvi nequeat abscessus rumpendus. Si non prosint aperientia abscessum, quidam partem aperiunt. Sed raro tumor extra vergit: fit tamen utilissimè si exactè locus affectus explorari queat. Si in thoracem labatur pus, curatur ut empyema. Diæta sit tenuis. *Fab. obs.* 31.32. *c.*5. in latere affecto V. secare jubet. Puero 7. annorum pleuritide laboranti cum alvi fluxu exhibuit Lap. Bezoar. gr. V. corall. rub. præpa. terr. sigill.ana ℈ ß. f. pulvis. R. mandib.luc.piscis ℈ ß. sem. Card. mar. corall. rub. pp. ana gr. 6. fl. papav. errat. ℈ iiij. f. pulv. ung. pector. rotul. expector.

INFLAMMATIO hepatis cognoscitur dolore gravante interdum & punctorio ob ligamentum quod connectitur diaphragmati. *For.* febris simul mox adest, sitis, tussis arida, singultus, difficultas spirandi, facilior decubitus supinus, lingua rubra, alvus supprimitur, nisi conjuncta sit hepatis imbecillitas: tum enim feces sæpe liquidæ sunt vel biliosæ vel loturæ carnium similes. Vomitus biliosus. Si gibbam hepatis partem afficiat, tumor extra apparet rotundus quique fibras cutis non sequitur, quo pacto ab inflammatione abdominis discernitur.

CAUSA. *Fab. Cent.* 2. *obs.* 46. à Topicis calidis, è cardam. cinam. & ventriculo appo-

sitis hepatis inflammatio. *obs.* 47. *c.* 2. à cucurbitis hepatis regioni applicatis in hæmorrhagia narium, cui inflammatio successit. unde *Senn.* potius adstringentia quam cucurb. hepati apponit.

Progn. Sæpe lethalis est. ~~quæ gibbam tenet, asthma, tussim magis facit: quæ cavam vomitum.~~ Illa periculosior ob symptom. Solvitur aliquando hæmorrhag. Critica è nare dextra, sudoribus bonis & urina multa si gibba laboret; si pars cava, fecibus. vomitibus. Si secentur, pus amurcæ simile lethale.

CVRATIO, fiat revulsio per V. S. ante 4. *For.* Aetius etiam post 4. tum in lateris dextri Basilica. Si hepatis gibbus laboret, mere eccoprotica valent; si cava, clysteres tantum. Si illa, diuretica valent, hic non. Interna sint refrig. imprimis cichor. endiv. taraxac. suc. lim. Si mitior sit, agrimon. capil. V. addantur; dulcia noxia. Cocta vel diureticis ut sir. de endiv. byzant. &c. educenda vel eccoproticis pro ratione subjecti affecti, in declinatione etiam mechoac. agar. &c. addantur. Topica statim post V. S. sint repellentia frig. vel cal. ne tamen scirrhus fiat ol. de capp. adde: & talia adstringentia etiam in declinatione conveniunt resolventibus mixta. Topica non frigida applicanda actu. Omni studio præcavendum ne suppuretur. Si nequeat, Topica sint suppurantia. Si pus in intestina feratur, puris acrimoniam temperantia

ter. Externe: cap, frissio,
refrigeratis ab intemperiis,
exercitio violento, animi
pathemata inimica.

Curas, qualis aliarg inflamaorg.
Arcendg influxg humorg diuersos, per V. S. ꝫ brachio,
& ꝫ à mentu. ꝫ pede
reuulsionem, derivare, dissolvendo
doloris mitigare, ꝫ suppurat
materiae & abstersione. #
Catochymis purgat. Enemata
veniunt ex gens lactis
& decoctae per diuretica &c,
lenientia.
Dolor debent anodyna liniata,
fomenta, cataplas. empla.

[# leniter purgantibus ore sumptis,
& clysmate injectis.
Dolorum traumaticor
Remedia.]

ꝫ brachia: ꝫ verò mestrua suppressa,
ꝫ talum vel pede: Hemorroides
aperiendo ꝫ suppressi.
Repellentia & roborantia in principio;
avertendo autem, & influxum sed
efficiendo sepsi, ne adsit,
cutis facilè recipiat.
Repellentia sunt externa, tepida
applicanda, ne vi caloris de,
coris inferat.
Ex gressa discutientia & dige,
rentia, & mixti semper robo,
randi & adstringendi vi gaudia.
Emollientia & relaxantia tum
sepsis, quæ ex studio effer,
vando.
ꝫ sanguinis & minus tuta.
Ex mundificantia, & ꝫ per
alvum ac Urinæ vias expurgantia.
Exsiccata abstersoria: ex dicto
rum, digerentia ex rumor.
Veron. Card. ben. Mellerof.
Hiera picra, Socotrinus rubro.

Diuretica vid. sub to:
Dulcamari, Capill. ſ.
ærii, Fœnic. anisi,
meliloti, Quercus.

Vnct. plantag. arcetos,
pulicar. fragar.
Vnct. rosat. sub. Myrt.
Ol. ros.
Myrtin.
Cydon.
Vnct. rosar.
Cerat. Santalinum &c.

Vnct. ex malv. althæ. melilot.
anethi, fœnic. &c.
Ol. Camomel.
anethi.
Jasmin.
Laurin.
Vnct. stramon.
& fœtentes.
Empl. de Melilloto.

curas difficiles. Pruritus Vulvae
talis. (a antecedentes eximendo
ubicunq; latens, et a finem ſq;
prima, incidenda, attenuanda,
digerenda. Vitalis valde calidis d ſiccantibus. Fomita humida
Mammarum inflatio
Ultra antecedens, remota et finem,
evacuanda. flatus dissipandi.
Phlegmagoga d Hydragoga.
Dieta calefaciens d dissipans.
Mammarum nimia nigredo.
Cura ut Mammarum flaccidae curanda.
Mammarum flaccidae.
Frigidis cum rubicundis e fortibus
Simplicibus d Emplis siccantibus
ac astringentibus.
Mammarum tumor oedematodes.
a tumor seros pituitosus.
Dieta exsiccans gravis d calefaciens.
Purgans. Dissolvens.
Suppurans, si stingat, quis vero
stingat, topicis fomenda.
Olea castor. anethi.
Camomelin. ruta.
rorismarin. laurin.
Juniperi. Juniperi.
absinthii. Pulmonariae.
Vulpin. lil. alb.
Lixivia Originata, prolegata,
melissata, amaracina.
Diaphoretica.

#cies, fies, sem. anis, fœmin
glycyrrhiza.

#dentibus p dextrum lat. molesti:
dolens, vigil ob femoris.

Ja: fis inguen, venas, & femoris
arterias, extrahasta per
ἀναστόμωσιν, διὰ βελόνης,
εἰς τὸ κάτω.
extrahasta. pulsatores ac,
audit.

Jnfus. rhab: c. aceto ♃
♃ ℞ Rom.

curas naturanda. sanat grabedo
suppuro, si fieri potest, impedi,
cida: si suffiõn. gtat: mala
tor magis segnes sagra varicu
alia similia, aut dia rhoea
si suppuro caveq nos ft, tuno
vesicat. ℞ pastillis, immediate
ffolia aurita.

Humor flao, et cruciatus, ad
stibendus adstringens.
Conf. capill. ℈.
Euphr.

#testiculi, vel spuria, & sic vt
ℳ ℈ ℥, vel ℈ ℥ ℈ ℥,
vel ℈ ℥ ℈ ℥.
Quæ tut in spuria ℈ ℥.

rantia ſolum dentur. Si non perfecte vacuetur, clyſter è decocto hordei & mell. roſ. injiciendum: quo tendit pus, eo vacuandum. Si in abdomen confluat, lethale.

INFLAMMATIO Lienis. Dolor, tumor, gravitas in latere ſiniſtro, quæ tamen & dextrum latus ſæpe afficit & hominem quaſi cingit, febris eſt continua quartana, pedes & genua rubra apparent, reſpirationis difficultas, nares & aures palleſcunt. Differt ab obſtructione, quod hic non magna ſit diſtenſio, ſine dolore & febre. Si à flatu, gravitas nulla eſt, exercitium dolorem ſedat, contra in inflammatione.

Progn. Raro phlegmonem, rariſſime abſceſſum patitur, in ſcirrhum mutatur.

CVR. Secetur V. in ſiniſtro, vel in talo ſi menſes ſint ſuppreſſi. mox repellens applicetur ut oleum roſ. cui miſcenda incidentia, aut acetum, ol. chamæm. poſtea humores præparati vacuentur vere catharticis. Sitis quantum poteſt ferenda. Topica poſtea ſint reſolventia more ſolito,

INFLAMMATIO Mammarum. Curatur V. S. purgantibus, alterantibus. Topica ſint repellentia, ſed invalida, ne tuſſis, dyſpnœa, tabes, ſcirrhus fiat. Poſtea adde reſolventia, ſed modica, ne ſcirrhus fiat. Si ſuppuretur, ea eſt promovenda: ſi non ſponte, ſcalpello aperiatur. Vlcus non curatur, niſi altera mamma à lacte ſiccetur, quod fit ſi

lac infanti non ſugendum det & pannum ſtigida imbutum apponat.

INFLAMMATIO Ventriculi. Sign. Senſus eſt tenſionis, tumor ſæpe extra appareret, ſi pars externa, dolor ſumpto cibo non tam exacerbatur ſed cocto, apperitus ſe melius habet, nihil ejicitur ab abſceſſu. Si pars interna, dolor ſumpto cibo exacerbatur, ſi externa, cocto cibo; ſymptomata omnia ſunt vehementiora. Adeſt æſtus, ſitis, febris ardentiſſima, delirium, ſyncope, vomitus. Difficillime diſcernitur ab inflammatione abdominis circa illam regionem, niſi ſymptomatum vehementia.

CVR. Revulſio, clyſteres, repellentia interna, externa. illa actu fere frigida, hæc calida. # Poſtea adde reſolventia: ſemper tamen adſtringentia, roborantia adde. Dolori medere etiam ʒ j. vel ʒ ij. ſir. de papav. ſi ſuppuretur, curetur ut ſuppuratio, & diæta ſe habeat fere ut topica. A Topicis calidis ventriculo applicatis hepatis inflammatio. *Fab. cen. 2. obſ. 46.*

INFLAMMATIO Renum. Sign. Calor, dolor gravis ad veſicam, teſtes, coſtas nothas ſe diffundens; ſternutatione, motu dolor intenditur, ægri erigere ſe non poſſunt. Stupor cruris ob nervi compreſſionem, externa frigent, urina in principio tenuis, in augmento rubicunda. Vomitus bilioſus. febris vehemens. In inflammatione coli dolor.

Revulsio per V. S.
emuno, per S. R. repete, et
evacuatio. Cucurbitulæ
per et ventos.

+ Ista vulgo docent: legunt in
VI. offa. XI. vertebrarum
et ty meliores libb. Hipp. et Gal.
leant Pervilicorum.
Cruor, eadem, et aliarum inflamatorum.

Hanteq; i abscessy transeat: d sic
dez rarò, anteq; rumpat.

Inflamatio scroti.
Hipp. Extrita, à fœ-
mina, è misocellæ humor:
ensifelatoris, oedematodes,
elia hydrocelodes, alia ex
crocodes.
Cruor, infl. testis,
ekxuÿbes, si oporteat, humor
venæ.

Infl. penis. eadem Curatio.
+ averrentibus, derivantibus, repellentibus
intercipientibus: d spissantibus infarcientibus,
discutientibus: aut suppurantibus
suppurantibus si arcerimus, potest.
V. S. y ultimo: d y deambulatio vel
vehem. Scarificatio cruris.
Purgatio catodyne biliosi.

Inflamatio Uteri.

Ca. ffis affluens: vt pus, vt
put. bile, mel. mucy.
Diff. e vt totalis et partialis.
ffis vt attractis vt alienæ rei,
vel
vt distentis insensibilitatem, vt
fœtus abscessus, d suppurat.
Signa. febris assidua, dolor pulsa

lor ad anteriora vergit, & mutatio potius in fecibus quam urina apparet. Si hæmorrhoides superveniant, bonum.

CVR. Revulsio, clyster minori quantitate. Alterantia absque diureticis. Purgantia, leniora. In declinatione diuretica mitiora conducunt. Topica se habeant ut supra. Pus per urinam vacuetur.

INFLAMMATIO Mesenterij. Rara non est sed raro agnoscitur. plerumque hemitritæum comitem habet, adest dolor lumborum, qui supra & circa ventriculum se extendit, feces ægre redduntur. Si circa loca ignobiliora hæreat, febris est lenta, sine siti, sanies per alvum sæpe redditur. Curatur ut supra. Eodem modo & inflammatio vesicæ, peritonæi.

INFLAMMATIO testium. Curatur more solito. Omnia topica ita applicentur ut testes minus dependeant. Intercipiens ad latus pubis applicetur. Commendatur in declinatione verbena cocta in vino, vel panis cum oleo & aqua.

INFLATIO ventriculi fit à flatu generato à causis in colica enarratis: tumor resistens adest, ructus item, flatus. Si à debilitate, ejus adsunt indicia. Si ex alimentis flatulentis, id æger narrabit. Si à materia alia, affectus Hypochondriaci sæpe sunt signa. In convalescente recidivam minatur: si diu duret, Tympanitem.

CVR. Si parva ſit inflatio, carminativa intus & extra applica ut ol. carvi g. iij. empl. de bacc. laur. ſi magna, tollatur prius cauſa vomitu, purgantibus, &c. Gravitas nulla adeſt: dolor non eſt continuus, cum murmure, &c. eodem modo & inflatio hepatis curatur & lienis. Dolor lienis *daz miltzenſtechen*, in liene non eſt, ſed peritonæo & muſculis abdominis à flatu, ſero, ſpaſmum q. flatulentum excitante. Vtilia ſunt chamæm. hiera picra.

INTEMPERIES lienis calida ſi adſit, ſitis adeſt, lingua arida, color flavus, rubor faciei, appetitus dejectus. Frigida contra. Qui debili ſunt liene, ſplenetici proprie dicuntur.

CVRATIO artenuantia, relaxantia non fert lien, ſed moderatè adſtringentia, ut abſinthium: modicè tamen, ne fiat ſcirrhus. Dulcia quovis modo ſumpta, noxia, item acetum. Vnde cort. rad. 5. aper. non in aceto ſed vino macerandi. Fortiora fert quam hepar. Obſtruentia unice vitanda. Vacuatur per hæmorrhoides, vomitum, alvum, urinam. med. amara utiliſſ. Lien bovis crematus in vaſe teſtaceo, lien hædinus ad 3 j. externa omnia cum poſca ſubigenda, ut penetrent.

INTEMPERIES Ventriculi. Frigida curatur generalibus, Topicis. Topica mucronatæ cartilagini verſus umbilicum & in dorſo ad 12. & 13. vertebras applicentur. Corall.

Diatrion pepereg.
Diambr
Diamisu.
Diazalang:
arom. rof:
Diagodis aromatic.
Stomachic. Gallen. de lapi aromatic. obs. XXXII.
Mast. post pasch.
Secta Mystalactica.

ani
focatic.
Juniji
absinth.
Calam-arom.

Elect. de
cora.
Ciceri Helmontij
+ fullitij A. Gasser.

Vj stath Zvi: Smidij M. B
Vnguenti Rom. comp.
T. de gth. Asphaltj Rodij.

Inflatio testium.
Signa: dolor à distensione mem
branæ: & tumor flatuosi.
Cura, flatu, & aqua extra
neum: cui & potu flatulenti.
Cura: distensione, & dolor
tensione tolea, Vrsta,
Cathasmatica, tomita, Empla,
Semiepta S. Josephi.

Inflatio penis.
Diff. pudendagra, à
spu flatuoso, per se.
pudendagra, à flatu,
si putrefacto: à tu, si pla
mone: à sero, si hydrope
Cura, ad eã dirigenda.
Vi. infl. testi.

Inflatio Vteri. ἐμφύσημα ὑστέρου. barb. mola Ventosa
Diagn. tumor, dolor, sonitus
corpore agitato, & vehediori.
pulsato, flatu per cervicem uteri
emissi.
Cura: flatu discutiendi:
untia ex pia, purgandi:
nitentes conjuncta.
& Pro ea sunt specifica Zyte

Vi. Euchr. R. Selij Ms.

Glomiter Organantium veneg.

Heidelb.

Herm. Liebenthaler.
Ferneg. Alberiani pres.

Joseph Danielis Geigerij Med. Doct.
Valentiana Nomad. Hechstetterij.

Ex cornu ol. Juniperino facti.
cura Colegij Pharmacologici.
Tempantibus dysentericis.
Victus Cerussati, Nicolai.
Emplis Galli
grisea, + Lap. Calam.

Jodoxia amylata d. Cerussata.
V. Geranij S. Gratis &c.
Sacharo ppt.
Cinj Glauberiani c. Prof.
Barbetti & Decker exputo.

+ Empl. Stibiat. Croll. Ol. Hyperici.
nigra. Naphth.
Gumpferiana. Balsamin.
Terebinth.

Labiorum fissur. vid. F.

Labiorum ulcer. vid. Ulc.

---

rall. utiliſſ. myrobal. chebul. & extract. galang. Reliquæ intemp.frig.hum.uteri,inteſt. curantur generalibus, Topicis; ut in hydrope, anaſarca; imprimis decoct. Guajac. Chinæ, &c.

INTERTRIGO. Curatur ſuc. vel herba ipſa argentinæ contuſa, ſevo cervino, hircino, candela ſebacea, ol. roſ. vitell. ovorum. adipe anſeris, mucag. tragac. cum aq. roſ. facta. Vide Cruciballano.

LABRA leporina curantur. 1. diſſitorum & hiantium labiorum excoriatione. 2. excoriatorum ſutura. 3. medicamentis vulnerariis. Vide Chirurgia.

LAC quo plus ſeri habet, eo magis deterget, quo plus caſei, cum ſcil. ſerum longa coctione evaporavit, eo magis adſtringit, glutinat. Medicamenta è lacte facta æſtate ſingulis, hyeme alternis diebus iteranda ſunt; acre enim fit & dolores movet. Lac ſpiritum calidum continet in ſe & inebriat. *Scal.ex.*87. autor eſt, Tartaros tenuioribus lactis partibus per ſublimationem ſeparatis uti ad inebriationem. Omnia enim pinguia ſpiritus chymicis ſuppeditant & olea à Spiritibus vix aliter quam ſubſtantiæ modo differunt. Nota. 1. lactis boni, ſi ungui infuſum non dilabatur ſed ſubſiſtat; ſi difficulter dilabatur, nimis craſſum eſt. 2. color lacteus. 3. ſapor. 4. odor.

LACTIS defectus. Si à ſanguinis de-

fectu fit, curatur cibis boni ſucci, medicamentis lac generantibus, vias aperientibus. Sunt autem moderatè calida & attenuantia. Fol. rad. Sem. Fænic. omnia virida & recentia, quod & de aliis obſervandum. rad. petroſ. rec. anethum. ocimum. ſemen aniſ. crucæ, 3 j. vel 3 ij. lumbric. terr. ſuc. fænic. maceratorum, combuſtorum, pulv. uber. vaccæ. per interna & Topica.

LACTIS Redundantia tollitur revellentibus, diæta, repellentibus mitior. non mammis ſed ſupra mammas ad brachium appoſitis venis illis, reſolventibus mammis applicatis. Si inflammatio immineat, etiam mammis repellentia applicari debent. Quædam mammas melle oblinunt feliciter. Quædam linteum aceto imbutum decoctionis croci. Fol. viridia nucum. aliæ linteum ol. rapar. imbutum imponunt, huic aliud melle oblitum & mammas modicè obſtringunt. Singulare eſt ſalv. apij, rut. chæref. folia minutatim conciſa, concorporata cum oxycrato, tepide applicata, ter in die: fiunt & topica è mentha, calamintha, apio, vitice, coriando, cicuta.

LACTIS Thromboſis fit à fermentante humore. an autem hoc in mammis fiat dubitat *Senn.* quia nulla ibi eſt cavitas & putat ſi lac in mammis diutius hæreat, ſerum exhalare, reliquum cogi. Non differt à caſeatione.

CURA-

Intestinorum angustia. Vid. obstructio intest.

Intestinorum inflamatio. Vid. Inflamatio.

Intestinorum ulcus. Vid. Vlcus.

Intestinorum Vulnus. Vid. Vulnus.

Inquietudo.

Ischias. vid.

Ischuria. Vid. Vrinæ Suppressio.

Lagena lac angelus H. Gr. V. o. p.

Sacrificij S. Sacramentum.
Quinquo Vigarij.

CVRATIO. Victus ſit reſolvens. Topica præter generalia ſint reſolventia ut in ſcirrho incipiente, ut ol. lilior. ſenſim ad fortiora deveniendo è fœnicul. aneth. petroſ. apio, meliſ. fol. malv. caulium, &c. intra dantur ſem. fœnic. cumin. apij, vitic. rad. eryng. menth. crocus, ſem. coriandr. &c. *Screvelius* eam ſæpe curavit virid. chæref. & fœnic. ana cum butyro in ſartagine frixis appoſitis.

LACRYMATIO. Oculi vitia.

LAGOPHTHALMIA. Palpebrarum vitia.

LASSITVDO alia eſt non ſpontanea ſeu exiccativa, quæ labores ſequitur, vel ſpontanea: hæc vel eſt ulceroſa, quæ ſenſum punctionis facit in ambitu corporis à vapore vel humore acri, ut bilioſo, atra bile, vel tenſiva à plethora vel quovis humore non acri; vel phlegmonodes, quam qui patiuntur, contuſas & quaſi confractas ſibi eſſe partes querantur, & fit à plethora ſimul & cacochymia; vel gracilitatis, cum difficilis eſt motus à conſumtione carnis & adipis muſculorum poſt morbos magnos.

CVRATIO. Cum laſſitudo ab humoribus circa muſculos & in ambitu corporis fit, tollendi ſunt. Si à cacochymia, quiete, ſomno, cibo parco & boni ſucci tollenda eſt & vini moderato uſu. In ulceroſa purgatio', in tenſiva V.S. in phlegmonode ambo hæc conducunt: à labore, non tantum quiete tollitur,

sed & labore sed minore.

LATERIS dolor Inflammatio pleuræ.

LEPRA Arabum. Elephantiasis Græcorum.

LEPRA Græcorum. Impetigo.

LETHARGVS est inexpugnabilis dormiendi necessitas somnusque gravis cum delirio & memoria læsa & febre continua.

CAVSA antiquis est pituita in capite collecta, quæ sua humiditate & frigore torporem, calore vero putredinali vigilias faciat. Sed impossibile hoc est. Causa potius est vapor narcoticus in febb. comitatis ut quotidiana, continua, tertiana notha & semitertiana elevatus: vel si citra febrem ingruat, à pituitoso sanguine inflammationem faciente: cum ex obs. *For.* adsit sæpe talis inflammatio quæ in sphacelum abit. Sicque duplex est causa lethargi.

Diagn. excitati ad interrogata vix respondent, omnium obliviscuntur, pulsus magnus ob respirationem ab obliviscentia parvam. Vrina instar jumentorum. Differt à caro, febre.

Progn. Intra septem dies moriuntur, quos si superent, evadunt. Sudor frequens, tremor, convulsio, singultus, lethalis. Pulmonia, paralysi, parotidibus lethargo succedentibus, si lethargus cesset, bonum, si non, lethale. Si sanguisuga fronti imposita non hæreat, vel si pane aut lardo frontem frices,

quem

Lentigo. vid. Facies: aut: Skandy facies.

Differt à Pharo, ga ẏ hoc nulla
febris, d somnus ꝓfundior.
2. à Phrenitide, ga ẏ hac febris adꝫ
tissa, ẏ illo lesa, ga ẏ hac ca
e ẏꝑ vigilias, ẏ illo ꝑturba,
ga ẏ illa vigilig ꝗ agendi, ẏ illo
somnus.
3. ab Apoplexia, ga hec respi
ratiua, ille sensꝰ inuadens: ga
ẏ hoc respiratio manet, ẏ illa
pulsatꝫ minuit: ga ẏ illa or
animalꝫ functiones abolent,
ẏ hoc ꝑseverant sed languent.
4. à Catalepsi, ga ẏ hac omꝫ
ti actꝰ, ẏ illo omnigꝫ.
5. à Spasmo Uterino Symptom.
6. à Comate, ga ẏ hoc sopor
ꝗ delirandi remittit, ẏ illo sti
mꝰ

Pentapores ꝗ post longas febꝝ.
Ethus c. ꝗ Lethargo Carus in
febre ipse putabat Simach
us. Cent. II. Schol. ẏ cen
XXVII.

Humoris mitis. Serij u. postig et Atialig
observatoe G. Galeag lib. 3. tit.
Med. f. 231. dig vira se. gstaut.

Ech. Catholig c. Castoreo d oo Succinj.

Enphing et hepatho mineze.
it. rutaceg Castoreat c. ~ ℥ij.
F. Castorij c. ~ ℥ij.

Dotta chalastica oxijaxij, Cal. arom.
anthg, Salvig, Pson. acoj.
l. amarog, Salv. amygdal. c. ~ anthg.

Pneumoniq accidentibg, et excitan-
tibg. Pneumonijs, vellicatibg
vulsionibg, frictionibg affis. J.
Enphimj, Staronicq.
Expurgt, et Consolidt maj. bibitg ad ℥ij.
Dolg Salutig et viro bacipisadenthg.
#Roborantia nog omittenda.

Lienis dolor.

Diff. Veg, z ipe lienis: d Spurijs, pan
dig viscerib.

a Etima: veg, Solutio gtinuj,
membrana lienis distenta.
Distensio a. ab obstructoe, Spu
stulento, inflamatoe d Sug,
rum, Scirrh, Hipp. II. apho XLVII.
Partis vicinag, gstipat ig Colo
g lienis vicinis membranosis
Diaphragmate, ig stomacho, d ig renis
Partis lienis regioni vicinis mem-
bris.

quem vel quod si canis famelicus respuat, lethale. Idem in aliis capitis affectibus obtinere dicitur.

CVRATIO. Potissimum in revulsoriis consistit, V. S. quæ citius instituatur, nunc parcius, tempore frigido si à sanguine pituitoso, nunc largius, V. S. frontis vel pedis, cucurb. scarif. fric. & ventosæ cervici appositæ, glandes, clysteres, hirudines. Postea purgandum: est enim morbus acutus. Repellentia topica mox applica. In cephalalgia pituitosa non utitur repell. *For.* sed in lethargo. excitandi sunt. à revellentibus non est desistendum. postea curatur ut cephalal. pituitosa tam ratione internorum quam externorum. Si frustra sinapismi scapulis, vertici applicantur, roboretur caput. Chymici ol. vitriol. dulce, extractum castorei, imprimis sulphur lunæ commendant. Pili cremati cum aceto illiti, castoreum, cerebrum leporis assatum & panis biscoctus antipharmaca.

LEVCOMA. Oculi vitia.

LIENIS inflammatio. Inflammatio lienis.

LIENIS intemperies calida. Intemperies calida lienis.

LIENIS scirrhus. Scirrhus lienis.

LIENTERIA est cum cibus crudus ejicitur non coctus. fit vel à retentrice ventriculi & intestinorum læsa, vel expultrice

eorundem irritata. #

Diagn. Si prius, cœliaca præcedit, nullus dolor ſentitur: ſi poſterius, cæliaca non præceſſit & morſus ſentiuntur.

Progn. aph. 1. *ſ.* 6. ad tabem deducit. Si poſterius, dyſenteriam præſagit.

CVRATIO. Si prius, materia ſi adſit per vomitum vel alvum vacuetur è decoct. hord. non excoct. myrobal. rhabarb. agaric. &c. roborant. adſtring. poſtea per interna & topica adſtringendum, roborandum. *Fern.* in fine exhibuit vitellum ovi aſperſo pulv. unius nucis moſch. ſupra tegulam ignitam aſſatum. Si poſterius detergentia, ſiccantia moderate, purgantia exhibenda. Humorum acrimonia temperanda eſt ut in dyſenteria.

Lienteria eſt continuus fluxus, cœliaca fit per intervalla.

LIGAMENTORVM vulnus. Vulnus ligamentorum.

LINGVÆ ariditas in febribus. Febrium ſymptomata.

LINGVÆ magnitudo ſeu tumor interdum abſque dolore eſt à copia utilis alimenti affluente, aliquando à cacochymia, & tunc vel œdema eſt, vel cancer, vel inflammatio, & interdum à morbo gallico, ab inunctione hydrargyri, à morſu, vel tactu beſtiæ venenatæ.

CVRATIO: Si à copia ſanguinis vel inflammatione, revellendum, vacuandum ut

in

vt generatim lega.

Externa ℞ refrigerantes, laxantes,
irritantes, & euacuantes remo-
uenda.
Item ℞ fluxum distringentibus fis
tendum.
Ventriculi vitiemper corrigenda:
ipse roborandus: Equiseros
Humanda.
℞ dieta: Lac chalybeatu: Pyza
lacte cocta: Pultes milliacei;
Ptisanæ: aromatu: Syrupi
laxi.
Actuata vit. ij ℞ Scutellæ d diarrhœa.

Collationes ex dicto Origenis, Cala-
mitatis, Egyptiorum Sanctarum, San-
ctæ, Isaac-Lauræ & similis.

Exercitia jejunandi a totis emolli-
tis, & mundificantia & tem-
perantia, demum & solidantia ad-
hibenda.

in phlegmone. Apud Galenum ruſtico per inſomnium monſtratum fuit linteum duplex ſucco lactucæ imbutum. Si œdema ſit vel à morbo gallico, vel à veneno oriatur, curatur ut œdema: ſi cancroſus ſit tumor, incurabilis eſt.

LINGVÆ paralyſis. Paralyſis linguæ.

LINGVÆ vinculum. Infantium linguæ vinculum.

LINGVÆ vulnus. Vulnus linguæ.

RANVLA eſt tumor ſub lingua pueris familiaris, rarius inflammationis, ſæpius œdematis rationem præ ſe ferens. Mucus erit ovi alb. ſimilis, interdum & citrinus. Cauſa eſt humor tartareus vel pituita è capite defluens. Curatio. Præter generalia Topica ſint reſolventia ut pulv. ſalis, hyſſopi, cort. granat. ana 3 ij. quo fricetur. *Senn.* incidentia & reſolventia requirit. *For.* pulvere ſupraſcripto utitur ut & aq. plantaginis ℔ ß. mell. roſ. ʒ ß. balauſt. 3 j. ß. alum. ʒ ß. bulliant. hæc adſtringant & fortè in principio conveniunt. *Senn.* declinationem vel ſtatum reſpicit. [Si fruſtra, *Paræus* laminam ferream perforatam hianti ori reſpondentem ori ita applicat, ut tumor foramini illi reſpondeat. Poſtea per foramen ferro fiat uſtio, exprimatur ſanies & os eluatur hordei decocto, ſacch. & mell. roſato. nihil humoris relinquatur: facit enim recidivam. *Gal.*] non libenter ferro aperit metu hæmorrhagiæ. Vulnere etiam ſub mento facto

mox pus effluit, quod fit si os commode aperiri non queat. In infantibus *Senn.* pulv. salv. aut origan. cum melle ros. miscet cum sp. vitriol. gutt. ij. vel ossis sepiæ salis gem̃. piper. ana ʒ j. f. pulv. mento vel sub mentũm applicat empl. è sterc. anser.

LOCHIA. Partus.

LVES Venerea morbus est occultus hepatis & reliquarum partium : an calidus an frigidus? cum copia pravorum humorum à concubitu impuro genitus. Fiorav. illum ab esu carnium humanarum factum scribit. Leoninus ab astris & humiditate A. 1493. alij à coitu Elephantici cum scorto. Huttenus l.6. de Guai. è Spaniola allatum censet.

Curatur. 1. Guajaco, rad. chinæ quæ odore & sapore caret & calida non est, sars. parill. fol. saponariæ ut ℞. cort. ligni ʒ j. aff. aq. ℔. vj. Zvvinger ep. 234 vel ℞. ras. ligni ℔ j. cort. ʒ j. macera in ℔ x. aq. puriss. coquatur ad consumtionem trium partium. *Laur.* spumâ asservatâ frontem, tempora, &c. inunge; sumat omni manè ʒ viij. Fecibus adde ligni ʒ ij. Aqu. lib. xij. Coque ad ℔ v. pro potu; feces denuo coquantur pro lotura manuum, frontis. 2. Hydrargyro quod *Senn.* calidum esse asserit. vid Fern. Laur. Par. qui partes duplices in hydrargyro agnoscit quod rejicit Senn. Venenum est, licet vivum minus lædat, quia cito vacuatur. Colatur per pellem arietinam, post cani exhibetur,

Lingua pustulæ. vid. apostz.

tumor.

scabritiei & nigredo.

inflamatio. vid. Infl. ling.

Lipothymia.

Lithiasis. vid. Calc. ren. & vesic.

Lues Sarmatica. vid. Elia Polon.

vs. Celidonij. P. Marcelly.

Vid. dust. ung. ad Marcelly Cu[ra]
mary obs. IV.

Arcam Talzocolkiy Tetragonensis
a Zj.

Ech. Sellch. mjn. c. Ozp. Hulzjd
Ech. L. S.:
Szp. + polypodio Sellchaft. J. B. Manthey
Caryocostino Hydrangyeth.

Pyrop Lycomedallig fiey
Car. Vidmany.

Vinny bijum: Ech Fi: Fiscinelica.
Dzyothalyma Ech c. O Dzyphor.

Calkarsky Hildrothiy Vandolag
vensi.

Hermanny usly ny tuty vinovy, sed et
Salchiy, Ech H. Hermanicky.

hibetur, per anum redditum elixatur in aceto cum herbis nervinis. Senn. parum hoc prodesse censet, cum axungia, &c. in cute maneant, nec ita ad ima penetrent. ℞. axung. porc. ʒ vj. butyr. rec. ʒ iij. ol. lumbric. vulp. ana ʒ j ß. his incoque salv. roremm. &c. hydrargyr. præp. ʒ iv. ceræ q. s. ungantur internæ pedum ac manuum partes & articuli cum dorso. Ne ptyalismus ulcera oris faciat *For.* gargar. ex oleo amygd. d. præcavet. Ab unctione annulus aureus ore contineatur, pil. ex auri scobe exhibeantur: sic enim reliquiæ hydrarg. auro adhærebunt. Mercurius morbum non curat, sed causam tollit, vi purgatoria. 3. per emplastra. 4. per suffitum qui modus periculosissimus est, ut ℞. Cinnab. ʒ j. Benioni. myrh. styrac. oliban. ana ʒ ß. mastich. macis, tutiæ ʒ ij. excipe Terebint. ℞ fiat suffitus. Si infans sit correptus, nutrix per 5. dies se præservet aq. Theriacali, papillam semper abluat. pustulæ pueri ungantur ung. enulato cum Mercurio pauco. *Par.* in peste & febb. Petechialibus utitur unctione cum hydrargyro. Si decoctum ligni recusent ℞. sars. parill. ʒ iij. Cort. lign. Guajaci ʒ j. cinam. ʒ j ß. fol. Sen. ʒ ß. sacch. ʒ iv. f. pulv. dos. ʒ ß. variat Senæ quantitas. inde mane unam horam sudet & vitet ventum borealem. *Monav. ep.* 242. & *Zac. l.* 1. *hist.* 71. morbum Hipp. notum esse censet & oriri à nimia Venere. Vng. è mercurio ut re-

Panacea Hundelij, et Spiritus ejus Spantometallici.

cens: fermentatione enim amittit vires. *Par. l.* 20. *c.* 5. luem ven. sola humiditate venenum esse asserit. Diæta non sit tenuis quæ vires minuit: quia morbus est chronicus. In solis morbis acutis, qui breves, utilis diæta tenuis, vinum tenuius conceditur. Motus vehementis multos curavit. ~~è Guajaco ol. non destillatur. Spiritus difficillime~~] Extractum fit cum menstruo idoneo.

LVMBORVM dolor. Dolor lumborum.

LVMBRICI. Vermes.

LVMBRICI infantium. Infantium lumbrici.

LVPVS. Cancer.

LVXATIO. Causa est vel interna, ut humores, vel externa ut lapsus, vel hæreditaria, ut cum acetabula non satis sunt cavata, vel ligamenta nimis laxa.

Diff. 1. Quando ossis capita ex acetabulo suo excidunt. 2. cum ossa juncta dehiscunt: ut scapula ab humeris recedit, cubitus à radio, fibula à sura. 3. cum luxationi fractura est conjuncta, ut cum epiphysis ab osse divellitur. Illa facilius restituitur, ista nunquam percuratur; quia ligamenta sunt vel abrupta vel effeminata, hæc penitus est incurabilis.

Diagn. Eadem ut in fracturis. Vera luxatio facit motus abolitionem, subluxatio difficultatem. Si à laxitate ligamenti, sensim

fit

Xylocatharticum.

Hydrogogum Tenfelij

Stomachica: et Lilium Glaucolgi Lar:

Decoctum c. Extr. Seamon. Sol. anis. d. Philosophis Lyncelli.

V. Hordeum perlatum.

Cerev. c. Guajaci c. Tabulae potabilis.

Mellago Antisiphilica c. alcohol vini. Restoratico meum.

Pil. fol. Nagueu.

Syrupus Judicij.

Saponarij.

Opobalsamum.

Diaphoretica.

Restoratica mineralia Cia.

Eff. Anubarij.

Acidum L. petrolitch.

Cliff Palancapatch.

Philosophis Lyncelli.

Hydrogogum Sol. Antipathici.

Extr. V. S. c. O. G. Vol. 3ij

Pil. Lapidij. ad gr. jss.

Eff. Lapidis Lyncelli. e Guajaco

Saffafr. e Rhodio Chymistarum

Arcanum Cogniji Carpathici Cuicatzi.

fit luxatio & facile in contrariam partem pellitur. Digitus nullo corpore resistente articulationem subit.

Progn. Corpora sicca difficilius luxantur & reponuntur, humida contra.

CVRATIO. Si adsit inflammatio, tollatur antequam restitutionem moliaris. Si vulnus & fractura simul adsint, Hipp. satius esse putat restitutionem non aggredi, nam ea tentata certa mors, ea omissa claudicatio tantum in metu est. Antiquæ, antequam reponantur, Topicis sunt molliendæ. Vel si reponas luxationem cum vulnu. & fract. & superveniat inflammatio, restitutum os sine violentia è sua sede exturbetur denuò. Primo omnium extensio facienda, in qua primo videndum ut rectè teneas. Sic si humerus, vertebræ vel femoris ossa sint luxata, totum corpus; in iuguli vero, cubiti, manus, genu, pedis, cruris luxatione pars affecta arcto ministri complexu tenenda, ne totum corpus extensionem sequatur. 2. ut trahas vel manibus vel machinis eousque quoad caput ossis è sui sinus regione positum fuerit ac liberum; sit inter os luxatum & cavitatem intervallum, ut sc. labra acetabuli illæsa maneant. 3. ut ossis capita leniter ante mota & circumacta in sinum suum compellantur eadem via qua exciderit, quod probè factum ex strepitu colliges, dumque hoc fit, funis contentio est remittenda, alias possibilis non est. Secundo

apte deligetur cum medic. adſtringente ut in fractura. 3. ſymptomata corrigantur. Luxata clavicula multi decepti ſunt putantes eſſe luxationem humeri.

LVXATIO vertebrarum ad interiora lethalis. *Fabr.* tamen modum curandi tradit, ſed non tutum. Ad extra gibbus fit curandus repoſitione, thorace ferreo multis foraminibus pervio. Fit vel ex aſthmate vel cauſa externa vel humorum copia. Huc pertinet illud malum, cum æger nimis grave pondus attollere tentavit, *daſz vvebethun* dictum: quatitur hic undecima ferè vertebra, non luxatur ſed concuſſa movetur. Dolor adeſt dorſi circa ventriculum, appetitus dejicitur, cum vomitu aliquando, caput dolet in infantibus præcipuè, febris quaſi maligna. In adultis hoc curatur ut luxatio à quibuſdam. Exhibetur cum commodo ung. rubrum potabile, oculi cancrorum. *Senn.*

Humerus reſtituitur vel mantili ex collo renodato vel calce chirurgi vel humero altiori miniſtri vel pertica vel ſcala vel gloſſocomio *Ambi* dicto. Luxatio claviculæ multis habita eſt pro luxatione humeri. Eadem enim ſunt ſymptomata; Triduo quoque ſolvenda eſt deligatio, & varie, leniter tamen motitanda pars, ne ancyloſin incurrat.

Femore antrorſum luxato, inguina tument, clunes rugantur, ſola parte calcis poſteriore terram contingit, urina ſupprimitur. Si re-

trorſum

Repositio triplex: palæstica, memoriæ: methodica, rhetoricæ: topographica, medicinæ. Epist. Ferdinand. LXXXIV.

Partitio triplex. ?
S. a Cyllaro c. gram.
Empyl. Aquileiæ.
Glossemmi & spacium Vett. & grotesque inclusit, rejicit G. Fabricius Holiday. C. V. obs. LXXXVI.

℣ polygonati.
genticanæ.
scrophulariæ.
Linariæ.
fl. fabariæ.
Verbasci.
prim. Veris c. Vin.
til. alb.
chelidonii maj.
bryoniæ.
Succ. Limon.
Serpentariæ.
aurantior.
Cinam. aquos.
lapath. ac.
Jul.
Sabinæ c. Cryst. tartari.
℣ Cristobior c. Tartari.
Aloëtici.

Magister. S. Apostoli, Gloriosi, melioris
alterius.
Prof. Castrensis.
Lac Matris Dei.
Ol. Myrtilli.
Mellis.
℔ Cosmetici.
Ol. Tali.
vitell. ovor.
ricini.
amygdal. amar.
Vnth. Citrin. Nicol.
Lac Virginis.
Ol. Cerae ℔ tartari.

trorſum, clunes tument, in inguine cavitas adeſt. Crus ſano brevius eſt, genu flectere non poteſt. Calx terram non attingit. Scipione ſe ſuſtentat. Si extrorſum, poſt aliquod tempus miteſcit dolor, circum occaleſcit caro, caput oſſis in vicinia novum ſinum cavat, ita ut ſine ſcipione incedere poſſit æger; brevius fit crus, genu & pes intro ſpectant, in calcem incedere non licet, crus flecti poteſt, totum crus minus emaciatur. Si introrſum, minor eſt claudicatio, eius flectere non poſſunt, pes longior eſt; Incedunt crure extrorſum obverſo ſcipione fulti, promtius in calcem quam digitos innituntur, tandem facto novo ſinu abſque ſcipione incedunt.

MACVLÆ Ephelides *vel à ſolis ardore fiunt*, cum ſc. color mutatur in fuſcum. Præcavetur ſi facies & manus illinantur ov. alb. conquaſſ. cum aq. roſ. vel emulſ. 4. ſem. frig. Curatur in feminis abſterſione cum foliis ceraſi rec. vel aq. roſ. in qua camphora ſoluta eſt. aliæ gummi ceraſorum in aceto diſſolutum cum pauxillo farinæ avenaceæ uſurpant.

Vel à Cauſa interna ut in gravidis, virginibus à retentis menſibus, eſu rad. bet. rubræ, &c. maculæ ſunt fuſcæ, interdum palmi magnitudinem æquantes. Curantur emulſione è ſem. cannabis, ſuc. rad. bugloſſ. expreſſo.

Lentigines fiunt à vapore aduſti ſanguinis

utiliſſima eſt aq. ſcrophul. è tota planta deſtillata. Coſtus, braſſicæ ſemen & Fuci.

MACVLÆ congenitæ ſecundum *Senn.* ab imaginatione matris fiunt. *Par. l.*23. illæ à menſtrui quadam portione uteri lateribus à recenti adhuc fluxione adhæreſcente, aut quodam velut rore è venis ante tempus deſtillante fiunt: grandiores incurabiles, item verrucoſæ, lividæ. lavantur ſangu. ſecundinæ, etiam menſtruo, ſaliva matris jejunæ.

MAMMARVM inflammatio. Inflammatio mammarum.

MANIA. Cauſa eſt ſpirituum vitalium & animalium fervor, quo frigus promtiſſimè ferunt, febrim tamen non faciens, ad multos annos durans. Vnde occultam adeſſe qualitatem vult *Platerus.* Cauſa antecedens eſt vel ſemen corruptum vel aduſtus ſanguis, & ægri cantillant. Signa adſunt plethoræ vel bilis aduſtæ & ſunt temerarij, audaces: vel bilis atra & ſunt ſigna melancholiæ; vel Venena ut cerebrum felis vel philtra. Vinum fulmine congelatum. Dæmoniaci ignota loquuntur, vel hæmorrhoides ſuppreſſæ vel ulcus clauſum.

CVRATIO. Inchoanda à V. S. ſic Platerus plurimos, qui in domibus publicis alebantur, curatos vidit V. S. ſexagies nunc hic nunc ibi repetita. delectus venarum neceſſ. non eſt. hæmorrhoides, ulcera clauſa aperiantur, poſt alterandum. bibant ſerum lactis,

Macula Variolarum.
Emuly. s. Canabin.
Vlentin. d rof. bambace adusta.
Vngto Cerus. d Litharyri.
fomat. c. Mag. Marcasite d Litharyri.
Vfl. fabar. d rof. mg c. Mag. Margarit.
Pulu. thymalli. 00 myrrhe d Myrrhin.
Ol. oroz cupr. c. C Vitriol.
Liq. Hellebor.

Malacia. Vid. pica.

Mamarum adfect. Vid. Gynæc.

Lac materum.
Embryomphaly deciding c. V Christophoriang.
V Sarzaphyllat. mixtang d.
Vng Lupinor. d Centaurij.

Depravand. tuto inuniuor, sed ch
asser: mg c. multis d histrihas, sed c.
Mercurij, Aucarij Lucchis, Ada
tumely XVII. diuers. XXV.
Pc. d of xxiiij. Mem. VII.
audacia d temeritate.

Vt Idiopathica e, vt Sympathica.

Ca externa d interna. Illa aeris ath,
civitas Gratiæ, mutata, venena Ty
pia, pestilentia. Illa externa d
remota. Proxima et Intima sens
vidit dispositio, remota, ffer
ferueus, bilis, febris ardens, ex
halones Aer. Manifestis a. pestis
Sens occultus accedere ex Sympt.
tendit gstat.

Prognostica Judiciorum Hereda
Aurelij Campolongi mett.
gstat. c. XII. Mss.

Judicator adhibendi arebij Summus:
à ta, à numeros aquisti, d à
cordis viribus. Vigilia vigentes
mitigandæ.

Refrigerandus in dieta d pharmacia:
medicis externis d internis.
Jusculla alterata refrig. d cardiacis.
Pisculis, aqua Sympt. d dulci.
Julepia, electa, pstiones ex Cons.
d Vrefrig. d Sulcis. Tuchs d
cyll. refrig. gstis. ffer cordiales.
Emulsiones. Externa Oxycrato
dina, embrocha, frontalia, genu
Liniuenta. S. Januarij gstat.
Balsamij. Olea c. Castor. d Sympt.
Ca Santali rubij c. Vnos. Castor.

℔ c. Topasio d antimonio. ℔.
℔ Syr. asining. J. Hartmanny.
Hyacinthina Etrusca d Neapol.
Austr. Bestiar. ℔. Long.
Ech. Germ. M. D. Rhen.
V Cord. Herc. Saxoniæ.
Austr. Unicorn. Bel. R. Hisp.
℔ Lincken abentheyr. zu Augsp.
N. à Buchaim.

Confortantia cardiaca sine nec
ria: interna & externa.
℔ Manhang.
Ech. Ethiopi.
℔ Lap. Selidony. Hedera arb. d
derbena. Ocy. angelici. marj.
Solanj. tetraphylli.
Lac Lilij.
Sacchar. ℔. Coral. L. Lapid.
phij. Opij. pulv. Cydonior. angelic.

V. de Monsano Universali. ord.
mus & C. C. Conf. LVII. & C. II.
Conf. LXV.
V. S. Schenckij. Gal. Bauhin
& R. A. Severino Landen.
Hayeckij medicati. Fonta Hart.
D. Moscrophij.
Bünighof Herrschaft.
Die Chur c. o. o fl. pens.
Herrn Cellenberg: Herrn.

Sen. Capeck.
Falckenwoden.
Balthas. Dünthofer. J. filius.

Medicatum inflamatio. vid. infl.

---

ctis, purga. # Cor exhilarandum ut in melancholia dicetur. Somnifera. # Empirica sunt # cerebrum arietis nondum ven. experti, cerebrum canis unicoloris, fol. buxi. rad. nymph. luteæ. # Amuleta sunt rad. eryng. bryon. hyperic. commendatur nitrum quod volatilia figit, Sp. vitriol. Topica sunt refriger. & potius humectantia, ut ol. ros. & chamæm. &c. tepida. Specificum creditur topicum succus cancrorum vivorum. ##

MARASMVS alius est deurens seu hectica marasmodes, alius est frigidus & siccus. dicitur hectica senectutis seu ex senectâ morbus: alius syncoposus qui calidus est resp. febris, frig. respectu syncopes.

MATRICIS hydrops. Hydrops uteri.

MATRICIS procidentia. Procidentia uteri.

MATRICIS suffocatio. Suffocatio uteri.

MELANCHOLIA est animi angor in una cogitatione defixus absque febre & furore, à phantasmate melancholico ortus. Subjectum proximum sunt cerebrum & cor quod demonstrant affectus. Mel. cum febre vidit *For.*

Diff. 1. Cum cerebrum primario afficitur. 2. per consensum cordis & totius. 3. Hypochondriaca. 4. ab utero. Quæ ab hæmorrhoidibus, liene, &c. ad hypochondriacan pertinet. Prima non fit à nuda intemperie.

alias enim actiones non imminuerentur, & si à frigore, senes inficeret: fit ab humore in capite nimis terreo // huc pertinet amor insanus, seu delirium à nimia animi sollicitudine inedia, vigiliis, ira, genitum.

Secunda fit ab humore mel. in venæ cavæ & arteriæ magnæ ramis hærente & sp. vitalibus impuris, unde & continua ferè est: adest cordis frigus & siccitas, præcessit terror, vigiliæ, &c. Tertia fit ab humore melanch. in vena porta hærente, unde per intervalla affligit, circa hepar, omentum, lienem. si vapor non communicetur cerebro, affectio hypochondriaca saltem est. Huc facit quies, alvus suppressa.

Quarta fit in viripotentibus viduis à suppressis mensibus & hum. mel.

Diag. Si prima, delirium est continuum, vehemens, hypochondriaca salva, tinnitus, vertigo, capitis gravitas, &c. divexant. Si ex amore insano, hilares sunt. Si secunda, totum corpus est melancholicum, delirium continuum non est, &c. facile in maniam, epilepsiam, &c. abeunt.

CVRATIO. Causa alteranda, vacuanda, intemperies per vices tollenda, caput corroborandum. Si amor sit insanus, semen extinguentia danda, cœlum mutandum, &c. Verbena gestata venerem extinguit: item mentha. ~~Vnde Proverb. mentham tempore belli nec serito nec edito.~~ V. S. convenit.

καὶ μανία Ἱπποκρ. III. aph. XIV.
μανία. Athenæus lib. II. c. 1. qui vid. & Festus insaniæ genera
Παραβίοκοπες Eustathius in Homer. Iliad. α. III. 18
Mel. VI. genera H. Cardanus: melan-
cholicæ, furores, amores, rabies,
Hydrophobi S. Cathabati, & lycan-
thropi. Com. in VI. aphor. XXIII.

Quarta insaniæ species recognita
à Fonsecâ Romæ, anno Jubilæi
Cartesii universi l. epist. XXI.
& XXX. vid. C. II. Cas. Ep.
XCIIX.

ἡ melancholica, scabiosis ἕξις, &
καῦσος χρονία. diversa à καῦσος,
λιγυρὸς χολή.

Ἡ pancreatis ἕξις, & lactis ἐν ὑδέρῳ
ὄγκος ἐστίν, ἀλλὰ καὶ lymphæductûs.
Ἡ communis omnium corporum universo,
variis modis, sed variis propriis
affectus.

Cardiaca nunq̃ omittenda.

Cort. alkerm. &c. electo de ovo, Margarit.
&c. & Coall. laudat D. de St. Jacq.

Imò satis comoda est, si nunq̃ fa-
stidij haberet # vigentes farragi-
nes simplicium insuaviu.

Deq̃ medicatis libenter nihil ad-
dulcis.

Quod nunq̃ fistit, & deq̃ cabendum.

Hemorrhoidum actiones, & effectus &.
& Symptomata: aut salutes & pe-
culiaria indicia, quæ ante rupta
sinendæ.

Hemorrhoidum affectiones, & effectus &.
& Symptomata: aut salutes & pe-
culiaria indicia, quæ ante rupta
sinendæ.

Embrocha Camerarij exquisita. D.
St. Jacques.

Embrocha Camerarij exquisita. D.
St. Jacques.

Hemeti R. lib. 1. part. 2. c. 13.
Hemorrhoidum curatio, & Bernard.
Gordonio part. 2. R. c. 69. de cura
ij, quæ per vas. Ital. Schiarallo
& quæ per loca ex. dois. cum lib.
2. Pr. c. 10. [capula] sed potig.
sanitatis de cura Melancholiæ, auth.
& auctor. de cura Frenetici, ad cogn.
nos alios & Lycanthropia.

Hemeti R. lib. 1. part. 2. c. 13.
Hemorrhoidum curatio, & Bernard.
Gordonio part. 2. R. c. 69. de cura
ij, quæ per vas. Ital. Schiarallo
& quæ per loca ex. dois. cum lib.
2. Pr. c. 10. [capula] sed potig.
sanitatis de cura Melancholiæ, auth.
& auctor. de cura Frenetici, ad cogn.
nos alios & Lycanthropia.

Oenodyli seu Lignitz &c. vall.
Ol. Dragensij Crocatij.
Cons. authæ mosch. &c.
Rad. Serpentin. gdil. Cicut.
Mag. Sarmatici Justinbach.
Mumia Composita Glycocholi.

Infus. H. Solaronici S. Split
is vino: Venceslai Lavinij
expulso ap. Jo. Rumler.
obs. LXXXII.

H. Melampodij vel pimpi
arcana G. Agathonij.
Heat. II. obs. 20.
Lapidis Lazuli. Dom. Sala.

Embrocha Camerarij exquisita. D.
St. Jacques.

Omnibus medicamentis miſceantur robo-
rantia & humectantia. Conf. Hamech tam
commoda non eſt; Vomitoria, ſerum copio-
ſum, parum enim non prodeſt. decoct. ab-
ſinth. chalybs, acidulæ. Thermæ & Balnea,
quibus multi curati ſunt à Galeno. Topicis
lieni, cordi, ventriculo applicatis, victus ſit
humidus. Quidam Trypanon admovent ca-
ſu edocti. For. multos curavit leniente poſt
decoctum puleg. & centaur. min. modo cum
ſyr. de Byzan. modo de mentha, de abſint. mo-
do de borrag. pomis, bugloſſ. levibus vomi-
toriis, modicè purgantibus, decoct. abſinth.
& diureticis. [*aph.* 11. *ſ.* 6.] *Scholtzius*, *ep.* 241.
ubi Monavius de nobili Bohemo à philtro
morlente.

Si quarta, dolor eſt varius, imprimis ſini-
ſtri lateris è regione cordis, qui univerſam
mammam interdum prehendit, manifeſtus
pulſus eſt in dorſo circa diaphragma, menſes
parcius fluunt. V. ſecetur in brachio ſi adſit
plethora: Si inſtet menſium tempus, in talo,
purgetur. melancholia errabunda ~~Arabibus~~
~~*Kunubuth* dicta.~~ menſe Februario potiſſim.
homines infeſtat: ægri ne horam in uno lo-
co manere poſſunt, ſed continuo vagantur,
neſcientes quo vadant. Fit per cerebri Idio-
pathiam. Curantur more vulgato.

MEMORIA debilitatur ab intemp.
frig. humida. Curatur ut cephal. pituitoſa,
alterantibus, purgantibus, roborantibus, im-

primis confert anacard. quæ conf. ſapientum appellatur, qua multi admirandam ſibi memoriam compararunt. Sumitur ad 3 ß. & infra. Vehementer exſiccat: unde ſi pars aliqua princeps calida fit, memoriam quidem acquirunt, vitales tamen non ſunt. Poteſt abſq; Caſtoreo parari ut gratior ſit. Omni mane occiput & nucha fortiter fricetur cum aq. hæder. arb. ter quaterve deſtillata in alemb. vitreo. ſecretum ol. Thuris, myrrh. &c.

MENSES albi. Fluor muliebris.

MENSIVM Profluvium fit eodem modo ac hæmorrh. narium, &c. ſigna eadem. ſæpè incurabile eſt. diapedeſis facilius, anaſtomoſis facile, eroſio difficulter curatur.

CVRATIO. Revellendum per vices V.S. cucurb. mammis appoſitis. 5. *aph.* 50. humores bilioſi temperandi, purgandi, per interna & externa conſtringendum. Vetula quædam incurabilem curavit exhibendo novem vicibus 3 j. pulv. oſſ. hum. cum vino rubr. Si à pravis humoribus, temerè ſiſtendum non eſt. *Guainerus* magno experimento exhibet 3 j. cineris ſtercoris capræ. Si partum excipiat talis enormis effluxus, mulieres hoc arcano utuntur: Nucem juglandem exiccatam & pulveriſatam tribus vicibus exhibent cum vino rubro, vel carnem antiquam fumo induratam annum excedentem terreaſtam & ſiccatam. For. ſeq.

℞ Sel Hofmanno lib.. de med. offic. c.
pulv. Cort. Citr. ℥ss, ℥ss mucil. ℈ij
ftimo usu delinare coepit.

Elix. ℈ij. ℔. & Vesicatorij.
Mag. d. ℈ Margarit. c. Vncis ij
vel saloris d. meliss. Lavend. ℈ss.

Externa: Loma ambarata.
troch. pretiosi moschati.
Suffitus cephalici.
Balsama odorata.
Linimenta medicata.
Cucurbitæ
Apophlegmatismata.

Cephalica compl.
℥ss Corallorum.
Margaritarum.
Hiacinth. sine Opio.

ἀνεθεος κεφαλικος ὑπὲρ καταρτικῶν.

Semel sæpius plenum inanitio

Curatio ejus respicit externa & in
terna; & nisi flegma bilemq;
temperet, aute ora remordet.
V. S. si vires ferant, & flegma
nondum longe duxerit.
Calidia ejus refrigeranda: tenuia
incrassanda: acria mitigandi:
biliosa, put. mel. expurgandi.
Anastomoses occludenda: corrosa,
rupta, aut dissecta vasa glolis,
fouda, & fil. emplastricis adi
stringentibus.

℞ Succi portul.
cucumeris.
Cydoniorum.
Eglesi.
Plantag.
portulac.
Sal. prunell.

Syr. berber.
granat. acid.
Fragor.
portulacæ.
Conf. rosar. rubr. ℈ss.

Coral.
Sacchar. tabi.
Pil. de Bdellio.
† Cynoglossa

Pastilli

Specifica ex Pharmacopoea.

Pessi Vaginales.

Externa: Pulv. Cornachini.
Virgula plicata: extract. Ulmi aqueus. Mucilago Fenugraeci.
Cerat. Saturninum. Ol. Olivarum. Ol. Myrtillorum.
Empl. de Cornibus. Ol. Rosarum.

Ἐπιχείρησις τῶν καταπλασμάτων.

Primo visitandae, et V. S. vitalo.
Tum Historia investiganda, deinde explorandi
Causa Emenagoga: Bolus, Injectio,
Balneum, Embrocationes, Peraeum, Fo-
mentum, Ser, -or, Extractum, Pilulae.
Externa: Balnea artificialia et
Naturalia, Unctiones, Suffimenta,
Gargarismata, Pediluvia, Clysmata, Pessa-
ria, Fomenta humida et sicca,

Primo visitandae, et V. S. vitalo.
Tum Historia investiganda, deinde explorandi
Causa Emenagoga: Bolus, Injectio,
Balneum, Embrocationes, Peraeum, Fo-
mentum, Ser, -or, Extractum, Pilulae.
Externa: Balnea artificialia et
Naturalia, Unctiones, Suffimenta,
Gargarismata, Pediluvia, Clysmata, Pessa-
ria, Fomenta humida et sicca,

arm. oſſ. dactyl. ana 3 ß. detur duabus vicibus in ovo ſorbili. Topica omnia adſtringant. Injectiones utiles ſunt, & ſuccomillef. plantag. ſanguinar. &c. peſſi. lotio crurum è frigida. Rad. nigell. ſub ling. detentæ, lapis hæmat. rad. papav. errat. muſcus arbor. ſub axillis geſtatus, ſanicula & fragaria plantis pedum alligata.

MENSIVM Suppreſſio fit vel à ſanguinis vitio & defectu vel viarum anguſtia. Diſcernitur ab imprægnatione quod gravidæ plerumque natiuum corporis colorem retinent, hilares ſunt, in menſ. ſupp. contra. Symptomata gravidarum quæ in principio fiunt, indies miteſcunt, in illa contra. In gravidis motus & ſitus infantis tertio menſe percipitur; in illa nihil. Si ſex menſes duret, curari non poſſe, ait Hipp. Anguſtia fit vel à craſſis humoribus vel tumore vel balneo adſtringente.

CVRATIO. Non moventur in extenuatis, cachecticis, in quibus paucus ſanguis. Moveantur tum cum antea fluere conſueverunt. In uteri inflammatione vel procidentia menſes non moveantur. Si ab obſtructione quod freq. fit & adſit plethora, V. ſecetur in brachio ad tollendam plethoram, quæ ſi maneat, ſectio venæ in talo non prodeſt: cum enim omnis ſanguis ad uterum ſic trahatur, alter alterum detinet & impedit. Contra *Zac. kiſt. 76. lib. 1.* Cucurb. ſcarif. ligat.

frictiones partium inferiorum. Mercurialis valde commendat cauteria infra genua. Quod negat *Senn.* quoniam alios humores ab utero derivant. post purgandum alterandum & quidem sæpius; tandem menses moventia: ut pulv. dominarum ℞. sem. sesel. ammeos, cinam. ana ʒ ij ß. cumini ʒ iij. sem. fænic. apij, carvi, nuc. mosch. calam. aromat. galang. ana ʒ j ß. Zinzib. macis, caryoph. ana ʒ j. croci ʒ iij ß. f. pulv.

Topica sint mollientia & menses moventia; ut balnea, olea, suffitus, evaporationes, clysteres, pessi. *For.* in suppressione mensium cum cachexia primo exhibuit pil. de hiera cum aq. artemis. postea decoctum longum purgans, potionem purg. Theriacæ ʒ j. cum ʒ ij. vini albi; repetitum fuit decoctum prius. Talis potio. ℞. diacathol. ʒ vj. el. indi. maj. ʒ iij. sir. capill. V. de artemisia ana ʒ ß. cum ʒ iij. decocti artemis. puleg. meliss. pro una. balneum è matricalibus, à balneo femora inunxit ung. ℞. ol. amygd. d. lil. butyr. rec. medul. crur. vitul. ana ʒ j. ol. amygd. amar. mucag. althææ sem. lin. fenugr. ana ʒ ij. succ. rut. artemis. ana ʒ ß. ceræ parum f. ung. postea ʒ j. theriac. cum ʒ j. juris cicer. rubr. Instante primo quadrante Lunæ Saphenam aperuit: sed cum venæ non apparerent, cucurb. scarif. cruribus applicavit & sanata est. Si non juvissent, autor venisset ad decoctum ligni admiscendo diptamnum, cujus vires

(Semper cum malleolis, reputo fr. Fissimelic. sæpe

℞ artemisiæ
absinthii
angelicæ
Juniperi
Calaminthæ
Camedryos
Camepityos
Chamæ
Fabariæ
Serpilli
Sabinæ
Fœniculi
Salviæ
Hysopi
Melissæ
Nepetæ
Hyssopi
Origani
Majoranæ
Rosmarini
Serpilli
Fœniculi
Salviæ
Hysterica Cum:

℞ artemisiæ
absinthii
angelicæ
Juniperi
Calaminthæ
Chamæpityos
Chamædryos
Betonicæ
Melissophyllo
Hyssopo
Fœniculi
Marrubii
ℏ ℥. add.
Hysterica Cum:

℞ Hed. Terrestris.
Juniperi
Fœniculi
Absinthii
Chamædryos
Chamæpityos
artemisiæ
marubii
Origani
Majoranæ
Calaminthæ
Betonicæ
Melissophyllo
Hyssopo
Fœniculi
Marrubii
Salviæ
Hysterica Cum:

℞ Herb. Hederæ Terrestris
Mentastri Damasc.
Fol. Rosmarini
Origani
Majoranæ
Calaminthæ
Betonicæ
Melissophyllo
Hyssopo
Fœniculi
Marrubii
Salviæ
Hysterica Cum:

℞ Herb. abs. artemisiæ
angelicæ
Calaminthæ
Cam. Cam.
Origani
Majoran

Pestem epidemiam,
vrinas, & alvum interuos.
De pestilenta pituita; & par.
&c. vid. Hippoc. IV. apho. XXI.
& LXXXI. & Gal. 5 com:

Mictio mucosa; ℞ decoct.
Zizyph.
a: epithem. vesicæ: calid:
vlcer. partis alicuius, & corporis.
Aff. renum.
Calculus ex crapula diuturna.
2 vrinæ: per paracent.
abstergentia.
Emplastra.
Dietetica.

Mictio nigra. ℞ decoct. cæs,
salva.
Diff. intensione coloris.
à externa: ab ingesta.
Interna: mel: ℞ decoct.
calculus tostus ag. fennel.
Sym. lethales à cal. malignæ qualitatis,
curabilis, ab admixtis humor.
nigris: salubres ex, & artificio:
& sæpe generata cacochymia
ac diuretica.
Curat: & spirantia: Calybeata.

rasta, erosa, calido, Urina acq. 3 ab Urtic. cum similib.
aff. 4. à senib., à calido intemperie, aut validior, tonsu
vulnere, vehementione: anglomoh. à copia, fervore, e
Prolapsus ani debilitate. IV. aphor. 78. 4 ab Hepate, aut
Prognost.
; flatu, Hepatico. 4 à plet
; vesi

Curatio. Adstringenda.
Si ex ruptura veng. S. M. è
basilica vel axillari, Liberis aff.
Purgas c. rhab. et Syr. rosar. sol.

Consolidantia: Rosar. et Cahiabe.
Astringentia ex solo Frumen.
Spec. Diarrhodon.
Diatrionsantalon.
Emily. aurigo. d. c. Corall. rub.
Succ. Capill. Calybeat. c. Pul. Alexandrino.
Syr. è rosis sicc.
Rob Vini c. farina filiginis: Raseg.
Calli? exturbandi una cum radice
Sanguis Copia V. Sæpius ad.
Menstrua suppressa, et se morbides
Hysterica, Gestanda.
Sanguinis Defectui Vasa
Astringentia et Consolidantia
Sananda. Quum sit Debilitas
Venis: ut Sanguis fiat crassus
vel Acrimonia Biliosa.

Dieta vid. ag. Mens. Fem. Gra
conf. CXVII.a
Emily. avellan. mund. Conserv
Externa: Cataplasma ex
astring. flav. c. Vin. alb
Jo. Beverovii Epist
Lapis Renig Pulveriano Pha
lis F. Matth. Hertodt

Hydrocystides gaungr.
Mesenteriy obstructiõ. vid. obstr.
absconss. vid. absc.
tumor. vid. Tu.
dolor. vid. dolor.

sæpe est expertus Jacchinus. Sabina, Semen nigellæ 3 j. in decocto, vel ejus farina panno illigata & supposita egregia est. vide partus difficult.

MENSIVM stillicidium fit vel à sanguinis crassitie & acrimonia, viarum angustia, & dolorem facit: vel ab retentricis imbecillitate & sanguinis tenuitate & sine dolore est. Curatur mitigata acrimonia, facultate roborata, angustia sublata, &c.

MESENTERII inflammatio. Inflammatio mesenterij.

MICTIO Involuntaria fit à resolut. vesicæ & sphincteris, à sola resolutione vesicæ urinæ suppressio. *Solenand.* tanquam secretum laudat pulv. gutturis galli tosti cum vino rubello vel posca diluta sub horam noctis. laudantur & testiculi leporis combusti.

MISERERE. Ileus.

MORBILLI febrem semper comitem habent putridam, aliâs continuam, aliâs intermittentem. Causa est sanguis menstruus, aer & diæta: si sanguis sit crassior, variolæ fiunt; si tenuior, morbilli. erumpunt die 4 critice. Fluxus alvi, pectoris angustia, urina cruenta, raucedo, lethale. Moriuntur enim vel ex angina vel syncope vel alvi fluxu.

CVRATIO. Ante eruptionem variolarum in non valde teneris, si febris sit continua, V. S. convenit. alias non. lenientia dentur

vel clysteres; in augmento & statu expellentia, cardiaca; mitigantia ex usu sunt temperata vel frigida pro ratione febris. *For.* tale præscripsit. ℞. hord. mund. p. j. liquirit. ras. ʒ ß. cicer. rubr. ʒ ij. semin. frig. maj. an. ʒ ß. flor. cordial. an. p. j. fic. pinq. No. iij. coq. in colat. ʒ vj. dissolv. sir. granat. ʒ ß. pro 2. Infantes è sententia For. rubro panno involvantur, ita tamen ne cutim tangat. decoctum lentium utile est, non in substantia. sem. nap. citri, aquilegiæ, card. bened. sub forma emuls. epithemata lethalia fuerunt. Vel nunquam vel cautè sunt maturandæ. butyrum sæpe obfuit. non sunt aperiendæ nisi valde malignæ. pustulæ maturæ oblinantur ol. amygd. d. sic vestigia fœda non manebunt. Oculos servat aq. ros. cum exig. croco Postea etiam additur suc. fænic. rut. verben. fragar. Sapphirus oculis puerorum admotus eos præservat. *Crat. ep.* 160. nares præservat aq. ros. cum suc. agrest. posca, &c. auribus instillatur ol. ros. myrtin. myrtill Fauces mire præservat gargar. è lacte caprill. & aq. plantag. Pulmones seq. ℞. sir. granat. dulc. ʒ ij. sacch. penid. ʒ iij. sir. ex infus. tosar. Diamor. ana ʒ ß. diatrag. frig. ʒ iij. amyl. puriss. ℈ ij. f. eclegm. secretum est. Infantibus ficus dentur cum sir. granat.

MORBVS gallicus. Lues venerea.

MORBVS hungaricus. Febris hungarica.

Narium polypus.
Diff. à mytte, sibi, figura, colore.
à sanguine bilioso, crasso. Substratus
melancholicis, ut G. Regenerans.
Curat per Cir. vid. Sinus to.
pendula. Vin. vitios. adstring.
Sicci et Vbi.
inuncta aloëtica, Oxa sulphurica,
Vngentum Cruciata.
Salicis, Solani, plantag.
Cathmagi cadmiæ et cerussæ.

Vngentum Capitis folij Rosata, Egyptiacum.
et Vnguentum ex Rosa alb. et Vngentum.

Nausea. vid. Vomitus: gradibus n. differunt
à causa mytte: non sibi.
Causæ ferunt. vehiculum depravatum vel ventriculum sive inanitatem
Signa ap. Galenum.

Nephritis. Nephritici dolor.
vid. Inflammatio et renes.
Calculus.

Morb. Virgineus. D. Febris alba.

MORBVS regius. Icterus.

MORSVS canis rabidi. Venenum.

MYDRIASIS. Oculi vitia.

MYOPIA. Oculi vitia.

NÆVI materni. Maculæ congenitæ.

NARIVM hæmorrhagia. Hæmorrhagia narium.

NARIVM ulcus. Vlcus narium.

NERVORVM vulnus. Vulnus nervorum.

NODVS. Ganglium.

NOLI ME TANGERE. Cancer. Gutta rosacea.

NVBECVLA. Oculi vitia.

NYCTALOPIA. Oculi vitia.

OBSTRVCTIO hepatis fit cum obstruuntur venæ & arteriæ in parenchymate hepatis. Ca, pituita & bilis melancholig. Ict. rosa

Diagn. æger gravitatem & mox ab exercitio vel cibo dolorem sentit in hepate. In acclivi ascensu insueta difficultate spirandi premitur, alvi dejectiones liquidæ & copiosæ: si cava pars, sitis adest, nausea, sigibba, diaphragma magis premitur. fit à vapore & adest pondus, vel a flatu. si cava pars sit affecta, facilius curatur.

CVRATIO. Si adsit plethora, V. S. convenit, ut tutior sit vsus aperientium, quæ omnia calida sunt. Corpus purgetur, aperientia exhibe Si causa sit calida, frigida aperientia dentur, ut cichoracea, lactuc. sem. 4, fr.

maj. cum aliis calidis. Vtilissima sunt absinth. abrot. & amygd amaræ, item sem. aquileg. Sirupus aperiens Sennerti, Scholtzij de cuscuta; à quacunque causa fiat, utilia sunt tartar. vitriol. quod Croll. digestivum universale appellat. Crystall. Tartar. Chalybs. A nimio aperientium usu ingens malum. Sumto aperiente æger in latus dextrum decumbat. Topica quoque sint aperientia. *For.* miraculose seq. conferre scribit. ℞. hepatis lupi præp. ʒ j ß. sp. diarrhod. abb. diatrag. frig. ana ʒ ß. rhabarb. ammoniac in aceto soluti ana gr. iiij. dissolvatur in decocto cuscutæ, capill. V. cum aq. fænic. buglos. scabios. lupuli cum sacch. q. s. f. rotulæ pond. ʒ iij. Vetteres dabant ʒ j. hepatis lupi cum vino sine febre, cum febre cum succo seridis. Cremor Tartari, Trochisci de capp. & de scolopendrio. Topica ung. fotus, &c. eodem modo in liene curatur obstructio:

OBSTRVCTIO meatus auditorij.

Si à verme illapso sit, vivus, si queat, provocandus dulcibus, ut pomo dulci asso, appositis fermento, melle. Si frustra, necandus est succo absinth. nucl. persic. centaur. min. ol. coryli, ol. philosoph. spir. vini, suc. fol. sambuc. cannab. instillato. vel oleo cum accto. Interfectus educitur infusa aqua, ol. vino, immissis turundis terebinthina imbutis, ei enim adhæresci vel simili.

Si res sint duræ, meatus ut lubricus fiat,

ol. te-

Vid. lor. pp.

Vini Galeoffini diglossati.

Vapij
foenic.
petrosel.
Quinq.
pimpinell.
agrimon.
betonic.
marrubij.
Hyssopi.
Capill. ſ.
Cichor.
Taraxaci.
Cum rheo.
Cum epithym.
Cum Polypod.
Cum Polypodij M. D. Th.
Cum Polypodij. ℞. &c.

Syr. è 5. rad. aperit.
absinth.
fumarij.
verben.
Capill. ſ.
Byzantin. S. &c.
Card. ben.
acetos. S. &c.
Oxymel. S. &c.
Scillitic.
Rosar.
absinth.
Hyssopi.
Cichor.
Endiv.
Cichor. cum rheo.
Fumarij.
Scabios.
Card. ben.
Dauci.

Conf. fumarię.
Cichor.
Hyssopi.
Ech. gentian.
Scabios.
Galangæ.
Angelicæ.
Θ.
℞.
Θ.
Fumarij
foliorum
Lamij
Philosophor.

Obstructio pancreatis. V. Obstr. Mesenterij, & cæter

Obstructio lienis.

Signa: grauitas & dolor sinistri hypochondrij, & tensio à cursu. Color corporis luridus, hydropica, cordis palpitatio.

Progn. diuturnior transit in hydropem.

Curatio: per aperientia, & astringentia:

Vapij, fumar. Cichor., radicis,

Phlogosin cum splenalgia

V. Scabios. & lumbric.
Succ. Scabios. cum Acetos. & Fumar.
Infus. & Ect. Oleastri. R. Ʒij.
Ess. Ect. Ech. foliorum.

Vide ch. ult. Foto.

ol. tepidum inſtilletur. At ſi res ab humore intumeſcat, humida non applicanda. Sternutatio movenda naribus & ore clauſis. Si fruſtra, volſella, ſed cautè eximatur. *Paræus* inſuper cùm antiquis ſectionem auris inſtituit, quam plane ut noxiam improbat Aquapendens.

Si aqueum quid, antiqui oleum infundunt & aurem pronam habent: æger ſuper pede è directo auris affectæ exſiliat, capite in aurem inclinato. Si fruſtra, ſternutatio concitanda aut ſpongiola ficca auri immittenda. Eſt & alius modus apud *Senn.* per ſyringam quoque immiſſam ore extrahitur. Sed obturanda auris cera.

OBSTRVCTIO gulæ à re dura tollitur volſella, ſi res conſpici queat. Si non in conſpectum veniat, cervix ægri pugno percutiatur. Vomitus oleis ut amygd. d. jure pingui moveatur. Quidam bolos majores deglutire jubent. Candela cerea vel ſtilus plumbeus incurvatus, melle vel oleo oblitus immittitur & res deturbatur. Tuſſis injectis acidis excitetur. *Fab. obſ.* 3[illegible]. *Cent.* 1. commodius inſtrumentum deſcripſit. Vide *Senn.* Si fruſtra, res naturæ & tempori committatur, & topicis maturatio per cataplaſm. mollientia promoveatur: ſedata enim inflammatione res ejicitur.

In aſperam arteriam ſi inter edendum quid illabatur, ſternutatio conducit, dorſum pu-

gno concutiatur.

Si in oculum arena incidat, fem. hormini, oculi cancri, margaritæ, oculo imponantur; ſub palpebra oculus claudatur & res oculis cancri adhærens ſimul excidet. Si fruſtra, volſellis eximatur. *Fab.* uxor ferrum magnete exemit.

OCVLI vitia vel afficiunt Tunicam adnatam & corneam; ut

OPHTHALMIA, quæ ſi levis ſit, à fumo, ardore ſolis, vini potu, Taraxis dicitur; ſi fortiſſima, ita ut album ſupra nigrum intumeſcat, Chemoſis vocatur. Si à ſola plethora ſive bile, id è ſignis cognoſcitur. Curatur generalibus revellentibus, ſublata cauſa procatarctica. Venæ temporum ſunt adſtringendæ. V. S. convenit in brachio ejuſdem lateris, etiamſi à bile orta ſit: bilis alterata purgetur. V. frontis ſecetur. Setaceum efficaciſſimum in diuturno morbo. His præmiſſis ad Topica veniendum. Sæpiſſimè enim ſolis generalibus tollitur & *Mercurial. Galenus*, *Mercatus* uno ore monent, ne topica in principio ophthalmiæ applicemus. Multi enim cæci facti ſunt medicamentorum copia; parciſſimè applicentur, fronti tamen & temporibus tutò repellentia in principio applicantur. Lac oculis inſtillatum corrumpitur & acre fit, niſi ſingulis horis mutetur. Repellentibus ſemper detergentia ut lac, crocus, ſarcocolla, addantur. Opiata ſp. opticos in-

media. Dolg. [illegible]
Jmitina. Boadia media.
V. S. Scarificado.
Pulsus. Diaphoretica.
Vretica.
Specifica Antipsorica, & Antipsoria

زهر المشادير و الاسفل و الاعلى

Oculorum inflatio: Encephyca-
Cranch Quinsij Universalis, Ser
topica calef. d. Sentientia, d. flatu
d. Ilejantia. Majoran. rosmarin.
ruta, Origanu, Calamint. Pulg.
thymbra, thymu, cephalia, Sem.
anisj, foenic. vino d. ta.
S: à gladio calidos at avis, refrij.
gelatinat, anodyna, Linimta
refrij. c. Oj. Vof. Plantag. re
frig. Mucaginos S. Gdon. Oglij &c.
S: ab ictu arane, Linteola imp.
uenda V. Scordij, aristolod. Scabios.
plantag, gentian. Scabios, Valerij
ana, Sepij. Ulcer. Anthid.
Diascordio Fracastorij.
Acetij vehem. d. applicanda;
Lamina plumbea vel Jea apponenda.
Ol. Momordic.

Verrucas, excrescentias vacuolas
& echinatas aufert, &
topica.
Erysipelas curanda: Pestis Draconarij &c.

Vpluvię Majalis). c. Oron. d
Cyfar. infolata. Com. ab Hel
fenstay d. Hertbergen, all.
Saubars Sautio d Lap. Cala,
minarij &c. ff.

Vovi rec. fo macdrasti. Henrio.
Burghardy.

Rodostalgma Cyrcatry Barbettij.

topica primo repellentia, ut dixerunt.

incrassant, raro adhibeantur. Semper admiscentur quæ proprietate oculos respiciunt, Frigida oculo sano conveniunt ad præservationem, tepida ad frigida inclinantia si repellere velis, ad calorem si discutere. Non simul temporibus & oculo repellens applicandum. *For.* collyrium alb. Rhas. sine opio ad ʒ ß. modo lacte modo aq. ros. solutum oculo instillavit, etiam cum opio in dolore summo. In declinatione sola sarcocollæ ʒ j. nutrit. in lacte, soluta in aq. fænic. euphrag. ol. è ß. cichor. vel cyani cærulei per insolationem factum, emuls. sem. papav. croci, opij ana gr. III. cum cataplas. *For.* Crocum metall. laudat. *Rul.* cum aq. euphrag. Vinum commendat *Hipp.* Sed refert *Zuvinger.* in theatro, P. Ramum Lutetiæ à nimiis vigiliis ophthalmia correptum, quem cum I. Sylvius vinum bibere jussisset juxt. aphor, vehementer crevit malum, ut cæcus fere fieret. *Galenus* balneum laudat post universalia. Sarcocolla nutritur lacte crebro & parce affuso, ne acescat. [Si chemosis adsit, ovi luteum cum carne muscæ terito linteolo excepta imponito. *Gal.*]

OPHTHALMIA sicca si sine pruritu est cum duritie palpebræ, Sclerophthalmia vocatur. Si oculi cum dolore pruriant nec tumeant, sed rubri sint, vocatur Xerophthalmia. Si pruriant cum exigua fluxione, Psorophthalmia vocatur. Curatur genera-

libus. Topicis mollientibus. Cuidam consultum fuit à medico ut alb. ovi cum aq. ros. oculo applicaret, rad. chelid. contus. cum fermento apponeret, & fol. ejus cum rad. contus. pedibus supponeret. In omnibus oculi inflammat. fortioribus seq. præ aliis fuit commodum. ℞. Cerus. lot. ʒ j. amyl. ʒ vi. gum. tragac. sarcocol. tutiæ præp. ana ʒ ß. camphor. opij thebani ana ʒ j. aq. ros. q. f. f. massa, cujus portio exigua dissolvitur in aq. ros. & cum pluma stillatur in oculum. Infiniti eo fuerunt curati.

PTERYGION, Vngula, est membranula nervosa ab angulo domestico plerumque orta, adnatæ tunicæ valdè adhærescens, ad pupillam aliquando protensa, ex ophthalmia, morbillis, vel fluxione diuturna orta. Pannum membranosum non est, sed è venis turgentibus quid complicatum. Sæpe est cancrosum. discernitur à carne lachrymali quod radix unguis semper ad albedinem magis declinat.

Progn. Si adsit suffusionis principium, ungula non curetur. quæ pupillam contingit si chirurgia tollatur, cicatrix tamen visum impediet. Albicantia & angusti fundi facilius curantur.

CVRATIO. Præter generalia & adstringentia temporibus applicata topica sint primo mollientia, post detergentia. Efficax est pulvis testarum ovorum aceto maceratorum siccato-

carificae.
V. S.
Urinæ ℈ vndecio.

Vngt. ℞ Comitissæ.
alb. Caphurat.
℞ Fuchs.
Diapompholyg.
Nitri ā ocular.
Ol. ℈j.
Sief alb. Gal: ℈ ß-ogis.
℞ Ebu Mastich.
Arteriotomia ∇ vel. plantaj. frigor. incrassata.
Cataplas. ex medull. panis c. lacte
fuly. pomor. dulc. c. croco et Caphura.

Incrassata phlebotomia postridie,
pro.

Topica initio à notoriis, ut di-
gressia à thesi.

ſiccatorum, ſi puluis oculis inſpergatur. *For.* rubram ungulam eſſe aſſerit & mobilem: præſcripſit primo omnium ſeq. ℞. fol.malv. m. iv. ſolani m. ij. ob inflammat. ſi adſit, viol. nenuph. fl. roſ. rub. ana m. j. fiant duo ſacculi, coq. in aq. ſ. expreſſi moderate calidi applicentur oculo quater. Poſtea ℞. fl. chamæm. melil. ana m. j. ſem. fænigr. ʒ iij. fiant ſacculi duo, quibus in die quinquies foveantur oculi. A fotu ſtatim collyrium inſtillatum fuit è ſuc. malv. fænic. rut. optime depurat. Purgatio fuit continua cum decocto malvæ, fænic. rut. euphrag. fumar. rhab. ſen. ſub forma clareti. Poſt mollitionem detergentia, ut ſuc. malv. fæn. rut. depur. cum fellis angu. exiguo & ſacch. cand. poſt & parum vitrioli albi additum fuit, poſtea ſuc. rut. & chelidon. duplum, fænic. minus, vitriol. ʒ jß. & viridis æris gr. v. & curatus fuit. Matrona quædam pauperes ſeq. aq. curabat. ℞. exta lucij piſcis & una cum felle, jecore, viſceribus, in minutas partes conſcindito, adde m. j. fænic. & deſtilla. ſuccus è formicis expreſſus. Ærugo æris uſta minus erodit quam non uſta. Quæ totam pupillam tegit, chirurgo non eſt attingenda. *Par.*

Nubecula qua ægri per fumum videre videntur, ab humore corneæ impacto. Albugo ſeu leucoma, quæ fit vel à cicatrice & incurabilis eſt, vel à pituita inter corneam collecta. Curantur generalibus. Topicis mol-

lientibus & extergentibus cum ſuc. anagall. ſ. cæruleo, imprimis aq. ſ. roriſma. aq. mel-lis: ſi curari nequeat, albus color tollitur ſuc. mali punici dulcis. Si color flavus in ictero corneam teneat, vapor aceti in tegulam ignitam projecti oculis excipiatur. decoct. rhab. ſi bilis: agaric. ſi pituita, oculo inſtilla, naribus attrahe.

Sugillatio, quæ eſt ſanguinis in adnata & cornea effuſio, ab ictu, lapſu. Curatur, ſi major ſit, revellentibus topicis repellentibus, deinde ſolis diſcutientibus, decocto fænigr. exactè mundati vel ſub forma fotus. Sanguis columbarum, braſſicæ folia cocta & impoſita, caſeus recens. Inveterata fortiora requirit. Coma hyſſopi trita, panno lineo illigata, in ferventem aq. demiſſa, oculo tepide admota cruorem elicit ut linteolo adhæreat: rad. ſuc. rad. ſigill. Salom. aq. vitis.

Hypopyon, cum pus ſub cornea colligitur. Præceſſit ſugillatio, lippitudo, inflammatio. *For.* id curat ut pterygion. *Galenus*, *Paræus* aperta ad iridem cornea.

Vel afficiunt tunicam uveam ut

Procidentia uveæ ob ſolutam unitatem corneæ. Si parva uveæ portio excidat, myocephalos vocatur; ſi major ſtaphyloma; maxima clavus dicitur cum calloſa facta eſt. Staphyloma nemo curaverit, ſed Caniculus egregie doctus eos per calles deducat. Si ab ulcere corneæ, curatur. Si à ruptura,

vul-

Oculi tonica tarda.

CC. ℥ß. Sepiostea ℥ß
Concha margaritifera ℔ß.
Collyria ℞ Diacholog. Monspel.

Atrophia oculor. [Phthisis.]
Agenesis oculi.
Oculi Universalia generatim
Topica Pneumatica.
Ἄνοιξις εὐχυμα καὶ εὐχυλα.

Compunctio c. lanceola cystitis
Gul. Saxonj; Pl.
Regelij.

Quaestiones generales. Pathogenesis:
Diagnostica.
Multus Crocatus, unguentatus, oleatus.

Primò reponi debet: Ut supponatur
stapes & lintea ola duplicata de lig
& Vadis ligamentis imbuta:
sed comoda deligatio: turbinata
& cervicis.

Ocul. pustulæ.

Ocul. corneæ ruptura.
vit. vulg.

—— Vid. C. III. Conjl. Ecker. XII.

Veram sinè vas. tum absque Ophthalmo aut arachnoide, sub Vor. sect. Pleuriti. V. opthalmiæ. VII.

Ophthalmia Rheumatica vid. Rheumat. epist.

V. S. in Syphilitica oculos, et ejus sequelas.
Vid. Mastichia.
Ophthalmia Syphilitica.

V. S. Ophthalmiæ sede.
Decumbe in supino et cubitibus.
Vesicatoria.
Fomentatio.
Vid. Purg.

vulnere, curatur itidem.

Pupilla dilatatio Mydriasis dicta, cum justo major est pupilla, vel nativa est, vel fit à tensione, à siccitate, vel affluxu humorum, ictu, lapsu, nimia spiritus retentione in gravidis. His omnia minora apparent, humor autem non totam uveam afficit, alias fieret pupilla minor (moles enim uveæ arctaret) sed pupillam. Idem de siccitate dicendum. Si à siccitate molliendum. Si ab humore vacuandum, revellendum, resolvendum per topica, adstringendum. *For.* seq. vtitur. ℞. ros. sicc. menth. sic. spic. nard. ana ʒ ij. cort. thur. myrrh. ana ʒ ß. croci ℈ j. pomphol. acac. spodij, lotorum omnium ana ʒ j. aloes lot. ʒ ß. pulv. & cribr. f. Trochisc. cum gum. trag. quorum unus dissolv. in aq. ros.

Cataracta, suffusio, est pupillæ obstructio ab humore. *Pareo* à pellicula. Concrescit inter id spatium quod inter corneam & humorem crystallinum est. Notha à vaporibus fit. Non curatur nigra. Coitus huc facit. Circa diluculum acutius vident, quia pauci spiritus in copioso lumine dissipantur, à minori coguntur. Fit etiam à subtilitate spirituum, à raritate corporis, à pupillæ dilatatione. Præmissis generalibus, revellentibus, topicis resolventibus, calens anhelitus ejus qui fænic. mandit, oculis digitis leviter attritis, exceptus sæpius. Si inveterata sit, vide primò an matura sit, cujus signum est si præter lumen

nihil videat, nihil distinguat. Incurabiles sunt quæ attrita palpebra non dilatantur, quæ cum oculi phthisi est, quæ graves morbos sequitur, quæ viridis, nigræ, citrinæ, lividæ, gypseæ. Contra quæ corticem castan. cœlum, aq. marinam referunt, sanabiles. Secundò Luna decrescat, ut diebus 2. vel 3. à plenilunio. Sub ariete non decurrat, absit capitis dolor, nausea, tussis. Acus sit ferrea, æger oculorum aciem versus nares contorqueat. acus tum medio loco inter Canthum minorem & Iridem, vitatis venis, adigenda, & suffusio supernè deorsum decutienda apposito ov. alb. cum aq. ros. obligati maneant oculi ad diem 8.

Vel afficiunt Caruncularam lachrymalem, ut *Encanthis* quæ tumor est illius caruncularæ à sanguin. Curatur Topicis exedentibus, generalibus, ferro.

Rhyas ejus imminutio quæ sequitur alios morbos. Curatur Sarcoticis. strabismus à spasmo fit musculorum, vel nativus est vel à Crystallini situ vitioso.

Vel citra manifestam causam visum lædunt, ut

Amblyopia, gutta serena dicta, qua pura existente pupilla & oculo, visus depravatur. *Myopia* cum nihil vident nisi quod ante oculos habent. *Nyctalopia* qua noctu nil vident, interdiu benè. Curantur generalibus potius quam topicis. Si causa sit in cerebro, reli-

qui

Galliæ vijs empiricis pestæ: J. C. Landius.

Dict. LL. d. acut. Sibrotica: vipeini Formicæ vijs.
Fracastius ex Herc. Mitsch. Cons. Schal.
d. Osthalmici. Spec. diacatt. diar.
Cubeb. diacyclal. diamb. diag.
moschi.
Acetosella, Cucurbitulæ, Sebacea,
vesicatoria, fonticuli, Cyssotomia
aciora.
Externa abstergentia, Vnctiones,
anagall. Celsus. mist. empyr.
sodoric. Hec. Tella aurea.
Vesicalis purgantia, & roborantia.

Cap. Ulcus Lavendulatæ, aut
d. gariophyl.

Vfl. anagallid. ij. ipso fo. efficax
Cyp. Li. à Fonte cons. LX
Vros. Alcibia. Aur. ij. Myr.
Scippij.

† parvæ & ejusmodi tollit pt
d. menth. Acetj. Schæn. II. Serum.
III. c. LXI. Tutiæ a.
Hungaricæ

Carunculæ totæ ablatæ medica,
bibj: sui usus curat abstinen
tialis & Jarabolicis.
Aloë rosata, sui Diacodii,
unguent. bz Myr. Q.
unicago tragacanth.

Diacodium Oct. Henrici R. M.S.
Catholicum Crollij S. Rotulae Fuxij. &c.
Lapidem Bezoardicum.

Pil. Vulgus Gulielmi: [cum Helebor. &
Opobalsamo R. Cast. a Pulice M.S.]
Elect. opticum Hollerii Oculis ap. Ob.
Mardeli.

Plaretij.

qui ſenſus ſimul patiuntur. Si ſubito ceperit, obſtructio eſt. Si ſenſim, vel intemperies, vel adſtrictio. Lumen nimium ob reflexum calorem generat in oculo, quo officit. Color albus ob dilatationem pupillæ. Topica ſunt, ſecretum Maximil. Imp. aq. deſtill. ſc. è ſtercore rec. anſeris. jecur hircinum aſſum comeſtum, cocti vapor, liquor ex aſſato ſtillans, illinatur. *Rondelet.* hoc efficacius reperit, ſi fænic. rut. chelid. folia ei infigantur, pulvis in oculum conjicitur. Cibi ſale euphragiato condiantur: [aq. ſapphyrica à colore ſic dicta.] Vide Sennertum: ſpec. Occonis. &c. utile eſt & collyrium ſeu Sieff. ſeq. ℞. aq. fænic. euphrag. ana ʒ iv. tut. præp. ʒ j ß. aloes opt. ℈ j. infund. per noctem. aq. ablue oculos. aq. panis cum pulv. rut. fænic. euphrag. piſti. perſpicillorum uſus viſum debilitat niſi neceſſitate coactus id feceris. *Dud. ep.* 27. *Fab. Cent.* 1. *obſ.* 27. ex frequenti oculorum ablutione cum frigida, viſus obfuſcatio; à ſternutatione nimia voluntaria, cæcitas. Oculis ſæpe actu frigida applicari poſſunt, non auribus. *Zac. l.* 1. *hiſt.* 56. For. tria ocularia præſcribit. Primum eſt è cryſtallo, quo in legendo uteretur. Secundum è vitro viridi, quo per intervalla. Tertium inſtar pyramidis non perforatæ, è vitro denſo viridi, cujus baſis lata utrumque oculum excipiat. *For.* ſequente arcano uſus eſt In multis. Piſciculus eſt latior anguilla limoſus, *aelpout*

dicitur, cujus hepar tegulæ alligatum Soli exponatur & liquor exſtillans vaſe ſuppoſito excipiatur, quo non oculos ſed cilia & palpebram ſuperiorem illinas. Ocularia cava proſunt in circumferentia, denſiora enim illa omnia majora ræpræſentant, ut convexa minora, & plana æqualia. Qui oculos glaucos habent, exiguum luminis deſiderant. Qui humores copioſos habent in oculis, oculos nigros habent, quia humoris copia tranſpici ſatis non poteſt. Cæſij qui parum humoris habent, tantum luminis non ferunt. vide ulcus oculi.

Epiphora eſt humor tenuis, ſeroſus, lacrymarum ſpecie in oculis factus. Curatur generalibus, ſiccantibus, revell. Topicis adſtring. &c.

OCVLI ulcus. Vlcus oculi.

OCVLI vulnus. Vulnus oculi.

OEDEMA eſt vel phlegmonodes vel ſcirrhodes vel eryſipelatodes. Signa ſunt color ſubalbidus, tumor mollis rarus, impreſſi digiti manens veſtigium; ſecus ſi fiat, à flatu. Præter generalia & partis naturam topica non apponantur parti niſi frictione præcalfactæ. Curatur vel reſolventibus vel ſuppurantibus, vel ſectione, ut & atheroma, in cujus cyſti materia polentæ ſimilis continetur. Laxius eſt & tarde revertitur, non tamen tam durum eſt ac ſtruma, nec tam inæquale. Et è quo lapides, cornu & ungues extrahuntur

Vena Cathartica.
Diuretica.

Convenit Ombrosa & Solagoa.
V. S. Sanguis. Enemata.
Vesicatoria, Sectio, fomenta.
Apophlegmatismi.
Vomitoria lotanda.
Intercipientia: & Ingressu difficilis
cutis. V. S. Emetica. R. Sect. Ms.

Separationis Cathartica. & Sto Cibus Ad. Laudanum.

Ol. absinthii. fiat
Linimentum Cyprinum Sch.
Pasta Sectacea & Sto glabri.
Fomenta VT Hyperici.
Spongiæ vulneri applicandæ R. Fomenta.
Loc Virginis. + Absinthii.

mica, gangraenata, Gluciosis
universalis.

Orthopnoea. vid. asthma.

Ofcitatio.

Oris tortura. vid. Convulsio.

Oris foetor: mèe jejunij. Perpe-
tuus alijs, alijs post cibi cva-
cuationem.
(á; reliqui cibos; deinde nitentibus,
tijs, cibi ijdi foetentes.
Interna vapor putidus, à jeju-
nio, à scorbuto, à dentibus
corruptis, ab ulcere fauci, et
palatino, à vulnere thoracis et
empyemate, à bronchocele oblij
saturato, ab intestinis vermi-
nosis, et abdominis, et pulmonis
bene clauso.
Vide per regressionem.
Dyspnoea stomachica: asthmatica; hydro-
thorica; dentitia; anthelmintica. Flatulentia.

Odontalgia. Vid. Dentis dolor.

trahuntur durius est & ad tactum renititur. Meliceris celeriter cedit & revertitur. Materia melli similis est. Testudo est meliceris in capite cranio adhærens. Talpa sola duritie à testudine differt & ad atheroma refertur. Natta plerumque in dorso, scapulis, oritur, ad Steatoma pertinet. Lupia. Secavit *Pareus* lupiam ℔ VIII. pendentem è cervice.

ŒSOPHAGI obstructio. Obstructio gulæ. Oesophagi tumor. vid. Gula. Ala

ŒSOPHAGI paralysis. Paralysis œsophagi.

OMPHALOCELE. Hernia umbilicális. Orij ulcg. v. Ulcg.

OPHIASIS. Pili. Oregmone. v. vesicula

OPHTHALMIA. Oculi vitia. ador.

OPHTHALMIA sicca. Oculi vitia.

OSSIS Sacri excoriatio curatur ℞. sevi ovill. crem. lact. unius noctis ana ʒ j. cretæ alb. ʒ ß. m. vel adde ol. ros. vel cyd. q. s. præcavetur crebra erectione cum fune in lecto pendente, pulvillo fenestrato sustententur partes, crebro lintea ung. ros. obducta appone. Ossis palati caries vid. Chir.

OSSIVM sphacelus. Sphacelus ossium. otalgia. vid. Aurium dolor.

OZÆNA. Vlcus narium.

PALPEBRARVM pruritus. Pruritus palpebrarum.

PALPEBRARVM *Trachoma* est internæ palpebrarum partis asperitas, cum pru-

ritu & rubore, ſæpe & puſtulis ſemen milij referentibus, ab humore acri. Gradus ejus ſunt: ſycoſis, Tyloſis. Præter generalia, revellentia, intercipientia, Topica ſint mollientia, poſtea refrigerantia ut aq. roſ. Taraxac. ultimo detergentia. *Par.* ſeq. inſtar omnium eſſe ſcribit. Si parum vitrioli in multa aq. roſ. ſolvas. Aloë, myrrha, crocus. Inverſa palpebra fricari poteſt ſol. ficus.

Hordeolum eſt tuberculum in ſumma palpebra ortum prope cilia, quod ſuppureſcens ſimile eſt grano hordei. Continetur cyſti. Foveatur cera alba, aut adipe gallinæ vel ſaliva jejuni, vel corpore muſcæ, abjecto capite; fricetur. *For.* præmiſſis generalibus, cera alba fovet vel adipe gallin. aq. roſ. lotæ calida, poſt decocto hord. & chamæmel. Tandem ſanguine turt. columb. perdic. uſus eſt in ſeipſo aq. roſ. ʒ ij. vitriol. 3 j. guttam unam vel alteram per diem in oculum inſtillavit; vel aq. roſ. ʒ ij. aloes 3 ß. Si fruſtra, ſectione opus eſt. Si materia ſit lapideſcens quaſi grando, chalazion dicitur.

Ectropium, cum inferioris palpebræ pars interior extra apparet inverſa à paralyſi vel convulſione vel vulnere malè curato.

For. hoc curat adſtring. ut aq. roſ. in qua ferrum ignitum ſit extinctum. ſeq. ſæpe eſt expertus, & butyr. rec. novies loti in aq. ſ. poſt novies lot. in ſucco plantag. dein ter in aq. roſ. ʒ ij ß. tutiæ præp. lotæ ſemel in aq.

roſar,

Hydatis, ℔ vnc. Herm. Wassergall.
Maja d'inveterata regrit Chi
rugias.
Pabula, recens cum Oxalago,
gr: apoplegmatismatis: Denip
d'scultientib d'ficcantib,
Detis, mitigis, liquiris, olleg.
Vin Salviah, rut. Origanah,
rosmarinah, ysopi, thymiah, da.
Vng pro ℔V. epithimba d'ftè colubr.
ol. Scorpion. ruth, laurin. anetb.

Fomenta humida ex emollientib
Topica absterg entia d'siccantia:
ex ruta, Celidon. Valeriana,
Fumar. ff. fabar. Lupi, rad.
Irios, gentian. Cicer. rad.
myrrha, thure, Sarcocol, Litharg.
offic. Sepi:
Vncta de Lutea, d Litharyro.
Cerussa
Cauendu, ab acrib d dolorifica, acrib,
gr d'stantis.

#Litharg. sir, li emoll. d
d'sent. non adst, Chir.
postulat. Cp bol. Armo to.

Non multu ab hoc differt grando
sive Xaláζιον: nisi q ista
carcal, i ep emoll. d d'sent.
cruh. Di acrib, f. d
magn. Empl. Cumin.
c. gum. tit. Cathalic.

Calam. Cadij.
Sagapen. V. vt ℔ fol.

Humore ex cresc, nelle mundifi,
cab: ge suppurat d ulcerat rez
luc ℔: p isto humore cognoscendu.

Cicatrice ℔ abulcere ng bene curato,
aut ℔ sarcoti restante.
Cum Valide siccantib, sive acrimo,
nia aut mordacitate
Vncts amodum.
Si emollientia ng ℔ecerint, d
Chirurgica deueniendu, de qua
vid. in ℔rio.

℔ plantagenets Farkenfer.

Maddeworf. Universalia Gentis
tenda. Pilae grandes, 2 ℔ bus,
bus elicitur.
℥ semissis pro Seris trajectis.
Linimenta communia et magnetica ali-
quanta, 40 ℔. Ol. Helidonium
plantae, Aqua Vitae. ℥ Capillis.

Sigillatum Spec; [κολίκρα,
σκέλαβρα, σκῶρα, σκώληκες.]
ἐκχύσεως, ὑπόσφαγμα.
Curatio vid. in Sigillatis.
All. Euchirid. Ba. Seb. Mey.

Hippocr: palpebrarum Symptoma, vid
Fistulae dentium.
Curat discutientibus, si sit à flu-
xu. Si à corrosione, ina-
terone, ca Pustulata. Congenit
ὀφθαλμός.

Vid Cataracta, Glaucoma, Amblyopia.
℥ Lagophthalmi.

rosar, & aloës lotæ in angu. plantag. Sieff. albi cum opio ana ʒ j ß. Camphor. lot. ∋ j. f. ung. quo vesperi inung. & aq. cal. ablue.

Lagophthalmia, cum superior palpebra justo est brevior; vel nativa est, vel à cicatrice vel convulsione, vel cum infantes in cunis sursum vel retro semper spectant. Curatur mollientibus. Si à cicatrice sectio fit supra eam figura falcatæ lunæ, in plagam litus injiciendus.

Aquap. contra habenis glutino palpebris affixis sibi invicem alligat palpebras.

Hydatis ~~pinguis substantia ut adipis fru-~~ ~~stulum sub palpebræ superioris cute latitans~~; unde tota palpebra in infantibus œdematosa fit. Curatio ~~sectione illius partis perficitur, totus oculus ov. alb. cum aq. ros. obducatur. sal mansum cum cumino & salvia imponatur ad siccationem, nisi dolor obstet. Hydatica sunt vesic. aq. plenæ in pulm. jecore, &c.~~

PALPITATIO cordis fit primo à re cordi molesta, vaporibus, humoribus, aqua in pericardio collecta, calculo, &c. 2. à mediocri sp. vitalium defectu. 3. calore p.n. aucto qui sæpe costas effregit apud *Forn. For.* causa calida est vel frigida. *Galenus* omnes ante annum 60. mortuos suo tempore scribit.

Sign. Si à flatu, repentina est accessio, brevis. Humor si causa sit, diutius & tardius in-

gruit. Fit ſæpe ab hypochondriaca & menſium ſuppreſſione. Si ab aqua, ægri ſe aquæ innatare dicent.

CVRATIO In juvenibus vel declinante ætate V. S. utilis eſt & vacuatio cauſæ. diſcutitur cauſa ol. citri, vel rhapont. veri ℈ ij. ſeq. ſecretum eſt *Foreſti.* Meliſſ. virid. contrita tegulis ignitis impoſita, aq. roſ. & aceto irrorata cordi appoſita. Conſerv. meliſ. Theriaca. aq. de corde cervi, bovis *Rondeletij.*

PANARITIVM. Paronychia.

PANNVM. Oculi vitia.

PAPILLARVM fiſſuræ. Fiſſuræ papillarum.

PAPILLÆ ſi lateant, evocantur juxta *Amatum* phiola vitrea anguſti oris quæ aqua fervente plena, effusâ aquâ, ſic calens papillæ admovetur.

PARALYSIS fit cum nervi vel refrigerantur vel humectantur à pituita, bile; omnis enim bilis acris non eſt, ut patet in Icteri-cis, vel eorum vires ſopiuntur, vel comprimuntur pondere, humore melanch. vel eorum continuitas ſolvitur.

Progn. Si membrum paralyticum extenuetur, vel non vel vix curabilis eſt. Sed ſi à frig. & hum. fieret, non tam pertinax eſſet malum nec vehementiſſ. med. eluderet & leucophlegmatici eſſent paralytici. Neque à ſiccitate, ſic enim hectici eſſent paralytici. Si ceſſet ſenſus integro motu, tum nervus qui

in

Palath. vlcus. vid. vlcus.

Pandiculatio capitis.
Vid. Vertigo, Elenfius
ex similitudine alterius capitis.
Cant. Can. I. Cant. Exster. XII.
Ser. C. II. Cons. XXXII.

Vid. Dorsi inclinatio Venetor.

Pantopolium Orientalium, Ebusorum.
Rad. Portuense dicit.
Dat. Petolium Victoriatis.
Obstabile Rudolphi Jungt. ex
Cognomentis [illegible]

Melissophylli libr. c. Sc. Cyprian. et
Franc. Jd. ex Ambrosii.
Jungii ex. Jen. Quartr.

Panaritium. vid. Paronychia.

Pancreatis morbi. vid. tit. pp. Hobb. Tum. alg. &c.

Hydrades paralysis, sed nervi, sola
motus abolet, ex relicta motus sen-
sus, nervi sine sola sensu.
Diff. vel Universalis, vel partica,
hoc unius lateris, vel particularis,
unius membri. Perfecta,
ubique abolet: Imperfecta, ex di-
minuta, vel ita stupor, aut torpor. vid. C. III. Cons. Exster. LXIII.
vnius lateris ipsius Hemiplegia
dua: Paraplegia a. ad postapo-
plexiam.
Pars affecta nervi.
Ex prima intercepto spiritu animalis.
remota intentior, à manifesta
occultior, illa, mala magis
fixa, ex prima solutio.

Recte. Defertur u. per arteriam ad intestina, et ab his retrogreditur ad artus per venas. Sive brevius: per arteriam defertur ad intestina, ab his transfertur in lymphatica, et in nervos.

Curandi ex Carmelita.

Lomus Selleborata R. Forskeæ.
Pil. Mocllica.
Alexipharmica Astoreata Hoffm.
Echinopharmaca.
Cerasochylina Juciana?
Pelargoplumia.
Stendal.
Gl. Vesp. Oes. Oesophageata
Collecta.

Hom purgantia sc. Diaphoretica, Sudorifica, et Diuretica.
Particularia: cortina, pharmica
Apoplegmatisanta, gargarisma.
Nervos gfortantia, ij fly th
Thermæ
Lata thermalia
Balnea ex H. Caput Aste Paras:
Lunaria d'Asphodelo.
Odore Lodr Rosmarini.
Juscefly Vinacoos d'amurca.
Τετράδες, συνήθη ἡ τεσσαρακοστή,
Τετράδες, συνήθη ἡ τεσσαρακοστή,

in membranam partis infigitur est affectus, salvo tamen illo qui in carnem.

Diff. Paresis à colica differt à paralysi, quod in hac caput & sp. medulla, in illa soli artus afficiantur, quod curatio indicat. Medicam. enim parti affectæ & intestinis imponuntur. 2. In illa sæpe est dolor gravis & in convulsionem sæpe abit. 3. illa brevi tempore curatur in principio; eadem est ratio paralyseos scorbuticæ, nisi quod in decumbentibus aliquis motus maneat & subito recedat redeatque. Causa pareseos sæpe est bilioſa & cruda, non influit à capite, quia id raro afficitur in colica, nec cessaret colica. Sed ea ipsa materia per venas ex intestinis in artus defertur, prout è suppressa dysenteria pleuritis.

Sed ait *Erastus*, cur non potius natura clysteribus irritata per alvum materiam ejiceret. Resp. liberum non dari aditum. *Spigelius* per arterias fieri vult per easque vim purgativam clysterum ad cor deferri.

CVRATIO. Si à pituita, illa vacuanda per generalia, # tollenda per Topica. Eadem cura narcosi debetur. resolv. Topica. #

Si ab humore acri ut à colica, in scorbuto, in illa non tam siccandum nec cerebrum respiciendum. Generalia & Topica omnia locum habent. *Monav. ep.* 242. seq. præstans ait in paresi. ℞ pingued. Taxi, vulp. gallin. anat. anser. cicon. ana ʒ j. suc. salv. absint.

Paresis Scorbutica quoad ut Scelotyrbe.
Hypochondriaca, Spasticæ Colybeatis, epis 8.

inſpiſſ. ana ʒ ß. ol. laurini ʒ j. ungue poſt balneum. Specifica ſunt Calend. Lavend. grana & raſur. lign. junip. ulmaria, primula veris. Vinum infuſ. fl. calendulæ & lavend. per menſem unum ad cochlear unum vel alterum inſolari debet in feneſtra aperta. Si fiat per modum criſeos, fluxus inhibendus non eſt.

In paralyſi linguæ poſt generalia V. ſub lingua incidit *For.* Cucurb. non ſcarif. ſub mento applicandæ. Vomitus non convenit, Gargariſmi ſint prius attenuantes, poſt adde phlegmagoga. Cauteria in cervice. Solus ſuccus ſalviæ linguæ affrictus ſoluit obmutescentiam.

In paralyſi œſophagi liquida difficulter, craſſa facile deglutiuntur.

In paralyſi veſicæ adde Tereb. troch. alkek. ſ. opio; fotus adſtringens, imo potus è rad. cyper. galang. ana ʒ ij. Xyloaloe, cal. arom. nuc. cupreſſ. Balauſt. cort. gran. myrt. cupular. gland. rad. ſigill. Mariæ, conſol. maj. ana ʒ j. gallar. thur. ſem. agn. caſt. rut. ana ℈ j. &c. Si omnia fruſtra ſeq. expertum exhibe. ℞. gland. ʒ j ß. galang. ʒ ß. coq. in ℔ ij. vini rubri & aq. fabr. thur. ʒ ij. coq. & cola, bibe. Topica.

Si penis; curatur fotu è lixivio cineris priapi cervi, tauri, fove vertebras, præſcribe quæ ſterilitatem tollant. Si anus, clyſteres ſint ſiccantes & adſtring. cucurb. natibus applica.

fiant

Arcanissimum Echinophlecles. Regiorcli plats: arcanum
Conf. alkermes magistr. Lenitivum.
Ol. Calendul. e Nenufar. Arcanum. oxymel scillit. Aloephanch. et Cinn.
Tinct. galactina. Vin. Jer. Mar. Liq. Huferi.
Tinct. XXXIII. all. Coff. Jer.
ti. obs. XXXIII. all. Schenck. III. obs. 200. Diasp. antipsor. Limonis. Limonis.
Oxycr. ext. aq. Schenck. vin. aq. cinnam.
Galbanum Saracenic. vin. aq. Hell.
Myrrh. a. ana dr. c. c. dd. Hell.
Tinct. obs. XX. Conf. de Limonis
Tinct. ana nobilis aq. H.
Tinct. obs. XIIX. c. mot. arc.
Limonis Limonade.
Ol. Cicorei. Syr. domestic. Ravendsh.

Pil. Paralytic. Matthioli.
Pil. purgat. ex Styr. derivat. Conf. anthy limonata.
Discutio. Lavendule aromatica.
Tinctura aeria. Apoplegma. Catarrh. &c. Diabrig
Tinctura, Embroch. Cauterium, &c. Felicis &c. Diapente.
notissim. Phoenigm.
Tinctura antapoplectica. Partbritica.

℞. Emuls. ℞. Sebat. Mss.
Linimt. crot. cum Castor. pulveris
Cerus. expulso Styr. Offic. obs. XVI.

Lista Hermetis.
Olea ægijd. Lachj à Fou
Lapidis Myrothecitis.
Adeps tauri philosophicorum
Ol. Cerei.
Hermetis
Lunaris.
Jovialis.

Aphrodisij c. Mallichs.

Vnctio ad paroxysmum M. S.
Cathol. H. Myrrh.
Xlwaßodos ὑπὸ Χυλοῦ καρύ
Junctio Aq. Orbis, & Salsebat

Parotides.
Curatio ut inflammatio avers
Aliæ ex attingunt.
Vid. Aegid. Rod. à Cath. Fe
Ebj, c. not. meis.

Initio febris apparentes oppugnande
S. M. d'Cardiaci Schenckij.
Externa: ol. anagd. d. c. vitell. ovi.
Diachylon magnum: ut ypsilig.

fiant ſuffitus è cort. pini ʒ j. cort. thur. ʒ ß. pic. colophon. thur. maſtich. ana ʒ iij. caſtor ʒ j. raſur. CC. ʒ ß.

Si à lapſu, parti applicentur adſtring. refrig. metu inflamm. & cal. reſolventia.

Si ſit cum atrophia, Topica medio modo ſe habeant & interna.

PARONYCHIA tumor eſt in extremis digitis cum inflammatione, dolore, febre, jactatione, ab humore venenato. Incurabilis cenſetur. *Paræus* ſæpe inciſionem fecit in digiti parte interna ad os uſque ſecundum primæ articulationis longitudinem. Efficax eſt, modo ante maturationem fiat. Sanguis multus effluat. Mox immergendus digitus in forti & calente aceto, in quo ſoluta theriaca virus evocet. dolor ſedetur. *Fab. obſ.* 97. *c.* 1. in principio ſæpiſſime ſuperficiem ſolam cutis paulatim diſſecuit, ubi apparuere maculæ, quibus inciſis effluxit ichor, impoſita aq. vitæ cum theriaca omnes curati fuere. *Senn.* ex aduſto ſanguin. fieri ait & præmiſſis generalibus intercipiens brachio applicat, parti apponit anodynum, poſtea ſuppurans, tandem detergens. &c.

PARTVS. In partu difficili quibuſdam oſſa pubis diſtenduntur. Paræus oſſa innominata à ſacro divelli vult. Diſtendi & illa poſſunt cum perinæo & oſſe coccygis. Vnde parituræ perinæo inniti non debent. Et Topica tam perinæo quam oſſi Coccygis & pubis applicari.

Sign. Dolor graviſſimus, qui ſi ſubito ceſſet, non edito fœtu, ſuccumbit expultrix.

CAVSA. Partus difficilis, eſt vel matris vitium, cum debilis eſt expultrix; vel fœtus, cum grandior eſt & non benè ſitus; vel viæ, cum ſc. membranæ nimis ſunt firmæ, cervix anguſta ab aere vel frigidiore vel calidiore, in primiparis à fœcum copia, ſiccitate. Si fœtus ſit mortuus, medici impoſita manus, nec mater, motum ſentit, aq. effluunt. Si ſecundina ante fœtum excludatur. Si dolor ſit major, anhelitus fœteat. perinæum ſit frigidum. Si uteri os ſit molle & calidum, fœtus eſt.

CVRATIO. Omni ingenio molliendi ſunt loci. Fœta in lecto collocetur, ut in lithotomia; vel in ſella, vel ſpondæ innitatur. Spiritum contineat, non clamet. Sternutatio moveatur, clyſteres, glandes acres, indantur. Naribus adhibe fœtida. Sumat cereviſiam cum butyro & ol. amygd. d. ℥ j. alvus ſit vacua, parce cibetur, ol. ſuccini illinatur. Ejus gutta cum aq. verbenæ datur. Item ſumat omnium primo aq. Cinamomi. vel ℞. diptamn. alb. ſucc. ana ʒ j ß. dimidium detur cum vino calido. ol. cinam. ol. lign. corylini, pulv. ſecundinæ toſtæ. grana junip. 5. vel 6. cum ficubus quinquies ſumta partum mire accelerant: diptamn. caſſ. lign. myrrh. Multæ pepercre ſumtâ ʒ ß. vel ʒ j. pil. de aſa fœt.

Insidiæ et pons abscessu? alijno.
Jo. Jac. Vencslay Sobenensis
Ephemer. germon. ano 11.
obs. CLXXX.

fœt. pulv. Dominarum. Fœmori alligetur ætites lapis qui etiam uterum ad se trahit, unde non diu usurpetur. Item corall. rad. polygoni, coriandrum viride plantis pedum vel coxis alligatum. Hæc non adhibeantur nisi cum Luna noni mensis præterierit. Qui latos habent humeros, grandes fœtus generant. Cum fœtu secundina vel paulo post educatur blande, ne sequatur uterus. Si plures sint fœtus, totidem erunt secundinæ. Si restitet, medicamento, imò manu extrahatur. Ligato umbilico uterus fascia cingatur. Secundina explicata utero imponatur. Mirabile est secretum ad secundinam deturbandam, ad menses suppressos, uteri suffocationem, fœtum mortuum, molam. Fol. levistici viridia contunde, & suc. expressum cum vino vel aq. artemis. ad cyathum unum propina: hyeme sem. levist. coctum cum aq. artemis. exhibè. Item ℈ j. troch. de myrrh. cum ʒ ij. vini. Si frustra, vel manu extrahitur (vide *Par.*) vel per sectionem, ol. lign. Heracl. Amara necant fœtum.

Si lochia parcius vacuentur, per frictiones, &c. in inferioribus ad uterum deducentur, V. in talo secanda. Topica, clysteres sint mollientes. Si dies aliquot à partu præterierint, purg. è rhab. agar. prodest. dentur sanguinem attenuantia & ʒ. rad. ap. &c. Si nimis fluat, curatur ut diarrhæa.

Dolores à partu vel in ventre sunt, vel in

utero, qui ſimiles ſunt teneſmo, cùm expellendi impetus prorogatur. Fiunt vel ab aere frigido vel grumis ſangu. vel ſanguine acriore. *Senn.* Curat ſublatâ cauſa, purgantia non præſcribit ſed calida interna & Topica. *For.* arcani inſtar habet cereviſ. decoctam fl. chamæm. vel abſque purg. pulv. dominarum vel infuſ. Schænant. cinam. &c. Si interfeminеum rumpatur, curatum quovis partu novacula aperiendum.

Febres ephemeræ plurium dierum Lactis febres dictæ, ſpontè ferè tolluntur. Si ſint revera putridæ continuæ, à lochiorum ſuppreſſione vel humorum vitioſo apparatu fiunt.

PARVLIS. Tumor.

PAVOR infantium in ſomno. Infantium pauor in ſomno.

PECTORIS hydrops. Hydrops pectoris.

PECTORIS vulnus. Vulnus thoracis.

PEDICVLI. Vermes.

PENIS paralyſis. Paralyſis penis.

PERIPNEVMONIA. Inflammatio pulmonis.

PERNIONES Sunt inflammatio pedum à frigore hyberno. Præſervatio fit ſi ſocci ſp. vini madidi induantur & benè muniantur. Curantur ut poma & ova congelata ſi in aq. frigidam immittantur vel nive fricentur. Sic extracto frigore quod è dolore

Cavenda intuita refrigeantia, etiam
calor adsit, neq. a. e brevi febrile,
sed a labore pauli sub resipisq.
de ofaccione tinq. Cedoin. Cal. aqua.
fœnic. amisi.
Spec. Diacalaq.
Diacymin.

Pediculares morbq. S. Gdrageby
Universalis vel particularis E.
Ex alto vel superficier sudis, sed ofum,
dux, ex humoribq. calidis, vel a,
calidq. humoribq. Veris ex seminijs &
pijs, & calidi humores fovent, &
sordes flemmq. stinguit.
Curão Jentes Galeni fit evacuantibq,
& alterantibq, & evacuantibq.
Veris purgoe, si opus sit ch. S. M.
antihelminthicis, seq. entibq: Vid.
Actuarium. I. J. à Bruno cura
cura adaucta: & Euchir. R. M.
Schaf. Ms. p. 70.

Racheos distorsio.

Diff: ij anterioris: resolvit.
λύεδαι, extorqs.

Cur: flexio à Cas.

Curat. Dicta explicans.
Pyrosis
Empty resolvens ex
ramis c. & d: impl.
c. nuc. Cupress. Fol.

Rustus sive erectus verticaliter.
Gr. ὀρθός: erectus, rectus, directus, verticalis p.
os erigendi.
Diff. Sono, Dore, Sapore.
Acutus, midorch: ὀξύς, cuas, Kriarsodes.
Externus, ein fleischlich, potz inwendig, innig, verborgen, heimlich, die costen: tusch facilè conspicibiles.
Interus: inwendig sig, Vide exter: Gal. intestinalis.
Internus vitiosus, verticalis genitalis, d placentae uteri. fleischlich vitiosa.

† Tulpii.
† Fo.
Littorgyo.
Nemo!
Emundato † his ſtercore
vlcerosa efficiunt.

Vultus Diſcandaracter efficiunt.

Dyſſuria, Codeſtis, Paraleſis l. tumor.
♃. c. V. Conſ. Jo. Hagii tumor.
adnatus.
Miſmata vermium Lob. Attam.
Kirkeri, & Cornu Langii.

Nos Semper. Vid. Fol Bernardini
Paterni Diſſertatio reſtaurationis
IV. Conſil. Medic. c. XXXVI.

pungente ſedato ſcitur, pars fovenda lacte decoct onis roriſmarini, &c. pedes & manus immergantur aq. in qua rapæ, imprimis congelaræ, coctæ fuerunt; vel ol. de cera vel laur. pars ungatur, item mell. Terebint. ſi exulcerati ſint ol. roſ. in rad. rapæ vel raphani excavata, coctum illinatur, vel cinis cancrorum cum mell. & ol. roſ. Cum emortua eſt pars, curatur ut gangræna.

PESTIS Cauſa eſt τὸ θεῖον Hipp. quod Eraſtus ep. 275. occultam qualitatem aeris eſſe aſſerit. idem ep. 269. putredinem cauſam eſſe ſtatuit non ſentem, ſed factam, quæ non alteratione corrigi, ſed vacuatione tolli debeat. *Sign.* Plurimos corripit, contagioſa eſt, ſubito vires profternit, pulſus mortalis, # febris, exanthemata. *Pr.* Mente conſtare, appetitus ſalvus bonum, ſi vomitus abſit, reliqua fallunt.

Diff. Si ab aeris vitio fiat, valde contagioſa eſt, cito interimit, paucis bubones, puſtulæ erumpunt, urina ſanis eſt ſimilis, præceſſerunt ſigna aeris affecti, ut jumenta interire, bruta, piſces, ſpelæa, aquas ſemiviva reliquerunt, &c. Si à corruptione humorum, is cognoſcitur per ſua ſigna, maculæ, bubones, puſtulæ adſunt. Vrina mala. Febris vehementer affligit, etiam tertiana, quartana intermittens teſte *Pareo lib.* XXI. Scabioſi minus tentantur peſte.|| Bubonem febrem præcedere bonum, ſequi malum. Luna decreſcens

exitialis. Exitus enim menſium debiliores. *Ariſt. l. 7. de H. Anim. c. 2.*

Præſ. Cubicula depuranda omni ingenio. Cujus ſignum eſt ſi ova concuſſa in loco infecto intra 24. horas non corrumpantur & fœteant, vel panis calidus è furno. Sic ſi ova concuſſa inter infectum & ſanum ponantur, ova, non vero ſanus inficientur. Sic morientibus panem calidum ori applicant, ne cubiculum inficiatur. 2. Corpus depuretur purgantibus modicis iiſque alexipharmacis ut agaric. &c. diæta conveniente. 3. præſervandum alexipharmacis ſumtis, ut pil. Ruffi 3 ß. in ſenibus tamen, gravidis, hæmorrhoid. cautè. Elixir vitæ *Paracelſi. For.* ſeq. laudat etiam in infantibus omni die ad nuc. magn. ℞. nucum, ficuum, rutæ, ana, unumquodque contunde ſeorſim in vaſis ligneis, miſce cum ſir. acetoſi. citri. feliciſſimum eſt. Idem ille ſeq. ſumſit ad magn. nucis parvæ, ℞. Confect. de nucibus ʒ j ß. Theriac. antiquæ, Mithrid. ana 3 ij. bol. arm. ver. Terr. ſigill. ana 3 j ß. cum ſir. de limon. vel hieme de cortice citri. miſc. dabat hyeme cum vino, vere cum aq. card. ben. ſcabioſ. æſtate in aq. acetoſ. aliquando addebat 3 ß conf. liberantis. Faciem abluit omni mane aq. & aceto roſ. nodul. odorat. Litus narium ut ol. ſcorpion. ſi carp. temporibus, cordi, naribus illinatur. Trochiſci ſub lingua tenendi. Sacculus pro veſtibus. Epithemata. *Fab. obſ. 34. c. 2.* Monavius

mentio in Pharmacopoea pestis. §.
et V. sectione, recensente
Dan. Sennerto. IV. † Schol. c. V. † paralipom. ad l. c. p. 176. †
Conf. cum Cent. IV. Conf. 1. et Ster.
cum XI. XX. et XXV. et XXXII.
ubi de his rebus disputata.
ad Hom. arthritis regis Lazer.
Lib. c. XXXIV. XLI. et XLII.
Spectatores rogare et exorabo me.

Pestis sic curata: Lib. Heinrici
poëmate ad C. Salmasium a
Vincentio Fabricio, et Ephem.
Germ. ano II. obs. CLXXX

† Ph. Rudolphi Goclenii
de Nov. Ind. orig. Novohispanicae, epist.
Regina Euphorbii Vasta.
Zosimobalsamum Myrrhaloëticis Crocoteretistis.
† pretiosa Bestiatio ap. J. Schroder.
II. pharm. c. 77.
Diascordium Mayerni.
Ta Signata Ambrosia Maximiliani Cos. Gelis Cy.
Electa ex Ephem. Carol. V. Imp. B. Scodii Chemici.
Jusus. et † Cardopatii, Ludovici III. Col.
Electa Oribasii.
alexipharmaca absinthiaca Petri de Spina.
è Mss. J. H. Stromayeri.
Hier. Castorii. Arcanum Myriophylli.
Mixtura simplex.
Salutaris Castorii Hier. Schneuneyi.
Elaphodactyla Septembria.
Hypoglottides. trochisci albi dulcis D. Kiefferi Sen.
Electa Calendulata Dionysii Septemcastrii.
Syntaxis Mithridatica simplex. S. Comitis Nicaei, Argentinensis.
Catharini et † Grodzi, Com. Gemma. Alexipharmaca Petri de Spina
Pil. scordiata Marenicii. ap. Schroed
Extr. nuc. Jovinii. Hoffmanni
dictamni albi. c. Oppio. Extr. Sedinii.
Tanacetum. Van Aemeri.

Emuls. Nasi d. S. Chy c. Lacte
Margaritino. ℈ℓ.

Conf. Leben-tem. c. Ocy.
Hyginia d. Bob. R.

Echiobalsamy minoris.
℈ℓ. v. Conf. H. Pegamidis d.
tinz. Do. Dec.
Edidamantum Fall. Coral. Par:
Amarantinum Cardan.
Anacardinum Lagopodij d. Lemaeth.
Amantis Lisfr.

"Hpiè Hiq. Logi cado tis. nos indicat
Sed si adsit pectoris vitio ejusd.

At Jo. Hammillery paullò aliter ;
Hoff. Imp. Med. d. Chir. ℈.
Circa politicam V. S. ; colo fuerit
Luctus finistro, dextr. ægrilis :
Fide, si Circa imperia.
Vid. Cent. II. Conf. Epist. nos c.
LXVII.

Theriaca Pelagij curata.
Theriaca Cryj Selej.
Theriaca mumiata.
Elect. ex Ovo c. Conf. Hyac. ℈.
Confalkerm. d. Crystin.
Pato. De St. Jacques ℈.
Antidotus Coccoy parisiensis.
Ja. Rubrej Cydoniata.
℈j bezoarica Augusti El. B.
Sozonicj.

Ol. Scorpion. Leonis Ponticj.

Theriacalis Oswaldj Berj ex Theriac
Cæcilianj.
V. Rhabdia Tachenigenj.
Balf. vitiosa Universale Henr: Noltij.
℈. Serpentis.
Elect. ex bolo Helvidij, succ. rubri Lu
Angelij d. A. Gaffarelj.
Elect. è micis c. Sp. Ormanther, o
Hyp. H. Rondelet.
Antidotus è Hyp. Damocratis d. Gal
correcta à Jo. Pistorio Villan

Vid. antidota plurima in Enchir. Med
R. Sch. ℈ Mpo.

Fr. Ramundi Metallurgi Siriacj.

navius ep. 248. approbat pulv. arſen. buffon. Crato contra ep. 167. In peſte Lauſannenſi nemo obiit qui fonticulum habuit. *Fab.* duos habuit, *c.* 4. *obſ.* 23. ungu. alis & inguin. inungendum. Sacculi in ſcriniis veſtium aſſervandi.

CVRATIO. V. S. non convenit ſi peſtis è contagio vel aeris vitio orta ſit, ſi 12. horæ præterierint, ſi petechiæ, fluxus, bubones adſint: alias ante 8 horam præmiſſo clyſtere leniente adminiſtretur. Præſente bubone vel carbunculo, ſangu. è directo, id eſt eodem latere, mittatur, applicata buboni cucurbitula, ne venenum intro trahatur. *Por.* cephalicam in brachio ſecat ſi carbunculus ſub alis ſit, baſilicam ejuſdem lateris ſi in inguine, femore, coxis, crure, in malleolo. Scarif. cucurb. ſemper tamen ante horam 8 adhibuit. Poſt horas duas alexiteriium dedit. Si evomeretur denuo exhibuit. Purgavit non ante 3. ſæpius die 4. lenientibus ut rhab. agar. epith. &c. Caſſia non convenit ob humiditatem, nec aq. roſ. ob adſtrictionem. Frigidæ potus in peſte & febb. malignis lethalis. Strenuè edant, etiam citra appetitum. Primo die ſomnum non concedit. Secundo & tertio ultro provocat ung. populeo. *Sen.* Semel ſudorem movet, poſtea V. S. ſi opus, omnia ante horam 8. Sal artemiſ. commendat *Par.* ~~Si petechiæ erumpant, Parœus hydrargyro ægros inungit ac ſi lue venerea laborarent.~~

PETECHIÆ. Febris petechialis.
PHLEGMONE. Inflammatio.
PHLYCTÆNÆ. Pustula.
PHRENITIS. Inflammatio cerebri.
PHTHISIS vel sequitur pleuritidem, vel fit à destillatione acri, vel ruptura venæ. *vide aph.* 16. *s.* 7. à tertia causa sæpissime fieri vult *Rondeletius*, ob medici insciam, cum neglectis revellentibus hæmoptysin adstringentibus curat. Conjunctam habet febrem lentam putridam, vel hecticam ab ulcere pulmonis quæ ad annos 20 sæpe durat.

Sign. incipientis sunt tussis diuturna, jam cruentum quid, jam purulentum ejicitur. Corpus tenuatur, febris adest lenta, difficilis respiratio, pus per tussim exiens, capilli defluunt, &c. quomodo pus à pituita distinguatur *Vide aph.* 81. *s.* 4. 11. *s.* 5.

CVRATIO. Causa est vacuanda per rhabarb. &c. & lenientia non fortia, clysteres: revellenda, intercipienda. Morbus seu ulcus detergentia requirit & mundificantia seu expectorantia (nam nullo modo sputum est constringendum) post glutinandum. *Fracast.* lohoh de Terebint. cum myrrh. & bolo ad miraculum commendat. Laur. succ. hed. terr. ℔ ß sacch. ʒ iv. f. sir. capiat freq. è cochlear. aq. hed. terr cum saccharo ros. usu. cons. ros. antiq. spec. Haly contra phthisin. Eraft. ep. 272. omnes ulcere pulmonum, licet obscuro, laborantes usu aq. vitriolatarum interiisse.

Phthisis pulmonalis.

Distinguenda à phthisi ex ulcere pulmonis, tabes renalis Sydenhami, vesicæ ulcus auctoris de vit. affect. inter Hippocr. scripta, & tabes dorsalis, Sydenhamo vulgata, Heberdenio morbi, vesicæ ulcus Balfourio vocatum, & tabes cancrosa Hipp. VI. aph. 31.

à phthisi, ab ulcere pulmonis.

Deglutitio acris tussimque malignæ.

à sputis sanguinis, ab ulcere pulmonis.

Deglutitio acris tussimque malignæ.

à sputis sanguinis frequenter eliminandis: deglutitio acris tussimque malignæ.

Diacodium Par.

Terebinth. c. Ovo Sorbili.

c. mell. ros. & vitell. ovi. glycyrrhiz. H. Gallæi.

Lil. Bachii terebinthinatæ J. B. Castelli.

Syr. d. cons. sedens tem. c. Diapenidio Hyanthino.

de Fernel vid. Andr. Wigan & H. Gallæi.

observ. XI.

Cons. ros. Fuchs.

Linea Linacis absorbendo saccharina Stahl.

Elect. Regium H. Gallæi obs. XXXI.

Valesii Corentani s. Ebe Arabis: herbæ Sabinæ Diosc.

Dos L. S. S. balneis pluribus

Lac Galactis bolo R. medicatus: H. Erasti.

Elect. Diacydonii linimentis ejusd.

Testudinatum Species.

Phthisis hujus: ex vesicæ ulcere: ex ejus sanie, Diagnosis.

Phthisis pulmonalis: ex ulcere pulmonis. P. Barbetti.

Pr. Med. lib. III. c. II.

à phthiseos per gleucos. vesicæ ulcere. Specifica. Sanies pancreatis supervenientis gibile. Ejus absorptio negata transfusio per lacteas, & ductus. Reflexio vesicæ Morbi. Morbi. Malpighii.

Dolores acuti tempanda ex. Barb

Balsamum Canadense ejusque usus in phthisi.

Diagnosis. H. Erasti.

Ejus usus in phthisi.

Lympha crassa incidenda: fugienda ejusque vacuanda.

Balnea acidi tempanda ex. Barb

Lac Galactis bolo R. medicatus: H. Erasti.

Ejus usus in phthisi.

Ff. rois ℈ c. Vngrioplh.
Lythariafis d Lincolh tchlimah.
Ff. Hfinis.

Vide:
Ostea Sarta.
Linaces Brixiensis Limoniti.
Pulpa ex Cardis Leon. mersis.
Lorentata bilulina d Tuberacea.
Lastalgia cacalh cerebellah; thymah.
Colich Bonomiensis Jurah.
Gelu testudinah

#Ejd. arcana cyrus d Ath Li. S:
vid. ap. Fkenfurens obs. LXI.
Conf. unas ex raves per Asfalta.
Vid. de Suffitibus antipsth-sicis Epi,
Sagmat. uros obs. XXIIX.

Balneis ex app. aneth.

Nox ffe, sed fijum differunt: Alo
pecia ff aregr glabra; oftinfis
fortuitos ingular serpentis. M. 5

Purgantia Lumoj pelcauh d pria eligend

Vid. pilos guraudia ap. Helos. Sekt
Ex Spec. Med. B. Lib. II. Sect. 1
c. 1. vbi et cum Quissa fur
Spec. Vitalis acrioribus J ca
Lis vibj: Ad Asj 3bj, ad ouf
Quissa semp lotidine, à levi
nibj inspicendo, de cubris fri
onibj adhibitis # attractione

riisse scribit. Conserv. ros. magna dosi sæpe detur. potiones vuln. ut decoctum guajaci, Chinæ, valdè commendantur, nisi adsit hectica. Suffitus utiles sunt naribus attracti, (Vide Tussim) ut Tabaci fumus. Topica. sæpius sumat ʒ ß. Conserv. ros. vel particul. rad. consol. maj. condit. *For.* alternatim expectorantia & glutinantia exhibet, & in solidatione tandem manet.

PHYGETHLON. Bubo.

PHYMA. Bubo.

PILI defluunt vel è toto capite æqualiter, vel ex una vel altera parte, & vocatur area, ophiasis, alopecia. Illa fit ab alimenti defectu, acrimonia, pororum siccitate, ut in iis qui è Germania Italiam invisunt, vel laxitate. Hæc ab acri humore fit, ac ab hac cuticula emoritur; si purgatur, sanguis exit serosus, non rubescit licet fricetur. Pili fiunt ~~à facultate pilifica~~ & sunt veræ partes sec. *Senn.*

CVRATIO præmissis generalibus & lixivio è Capill. ven. litum è cinere apum & ol. myrtin. applicavit *Forestus* ad aream; alium sola frictione cum pulv. apum, alium empl. è muscis tritis & tereb. cum vitell. ovor. alium liq. limacum sale aspersо, loco prius panno aspero fricato, curavit. ol. nucum, decoct. abrot. artem. ol. junip. axung. cuniculi, stercus capræ, cinis cort. avellan. Cinis murium cum melle. Pinguedo è ranis virid. coctis

præmisso lixivio è cinere ranarum; ubique etiam in leprosis pilos producit. Cin. nigellæ cum aq. Aurifabrum calvum à *Mercurio* curavit. *For.* lact. capril. & nervosis. urina calida. pinguedo lucij piscis, spuma carnis macræ. *Monav. ep.* 281. ladanum imprimis.

PILI nigri fiunt à decoctis rerum adstringentium. pituitam purgantibus internis. Topicis. Cort. viridis nucum. Nux cupress. gallæ coctæ, ol. nucis, cadmia. lixivium in in quo colocynthis sit cocta. myrobal. tam intra quam extra applic. caryophyll. stipites fabarum.

Flavi fiunt si laventur lixivio è cineribus caulium vetustorum, palea hordei adjecta. Quædam lixivio illi addunt gramen triticeum, glycyrrhiz. ramenta buxi; vel pone in lixivio crocum; decoctum fl. genistæ, verbasc. lutei, cort. citri, aq. & ol. mellis.

Crispi fiunt si laventur in decocto rad. ebuli, vel cornu c. cum ol. olivarum inungantur.

Fines capillorum finduntur ab adusto humore. Curatur diæta infrigidante, vacuatione bilis atræ, fotu molliente.

Vermiculi qui pilos decurtant, à paucis descripti, vix oculis videri possunt. extremitates erodunt. necantur aceto infus. sem. urtic. item scabios. abrot. centaur. &c.

PLEVRITIS. Inflammatio pleuræ.

PLICA

Dos Calendis c. Nod. de Capsula.

Vin. Hispan. c. Vinelis favatis Crocatis.

Ol. Lavendulæ c. Staphidibus.
Oborum ranarum.
Jasmini c. Sp. Cryceranthi mc.

Vitanda alimenta frigida.
Bibatur Halilejatum c. Aq. d. S. anteor.

F. Litharygyri Oij c. Aquarum d. IV.

Vnde Cingulare Diaphoreticum, ex
succo ten. de Lycopodio &c. pro.
Emmenagogum. Abst. Cruoris &c.

Quassione unsenbor levatorum
in Cittotomia impetrorij: aut
comodam infirmitate ab mollis
tie et humiditate, a retri,
gerade # defidentia; sico fri,
gido, et comorado diuturnus;
aqua frigida.
Paralysi et ob nervorum ab
offe sacro deuntium refrigerans
obstructiones et stupores.
Scapulare membranae, quae
aelis vicinis partibus alligat.
Si any plagg instituerit, admovendo
facenly cal. discutientes; ut
Spongg dcto simili imbute
feces siccioes emolliendo alimentis
discutis.
Acriores humores eluendi Cystmatibz
et purgantibz Diaeta.
Quassio imprudenter Cittotomia, fre
gelanda et tentanda et astrin,
gentia et glutinantia interna
et externa.

Potiones et vulnerarie, ffoliculares,
ter, adstringentes, sedatz et tut.

Injectiones: ex Cauelli.
Piforum.
Cruto cribrato.

PLICA à plicando dicta *Die Mahrflechten*, homines, equos infestat, orta in Polonia. hæreditaria est, ab aq. & aëre orta. Si plica abscindatur, virus intro relabitur & graviss. affectus facit. V. S. purgatio locum non habent.

PNEVMATOCELE. Hernia ventosa.

PODAGRA. Arthritis.

PORRIGO. Furfures.

PROCIDENTIA ani fit à nimio conatu partus, ab acrimonia ut in dysenteria, sphincterum imbecillitate, ab intemp. humida, frigida, sectione in lithotomia, à casu.

Curatur pro ratione causæ. In senibus vix curatur. Reponitur vel manu ægri vel chirurgi; si tumor adsit, discutiatur resolventibus, contineatur sublatione causæ, & adstringentibus, sub forma etiam suffitus, insessus. *Ætius* sola muria sæpe anum fovit. *Paræus* spongiam decocto adstringente imbutam ano applicat. Stans alvum exoneret; sic enim non excidet. Hipp. ex pedibus pendentem ægrum concutere jubet. sic enim remigraturum intestinum. Spuma limac. rubr. inungatur.

VTERI fit ab eadem causa. Curatur, si præmisso clystere è malv. & ol. & vesica depleta, restituatur vel manu ægræ vel obstetricis vel chirurgi. situs sit ut in lithotomia.

Si intumuerit, fovendus est, ut facilius fiat. Chirurgus cauterium actuale magnum manu teneat, ac fingat q. eo uterum inurere velit: sic enim à terrore sponte reducitur. Retinetur sublatione causæ. Item cucurb. cum multa flamma umbilico adhibitis, suaveolentibus naribus, ovo putrido locis applicatis. fol. lappæ capiti impone. Vomitus utilis est. Topica sint pessi adstring. sarcotica intus & extra danda. suffitus è pelle anguillæ sale conditæ. fotus. Interna siccent, ut rad. chin. guaj. notandum tempore menstruorum adstringentia locum non habere; pessos vide ap. *Senn.* Si computruerit, amputandum id est, reliquum cauterio inurendum.

Gurgul. quidam ovum coctum durum recens dissecant. & Zinz. aspersum cal. vertici apponunt. alij fol. querc. cum melle. alij nuc. jugland. cum sp. vini contus. alij fermentum. alij matric. alij sal tostum. vide inflamm.

Cartil. Xiphoidis, quæ deprimitur, non rumpitur, ab ictu, tussi & humoribus, sicque ventriculum premit. Signa. Cibus cum aliquo dolore, nausea, deglutitur. à cibo pondus sentiunt: appetitus imminuitur. Spirandi difficultas à labore, cachexia; atrophia, icterus. Curatur fasciis. æger attollat rem gravem. manibus, cucurb. retinetur & adstring. *Dasz Wehe thun* hinc fieri potest. vide Luxat. *Senn.*

PRV-

[illegible] lenit dimor inflam?
[illegible] frequentia, amem? [illegible]
[illegible]

Cruo: repositione, d detentione
repositi ; to suo. Vid. Cirurg.
Very imagendy aute repositione
ol. lil. alb. Cutpo rec. dije gallin.
vefica d mitetis? recti sint bo aia
si plastr intumescat, pig fovendy d cta emollente.
si th inflammaty? cruo co dirigenda.
Compositio Magnetica Jo. Baptistae Rhamelli.
Subligacula enterocelica. Pessi ex d. albo c. fuscato
Pessaria Nic. Myrepsi, vid. in 1. Var. Led. mazc.
Cerati linei, Vestingii cupreti. Pessi ex fibere incerato.
Glob. hysterici. vid. Epigast. ung. DXXVI. Pelliz
Pila Uterina Fabricij Hildani. Cent. IV. obs. d Plate

Cretus ficandus, purgandus, lot
brandus. Humor influens re
pellendus, d th discutiendus.
Gazzarisinata". Suffitus per
infundibulum admissi.
Partheny beatij impositi: d Jugland c. Ostrea.

"ex albe spongidijs i vinu cocti. J. Bartholi Med. (a

Glycyrrhiza.

Oth.

Lessaria crispata d Zata.
Dea, lignea levia polita,
spongiata, goffyfina,
lanea, cerea, storta
d unguenta.

Leucobolgeor formidate cauus,
latus Virgo fumAg.

Colocynthagoga. Helicophlegma,
goga.

Hiera aetij corrigentia.

Diaphoenicon. Emulsiones.

Semen lactis bugloss. et papaveris.

Balaus Dulcis: Acidule.

Mouisera.

S-M. Siriaca atagg ferunt.

Pruritus totij à Scabie.

Dett foeni Grecj i vino, Aarij.

A. Gallery.

Semen peponatis.

Ol. Lactucae major.

Lavanda pulegiatis: Inferij pluvialis.

Diff. à palpitatione Cordis suae Kau,
Lotarcew, de qua nos e,
Zing Ent. 1. Consil. Expos,
ter. c. XLIII. à nemine alio
Exposito aut expositio.
a, spy flatulentij.

Satyriasis, S. Salacitas nimia. al. Furor p.
Libidinosus. Lascivus.

Diff. ostium, vel Salteg Hepatis.

Venae alterantia.

PRVRITVS palpebrarum curatur generalibus refrig. humectantibus. Topicis primo mollientibus, ut aq. tepida, postea actioribus ut aq. mellis ʒ iij. sacc. ʒ j. aloes ʒ j ß m. vel ℞ ægypt. ʒ j. dissolv. in aq. plantag. linteoque molli eo imbuto contínge palpebras vitato oculo. vel ℞ vini alb. ℔ ß sal. com. ʒ j. stent in pelvi tonsor. per dies 6 vel urina ægri stet per noctem in pelvi vel acetum acerrimum. *For.* ung. ros. cum pauxillo tutiæ præpar.

A fasciatione diuturna tollitur, si tertio quoque die fascia solvatur & pars tepida vel hydreleo foveatur, vel decoct. chamæm. melis. in vino vel muria; ampullæ aperiendæ inungantur ung. alb. Rhas. desicc. rubr. &c.

Penis, uteri, tollitur lithargyri auri per diem ac noctem in aceto acerrimo macerati ʒ j. ol. violac. modò ʒ j. modò. ʒ ß. f. ung. succus ebuli extractus & siccatus cum ol. ros. in mort. pl. ad spissitudinem ductus.

PRIAPISMVS est colis tensio sine libidine & non sedatur venere. Est quasi convulsio cum dolore. Satyriasis est cum libidine, Sedatur venere. Curatur ut furor uterinus, mentha. Imprimis rad. nymphææ. Inedia. Vomitu, fric. part. superiorum.

PSYDRACIA. Pustula.

PTERYGION. Oculi vitia.

PTYALISMVS Sputum illud est

quod in prima coctione generatur & in tertia in cerebro, quodque in tonsillas deponitur, coquitur, per os vacuatur. Nunc acre est nunc album, &c.

CAVSA est pituita à cerebro vel ventriculo, imprimis mane, defluens: non semper fit à frigore, sed sæpe in morbis à calore exurente. fit quoque, præsertim quæ est à cibo, ab aff. hypochondr. & scorbuto. sæpe à morbis præservat.

Curatur, si tollatur causa, ut catarrhus, siccantibus, vacuantibus.

PVDENDORVM pruritus. Pruritus, uteri.

PVLMONIS hydrops. Hydrops pectoris.

PVLMONIS inflammatio. Inflammatio pulmonis.

PVLMONIS vulnus. Vulnus pulmonis.

PVPILLÆ dilatatio. Oculi vitia.

PVSTVLA. Furunculus à phlegmone differt parvitate & sang. crassitie, suppuratur per se, dolet, acutum est tuberculum. Curatur suppurantibus, post sarcoticis.

Sudamina seu papulæ sudorum in collo, pectore, brachiis, &c. oriuntur à sudore bilioso cutem exasperante, de quibus aphorism. 21. s. 3.

Epinyctis, pustula noctu orta noctu excrucians

Pulmonis vitia.
Cruch. Horacius, Dantzthemalius,
Trid. 4. Schenck. Euchir. Pr. p. 905.

Pulmonis Vomica.
Cruch. Si fiat per materiae
ruptionem: si ope fit, expectoratione, mundificatione, ulceratione.

Pulm. vlc. ad Phthisin.

Rachitis. vid. Ladocomia.

crucians varij coloris. fabam magnitudine non excedit, exulcerat. Curatur pro ratione causæ.

Essere, tubercula sunt parva, duriuscula cum insigni pruritu subito universum corpus occupantia instar morsus apum. Sponte iterum evanescunt. fiunt à serosis humoribus. prænunciant tertianam, quare curanda sunt ut tertiana.

Psydracia pustulæ sunt rubræ frontis & capitis. Curantur siccantibus ut creta alba cum suc. sempervivi & aceto vel litharg. & cerus. cum oleo.

Phlyctænæ, ignis silvestris dictæ, vesiculæ sunt ab humore subflavo, acri. durant ad diem 4. præter generalia Topica sint refrig. hum. acu aperiuntur, ulcera siccantur.

Pustulæ corneæ curantur ut ophthalmia.

RABIDI canis morsus. Venenum.

RAMEX. Hernia.

RECIDIVÆ omnes periculosissimæ, quia vires adoriuntur à priore morbo prostratas, quia convalescentes copiosum alimentum requirunt, recidiva victum tenuem. Cautiss. hic agendum est & potius cibis medicamentosis quam medicamentis pugnandum.

REGIVS morbus. Icterus.

RENVM calculus. Calculus renum.

RENVM inflammatio. Inflammatio renum.

Renum apostema. Vid. vlg.
Vulny. v. vulg.

RENVM ulcus. Vlcus renum.

RENVNCIATIO. Vulnus magnum dicitur. 1. ob ſolutæ unitatis magnitudin. 2. ob principatum partis. 3. ob corporis læſi cacoethiam. ad diem nonum uſque ſuſpendet chirurgus ſuum iudicium, ne fallatur.

Si cadaver domi vel in agro jaceat, & quæſtio ſit, an fulmine an alia injuria interierit. Si à fulmine, corpus ſulphureum odorem ſpirat; ita ut canes, &c. id attingere non dignentur. Sub parte integra vel vulnerata oſſa ſunt contrita, vulnus eſt nigrum: Si in partem ictam cadat; bruta in adverſum latus cadunt; vigilans ſi tactus ſit, oculos habet clauſos, dormiens contra. Non corrumpitur.

Suffocatum infantem ſcire licet, ſi antea perbelle habuerit: ſi os nareſque ſpuma madeant: ſi diſſecti pulmones ſpumoſi ſint.

Si quæratur, an qui confoſſus eſt vulnera acceperit vivus an mortuus: ſi vivus, labra vulneris ſunt rubra, cruenta, tumida; in ambitu livida.

Qui ſubmerſus jacet, ſi vivus ſit præcipitatus in aquas, tota alvus aqua intumeſcit, è naribus mucoſa, ore ſpumoſa defluunt, extremi digiti excoriati cenſentur.

RHAGADES. Fiſſuræ papillarum.

RHEVMA. Catarrhus.

RHYAS. Oculi vitia.

deflixis humoris, ulcera, granula
leprosa circa Glandulas, pinz
et pectoris empyematica, Opthi
sicos.

Cura. Removendæ sit causæ.
Cathartica accommodata, ut supra:
Sic et Opthisici. Hepatis tactus
vid. Ictus
Singultus ✝ Pal. Hydropic.
Tussis: Sibilans. Pal. angi
Lethargus. Ictus Cardiaci Lucbas.
Defectus Expectorationis. Vigiliæ.
S. Gottfri et Oedemic. Syn.
Vial. mucosus. Ovis lactis.
Opthisicus

Oris sanguinei tonici, calid
applicati: externi D. Rock
gerj.

Rheumatismus: Morbus vett. no
stris cognitus, nec à nostris Co
loribus corporis multum frequen
tibus functionibus abhorrens.
Diff. à catarrho, à quo diversus,
matismus: Sed Crisin.
Fit ob in parenchyma musculorum, ut
carnem, ut partes nervosas, ut
articulos.
Curae per S. M. vel Vigil.
Evacuata et sero mellito.
Ptisana Guaiacata et Cichoriata. Cons. fl. Rosæ et beto
Pectoralis et c. Semper v. pinpinell. et S. Chiandz.
Julapis papav. errat. c. syr. Limon. Nymph. et Scabios.
Decoctum Pectoralis Cassia et Tabac c. Syr. Fag. et Hyssopi.
Subsequentia nocuisse: in fine opus.

spiritu dicto et fluxio: aliis pa
sensibiles immersa ex vitrio
ciatis.

Curae, aliis debetur Tus Guaiacum
nervos exercitationes, fri
alia Tus Juniperum nervos, mu
Pinanda Cathartica quæ supra
Danda Solis lenientia.

Martij obſ. XXIV.

Podencaphisma ex Fernelio.

Recipe Succi Cichorij, Endiviæ, Fumariæ, Scabiosæ, Lactucæ, Acetosæ, Borraginis, Buglossi, Violarum, Capillorum Veneris, Hyssopi, Betonicæ, Agrimoniæ, Polypodij, Scolopendrij, Capparum, Rutæ, Absinthij, Centaurij, Trifolij fibrini, Cardui benedicti, Scordij, Millefolij, Chamædryos, Chamæpityos, Ireos florentinæ, Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ, Angelicæ, Zedoariæ, Contrayervæ, Tormentillæ, Bistortæ, Pimpinellæ, Saxifragiæ, Ebuli, Sambuci, Rubiæ tinctorum, Asari, Cardamomi, Cubebarum, Cinnamomi, Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Macis, Zingiberis, Galangæ, Cassiæ lignæ, Cassiæ fistulæ, Myrobalanorum Chebulorum, Emblicorum, Indorum, Citrinorum, Myrrhæ, Olibani, Aloës, Succini, Ambræ, Moschi, Croci, Rhabarbari, Agarici, Turbith, Scammonij, Diagridij, Hermodactylorum, Colocynthidis, Euphorbij, Sulphuris, Salis gemmæ, Salis Armoniaci, Nitri, Vitrioli, Alumenis, Tartari, Mercurij sublimati, Arsenici, Cinnabaris, Auri, Argenti, Margaritarum, Corallorum, Lapidis Lazuli, Lapidis Armeni, Smaragdi, Hyacinthi, Rubini, Saphiri, Turcoidis, Bezoardici, Unicornu, Cornu Cervi, Eboris, Ossis de corde Cervi, Ossis de Pectore Hominis, Cranij humani, Carnis Vipeæ, Testarum Ovorum, Testarum Cancrorum, Lapidis Hirundinum, Lapidis Bufonis, Lapidis Cancrorum, Lapidis Judaici, Lapidis Nephritici, Lapidis Hæmatitis, Lapidis Galactitis, Lapidis Asiatici, Lapidis Pedemontani, de quo vid. not. [illegible] Lapidis Manelli Cumani, obſ.

Ecbolopharmacia efficaciſſima.
Hydropſia Data.

[illegible] ſingulis [illegible] ſt. ℔ ß — ſ.
c. Dodonæo, Manlio, Amatho Lu[illegible]
Pedemontano, de gro vid. not.
[illegible] Lapidis Manelli Cumani, obſ.

RIGOR. Horror.

SAHAFATI In Infante non debet curari, vindicat enim ab epilepsia: si quid tamen sit agendum, nutrix placide purgetur, caput laveturr decocto malvæ borrag. hord. hoc facto caules tepidos butyro inunctos appone, vel hederæ, atripl. folia itidem uncta. vel rad. althææ in urina pueri decocta: concedantur Topica è suc. fumar. scabios. enul. lytharg. ol. nuc. axung. porc. Habet *For.* infallib. pro pueris & infantibus. ℞. vitell. ovi ad durit. elixat. n. 16. myrrh. ʒj. rad. aron ʒ ß. ellebr. nigr. gr. iv. coq. in fer. sartagine absque flamma donec spumam emittant, tum exprimatur oleum, totiesque coque & exprime donec spumam non amplius mittat: abjectis fecibus ol. in vase clauso serverur ad usum.

In adultis curatur digerentibus & imprimis pituitam & mel. vacuantibus. Nonnisi his sæpius repetitis conveniunt topica primo crustas mollientia, post suc. vel decoct. fumar. lapath. acut. chelidon. fol. heder. scabios. far. fabar. Galenus sola charta combusta aceto diluta parti affectæ illita plurimos curavit, urina, muria. *For.* seq. arcanum ponit. ℞. butyr. saliti, axung. porc. ana ʒ j. sulphur. ʒ ß. argent. vivi saliva extincti ʒ j. (quidam obiit capiti applicato hydrargyro) vitriol. crud. ℈ j. butyr. axung. sulphur. seorsim in mortario liquentur, ad-

dantur reliqua. Naſturtium frixum vel tritum cum porci axungia. Tandem curatur ut lues venerea dec. Guajaci; ſaliva hom. jejuni. Liquor è viridib. lign. deſtillans dum uruntur. gum. prunorum. materiam expellentia è Card. bened. CC. utilia ſunt. Balſamus Peruvianus vel Terebinthin. aq. vel ſucco Nicotian. cocta.

SANGVINIS effluxus cum contuſione. Contuſio cum ſanguinis effluxu.

SANGVINIS ſputum. Hæmoptyſis.

SARCOCELE. Hernia carnoſa.

SATYRIASIS. Priapiſmus.

SCABIES. Quædam feliciſſime omnem ſcabiem curavit ſucco naſturtij cum pinguedine anſeris.

SCIRRHVS eſt tumor qui è mel. vel pituita naturali exiccata paulatim in parte fit ſine dolore. *Platerus* eum à ſucco alimentario incraſſato ſiccato indurato fieri poſſe ſtatuit.

Diagn. Durus eſt & dolore caret licet prematur. Color lividus, ſi à mel. frigidus.

Progn. Qui omni ſenſu deſtituitur, non curatur. Curantur vel reſolutione vel ſuppuratione. hoc rarius & cum majore periculo. ſequitur cryſip. inflamm. &c.

CVRATIO. Fit per malactica. Nunquam vel ſolum humectandum vel reſolvendum: ſed vel alternatim humectetur & ſiccetur, vel

ſimul,

Approbata Gal: S. Capitularis Marcelli Cum:.
Vigilis Sacris Annali Cur. S-1. obs. 74.
Terebinthinas S. Prevostij. Ars.
Vide Podokarpea in Hesperia post Stationes Quarias d. 4 Mar.

Universalia q Salubria unge necessaria,
Sunt sic a. ois cum fidelia.
Balnea artefacta, q leu. d sicc. digerentib & tegentib
& balneo Sudandy. Thermae Subterraneae, Badenses. Acidula.
Lacrymalia, & crassa comoda.
Vigilis Bernardini Ayc
Vigilis cubitalis c. d S. X.
Litharg pro..
Prof. c. ho d alb. ovi, Capituli Marcelli Cum.
Lohis c. Vinum. d Vigilis Terebinthinae Lota c. vitel. ovi, Litharg. rec. d
cum cautione. D.
Vigilis Terebinthinae d Aub. Fuchsii.

Diff. Rewlowerys, et ὑστερόρρυσις
d Sep. Phlegmone, et obstructo.
Pars ista separ Gent, Vasa, et Gent,
parenchyma, et gibbus Simia
parte.
Sym. et, Diuretica, remitens in
Centro Hypochondrio, Acentibus
labi, Simile, molestia, pallor ori,
pois, Dure facie, et Livor,
macies
Emphysema. Fil. Sachar. Diachylos Heath.

Diff. Rewlowerys, et ὑστερόρρυσις
d Sep. Phlegmone, et obstructo.
Pars ista separ Gent, Vasa, et Gent,
parenchyma, et gibbus Simia
parte.
Sym. et, Diuretica, remitens in
Centro Hypochondrio, Acentibus
labi, Simile, molestia, pallor ori,
pois, Dure facie, et Livor,
macies
Emphysema. Fil. Sachar. Diachylos Heath.

Diff. Rewlowerys, et ὑστερόρρυσις
Vertigo, post obstructiones stru-
mosa, Phlegmones male cura-
tas, fell. Tonicas.
Recens, et inveterata.
Sch. Liens et ejus partes occupans.
Sym. Hydrops transit, nisi mature
curet. Inveterata et lapi-
dosa, incurabilis.

Lienteria et ἀπεψία.
Mel. de Capparibus
Landanum Sydenh.

Diff. Rewlowerys, et ὑστερόρρυσις
d Sep. Phlegmone, et obstructo.
Pars ista separ Gent, Vasa, et Gent,
parenchyma, et gibbus Simia
parte.
Sym. et, Diuretica, remitens in
Centro Hypochondrio, Acentibus
labi, Simile, molestia, pallor ori,
pois, Dure facie, et Livor,
macies
Emphysema. Fil. Sachar. Diachylos Heath.

Diff. Rewlowerys, et ὑστερόρρυσις
Vertigo, post obstructiones stru-
mosa, Phlegmones male cura-
tas, fell. Tonicas.
Recens, et inveterata.
Sch. Liens et ejus partes occupans.
Sym. Hydrops transit, nisi mature
curet. Inveterata et lapi-
dosa, incurabilis.

Lienteria et ἀπεψία.
Mel. de Capparibus
Landanum Sydenh.

Diff. Rewlowerys, et ὑστερόρρυσις
d Sep. Phlegmone, et obstructo.
Pars ista separ Gent, Vasa, et Gent,
parenchyma, et gibbus Simia
parte.
Sym. et, Diuretica, remitens in
Centro Hypochondrio, Acentibus
labi, Simile, molestia, pallor ori,
pois, Dure facie, et Livor,
macies
Emphysema. Fil. Sachar. Diachylos Heath.

Diff. Rewlowerys, et ὑστερόρρυσις
Vertigo, post obstructiones stru-
mosa, Phlegmones male cura-
tas, fell. Tonicas.
Recens, et inveterata.
Sch. Liens et ejus partes occupans.
Sym. Hydrops transit, nisi mature
curet. Inveterata et lapi-
dosa, incurabilis.

Lienteria et ἀπεψία.
Mel. de Capparibus
Landanum Sydenh.

simul, ut monent antiqui. suffitus aceti cum lap. ignito optime resolvit. Causa anteced. vacuanda.

SCIRRHVS hepatis frequenter sequitur obstructiones. Raro agnoscitur. malus est corporis habitus, urina parca absque febre. reliqua vide de obstructione hepatis. Curatur ut supra semper addendo nardum, absinth. croc. mastic. Si gibba pars laboret, imprimis Topica conveniunt. stercus capræ. decoct. sars. parill. rad. filic. cichor. mollientia, Chalybeata.

SCIRRHVS lienis tactu cognoscitur, spir. difficultas, color lividus, pondus in latere siniſtro. repleto ventriculo angustia circa lienem. Si os fœteat, gingivæ exedantur, ulcera in cruribus curationem non admittant, inveteratus est.

CVRATIO. Præmissis lenientibus, alterantibus, vacuantibus V. S. raro convenit, aperientia ex usu sunt, quibus acetum & oxymel ℈ miscentur, frigida sunt cichorac. sem. 4. frig. &c. imprimis rad. filicis. Linguam cervinam lieni convenire negat *Amatus*; purgandum alternatim. Aperiens seq. *Forestus* per 15. dies post generalia exhibuit. ℞. Rad. filicis ℥ ß. rad. cuscut. ʒ ij. coq. in ℥ VIII vini alb. pot. ad consumt. tertiæ partis. Colatura utere pro una. Efficacissimum est decoctum ligni Tamarisci, ut Guajacum decoqui solet, præsertim si in aq. chalybeata co-

quatur. Chalybs, aq. calcis vivæ. ammon. cum cicuta. vid. Senn. Tentarunt aliqui aquas sponte natas, alij ligni potum: illi præservati ab ulteriore lapsu, non curati: hi in pejus ruerunt, credo siccatione nimia. For. seq. Topicum in magno pretio habet: ℞. ol. Cappar. ʒ j. ol. lil. amygd. d. chamæm. butyr. rec. ana ʒ ß. suc. bryon, cyclam. ana ʒ ß. coq. ad consumtionem succorum, addendo ammoniac. in aceto soluti ʒ ij ß. pingu. gallin. crur. vitul. œsyp. hum. ana ʒ ß. pulv. cort. rad. Tamarisc. Cappar. Ceterach, rad. filic. ana ʒ j. pulv. sem. agn. cast. geniſt. ana ∋ j. ceræ parum, f. ung. vel fotus ex aqua exstinctionis lapidis igniti; suffitus. motus ante cibum prodest. Si incurabilis sit, in vita retinentur diæta, & si purgentur vere & autumno.

SCORBVTVM quod An. 1486. Germaniam primo invasit teste *Spangenb.* est cachexia partium naturalium ab humore melanc. peculiariter cotrupto. *Subj.* Est cavitas illa *Spigelij*, in quam hepar, lien, ventricul. excrementa deponunt. fons est in hepate, liene, imo hepar sæpe, sæpè & lien salvus fuit: sedes sunt venæ & arteriæ.

CAVSA proxima est humor tartareus à crasi læsa genitus vel per se vel per errorem externum. *Ichorosus*, aliis sæpe mixtus. Si fiat malignus, causa est proxima: si nondum, antecedens. *Contagiosus* enim est ge-

neratur

Interna: Vinus Calybeata. ℞ Pulv.
℞ Salitig c. Vd. Splenetici.
Pulv. rad. Angelic.
℞ absinth. Romani, geniste, cupatorij, ℞. Junip.
Extr. hiem. Rubij aa Vphyllidis.
Mucg o Tapiem
Externa:

Ping. Leonis, et anserig c. Diagmia. ℞
Ol. Lil. alb. unguent. Rute. Unguentum,
Suffumigijs ℞ per Marcasitas
sive pyrites ℞: ℞ Carab. Camon. Foresti.
Empl. Diac. Rulandi Empl. de melilloto.
a tapsor.
Diacalx Joannis.
Diapyretic. Pfyneti, Romanos
Diadichanum S. Jacobi Galeni.
Diversbergio c. Secur, vinum tuta,
vid. Epifagm. uras obf. Med.
Vnct. c. Cicuta Hildani ep. a
Cropiem p. 657.

Pfeudo-Galenus. Sonnabend.
Plin. XXV. 3.
℞ Quo longe antiquior c, a Hippocr.
ijs olim cognitus ac descriptus:
vid. Rondel. de magnis Lucijs.

℞ Quem Livius Theo falso d. acij,
comod. ffime apparat Medic.
Sectatis part. IV. Spec. Med. Pr.
Sect. V. c. XII.

Cruſia ex Vſtigijs Ap. Ioſ.
Aperta aurium.
Exercitia omiſſa d intempeſti-
va.

Aduerſus Arift. Ad Pa-
tratu. Reuocare conat. e Pa-
racelſ. a Platero, Anatomes
tum ſito viro plura non debebat,
ſi abſq; iniuſtitia culpa nec ſoles
rat. Cum nulla ſequentia
à Ouolatili deſumuſſ.
Ferunt n. ventriculi ſtyliſticaſ
tantopè neceſſarij ſorbitio dig
nimiſ & deprauatis à Ouola-
tilij; cibis copioſo corrigit d Iuuen.
A Oe ſigo obuiſ, d Dens ſigit?
ſiriuſſ ac efficaciſſ ne neſſ.
Hæ veria ca e, q alijs oib.

neratur ob coctionem læsam à rebus nat. n. n. p. n. & salis volatilis qui cibis inest & pneumatosεos defectu. Sic *Platerus* cibum & potum sub forma halitus subire & in sanguinem concrescere statuit. sic curatur rebus sale volatili plenis, ut cochlearia, è quibus si tempore vel coctione Sal volatile exhalet, inutilia fiunt. Vnde succus & conservæ utilissimæ. Sic cibi Scorbutum generantes sale fixo abundant, curandi per volatile. facit huc acetum. fumo indurata.

Sign. præcessit victus crassus, mœstitia. Quod si præcesserit, in tali homine nullus erit morbus, quin cum Scorbuto sit conjunctus. Signa initij sunt lassitudo spontanea, abdom. gravitas, diffic. respirat. post exercitium crurum debilitas cum dolore, color fit lividus, homo pingueſcere videtur. post accidit gingivarum pruriginosa rubedo; pulsus parvus, urina nunc clara nunc turbida. postea & oris graveolentia, gingivarum sanguiſluus tumor, dentes vacillant, crurum maculæ plumbeæ, purpureæ. Lentigines innumeræ. Rarissimè deficit appetitus: decumbentes se sanos profitentur: quidam statis diebus cum & sine febre gravius affliguntur: quidam alvum adstrictam, alij fluidam habent. Pedes maculosi, aliquando intumescunt, extenuantur. Vlcera in cruribus. Varix sub lingua. Omnia animalis facultatis symptomata. Hydrops, gangræna, sæpè sca-

bies, pleuritis notha, hæmorrhag. narium, cruentæ alvi dejectiones, venarum in cruribus apertio. Ictterus, asthma. herpes. ardor, dolor plantarum pedum. ossium motorum strepitus. Caro sub palpebris luxurians. In difficili respir. ægri causam sub diaphragmate demonstrant. arenulæ rubræ in urina. Item materia Tartarea, dolor totius. dolores circa articulos ingravescentes. dolor ventris sæpe cum peritonæi ruptura. differt ille dolor à colica, quod hæc soluta alvo evanescat, venter attollatur. Hi dolores sæpe ultra 40. diem extenduntur; ventrem excavant, rectum intestinum sursum revellunt, ut non nisi vi clysteres injici queant. Materia inter duas tunicas intestinorum sæpe hæret. Lumbago, dolor nephrit. arthritis cum levi paralysi & dolore vago. Paralysis subito orta, celeriter mobilis, vaga. Tumores subitanei, tremor, convulsio, cæcitas subitanea. suffocatio cum primus cibi bolus assumitur à vapore styptico tracheam & œsophagum afficiente. Vomitus. sputatio. calor, rubor faciei subito ortus & subito cessans. Anima olida omnibus scorbuticis. febres erraticæ, in quibus frigus sæpe ad 6. vel 7. horas extenditur, pulsus præter rationem febris est tardus, urinæ variæ, frequentes tertianæ, sæpe sine frigore. erysipelas, ulcera Telephia.

Progn. Pulsus tardissimus terrere tam non debet.

Notandum ist[er] alß[us] ver[us] d[e] Athanasio scribit[ur] fuisse, sed illi tr[ibu]unt varijs modis, sicut ipse ait, tantis Athe varijs. Et th[eo]logi septi complicant, quor singulari volumine recensent seve, ainy Engaleny, Enj all. / vor d[e] Morons nothenny.

Cui? Sanè Cyrenæ adfines E:
vid. Ja. Rod. Acost. de eadem.
; Pétron. Sat. Cenæfol. CXCV.

Quæ antea solitus & frequentissima
vocibus
Eph. Catholic? 2 stab: 2 fol. seq.
Resina agarici & Jalapæ c. ℔ß.

[# Cui hoc sit dicere, nemo dis-
cerit. S: lies par ista sacrit,
sinistro latere V. Secunda.
Sed ipse Supra tota Cæsus sis
gelicus commoverat. p. 208.
Ille is dextrus propterea dixit.]

[# Jam non attendendæ sit, ut febris
exacerbetur. Hæc n. Nec
conatu demoratur, cujus exoneran-
tis juvanda & impedienda.
Sed maxilla scorbuticos à copia
Cacochymiæ is Ille restaurantis
omnes, multo laudabilis Nec
conatu.]

Arcum Bacchareos Cinct?
Ja. antiq.
Catalog.
Asiaticis Organacanthinus [illegible].

Vinegar.
Elix. Antiscorbut. Schroderi.
Catalogi
Specifici.
Dulcis.

deber. lethalis enim non est per se in scorbuto. In principio sola aeris mutatione curatur. Sæpe pro lue venerea habitus fuit. aphonia sæpe fit cum convulsionis epilepticæ specie à musculis laryngis contractis. In febrium initio sæpe carus sponte cessans oritur. Tumores genuum difficulter curantur. Maculas evanescere absque euphoria malum.

CURATIO. Præmisso clyst. si plethora adsit nec quicquam obstet, etiam in morbi progressu V. secanda in brachio ~~loco scalpel-lo~~ secundum ixin. *For.* salvatell. manus sinistræ aperit. Sæpius secandum in diversis partibus parcè. Maculæ contra indicant. Materia alteretur, post repetitis vicibus, lenirer purgandum. fortioribus exasperatur. multi absque purgantibus curati fuere. Si cum urina laudabili malum increscat, signum est medicamenta debiliora esse quam pars est. alternatim aperiendum adjectis specificis. Sir. antiscorbuticus *For.* conficitur è succ. cochl. & *beckabung.* cum sacc. Pulvis Sennæ *Senn.* talis est. ℞ Fol. Sen. el. ʒ j ß. cremor. Tartari ʒ iv. Cinam. ʒ iij. Caryophyll. galang. ana ʒ ß diagrid. ʒ j. hujus pulveris ʒ ij. vel ʒ iij. in sero lactis infund. per noctem, colatura detur. lac dulce decoct. *beckabung.* nasturt. sem. sinapi. repetitis vacuationibus alterationibus specifica danda ut cochlearia, Nasturtij omnes species. *Beckabunga* quæ minus calet & humida est, in febb. utilis; si cochl. cum

beckab. mist. optimum. raphanus rusticanus. Chelidon. minus. Illecebra, quæ tuta non est. alij ubice commendant. Sinapi. arum. cichor. endiv. acetos. suc. citri, limon. Sp. salis, vitrioli, sulph. exhibentur commodissime cum sero lactis ob calorem, decoct. absinth. pulv. *Birkmanni* cum sale cochlear. nasturt. sem. eruc. vel spir. cochlear. &c. qui æque flammam ac sp. vini concipiunt; acidulæ. tandem diuret. sudorif. ut rob. sambuc. ad 3 iij. tandem roborantia.

Morbi symptomatici, ut icterus, hydrops, febres, nunquam rectè curantur & sæpe frustra curantur à medicis, nisi scorbutum curetur. Gingiv. vitium curatur abstergentibus ut aquileg. sp. vitriol. & specificis sub forma collutionum. It. aq. cochlear. *beckab.* Nicotianæ. masticatorior. pulv. è sale ut torref. cinere vit. cl. fol. salv. alum.

Maculæ resolventibus topicis tolluntur. esus pom. aurant. cum cort. utilissimus. [lac.]

SCORBVTICA arthritis. Arthritis scorbutica.

SCOTOMA. Vertigo.

SCROFVLA est tumor scirrhosus glandularum, cysti concluſus. Vniversas sæpe glandulas occupat. 70. in mesenterio repertæ fuere. Si in gutture, bronchocele vocatur. differunt à reliquis tumoribus numero: plures enim sunt & radices profundiores agunt. sæpissime in inguine, axillis, stabulatur. Tumor est durus, tactui non cedens, dolens.

Absinthij aquatic.
Fumarie.
Veronicæ } ā Ebulli ij.
Dest. ā Stata, ā ℥ iß
vel. Salsaparil. mixtis.
Drake gum. ana Specifica, cognito
ā Veslingij lect. Botan. Mss.
Sing. Graffiæ aromatic. obt. Steinij Ms.
— Cameracij Novocomi.
[* Sed fieri potest, ut eiusmodi
non rectificati fortiores sint,
quam rectificati; minus
calidi?]

Diuretica ℞ Serositatis abundan-
tiam nihilissima vid. Sudo.

Symptomatica occurrendum est
aliàs Sub Specie titulis vide-
ri, Nitri ℞ Stemp. specifica.

Lac mire commendat: Oleum
Succini nitrosum med. cathol. Mar
Stahlii c. — Terebinth.

Cons. Cochleariæ.
Centaurij min.
ʘ Tamarisci.
♃.
— ʘ.
— ♄.
— Dictamn.
Ess. tripolij Silvij Palm. M
Sem. Sanct.
Ess. pini.
Ess. ♂ ʘ vipar.
— Cyc.
— Spec. Cerasin. Lun:
℞ Coral. ambarata.
Cons. Guaiaci.
Terebinth. c. ♀ Cog. Baphic
Ess. ♂ Ech. Spalatti ro
— filicis
Vacida Hungar.
Arcan. duplicat. Quinq:
— Guaiaci
ℏ betulæ.

Sg. myrrhatti c. sudamina nocisti.
Bals. sl. Lignit.

MS. ex med. à Cysmate.
Hermodactylata c. ℥ angelico, ℥ss
tybertino, aloëtica,
ad. ℥iij.
℥ij.

Vinum Oph.

℞ Marcelly Cumany obs. C. ℥viij,
zetica laudat, inter ℥ Card.
sulloni vino in cocto, ℈ ℥ij.
℥ Lacertar, Herc. Saponia.
aaa ℥ij. Empl. magnetis ℔ij.
Dia ℥ Rul:
Catapotia Bonalbergi Marocel-
lum:
Vncto Apostolor c. Sarcocolla.
Ol. Lacertar, Jo. Prevost.
Empl. de ranis c. d. ℥ij.

Pro unctione nervoso, Vid. Hom.
Vulcanum Neurographiam. A
n. ng tuto Mercur. pp. inde ra,
te d. mundz, sed et p. n. d adven,
tice: Jacobo, Tub alis, & artetis,
d ingenitis.

Malignes, & ℈ß, d vasis insertis
incurabiles.
Zirary. Vid. to ppr. & sac a. magè
caveas, ne foliola reliquantur
Purgantia toti, d capitis.
Apophlegmatizantia d Encephala.
Hidrotica salutifera.
Catapl. fol. cum. ag rosis d fol. ℥ij

Diff. alij Hepatis, alij Lyen,
pathic. Pleuretes, Peris.
Diuturna, brevis.

Ca Hipp: VI. aph. XXXIX. ℥ij,
cubet ℔ xerobet.
Vid. ℥ V. aph. III. & IV. & VIII X.
VII. aph. III. & XLI. &
XVII.

Curatio sequi tollenda ca.

Sinapis ab excoriatae cum Cepis
cruda & decoct. c. Lard. ℥ij.
Dyapoltic. Vnct. d plantag
c. Litharg. aq. & Barbette.

CAVSA est pituita vel mel. indurata. *Platerus* à suc. aliment. indurato fieri vult, cum in pus non mutentur, nec putreant, & diu durent.

CVRATIO. Causa antecedens tollitur generalibus. debilitas viscerum pituitam generantium corrigatur. Topica sint resolv. specifica, ut vipera, scrofularia, strumaria, rad. gladioli. Si resolvi nolit, suppurandum. si non suppuretur, seca, ure: lamina plumbea fricatæ scrofulæ applicanda: tollitur & ligatura è setâ equinâ quæ indies arctius constringatur, donec ab alimenti defectu decidat. Galliæ Reges contactu eas curant.

SINGVLTVS. Causa est vellicatio orif. superioris, quæ fit ab humoribus, vaporibus ex utero, hypochondriis, siccitate, inflamm. hepatis. vulnus meningum.

CVRATVR. Veteres spiritum continebant. aq. frig. ore continebant, sternutabant. Si vehemens sit singultus, symptoma, neglecta causa, curetur narcoticis ut sir. viol. papav. vel seq. For. ℞. sem. anet. vel carvi ʒ j. sem. papav. alb. ℈ ij. manus Christi perl. ʒ j. f. nod. infund. in cervis. tenui. Causa, si fiat per consensum, tollatur, si à frigore calidis, si à flatu itidem. Si à nimia vacuatione acribus humidis curatur. Si à copia cibi, vacuetur. Si à veneno, detergens, postea specificum propina. Si à vermibus, educantur. Castoreum, cuminum sinistro carpo alliga-

tum. *For.* ſpinam dorſi è reg. ventriculi inunxit ol. violac. exhibuit ſir. viol. ad humectandum & ſir. menthæ. ad roborand. adſtringentia ut ſir. de mentha. abſint. non conveniunt niſi vacuata materia.

SIRIASIS infantium. Infantium ſiriaſis.

SITIS in febribus. Febrium ſymptomata.

SOMNVS profundus. Carus.

SPHACELVS. Gangræna.

SPHACELVS oſſium fit vel ab aeris contactu vel ſanie vel med. humidis. Cognoſcitur viſu cum livida evadunt, partim ſpecillo cum ipſi nihil lubricum ſed aſpera multa occurrunt, cumque ſubſtantiam eorum fungoſam facile ſubit. Sæpe tamen oſſa carioſa duriſſima ſunt.

Si caro oſſi inducta mollior eſt & diffluens nullo fere ſenſu prædita. Si è vulnere pus ſolito & juſto copioſius effluat, ſi oræ ulceris ſint inverſæ. Inſpergendus primo eſt pulvis è radice ireos, gentian. ariſtoloch. centaur. cortic. pini. cera uſta, myrrh. ceruſſ. ſi major ſit, ſcalpris erodatur; ſed *Fab. Cent. 3.* hoc periculoſum judicat, uſurpandum nonniſi in magna carie. Ipſe potius *obſ. 92. Cent. 2.* pulv. euphorbij innoxie ulceribus cum carie oſſium, non munitis ulcerum labiis, in pueris quoque inſperſit magno cum ſucceſſu. Vnde colligit falli Dioſc. vel Euphorbium vete-

Spasmus . . . ?
Spasmus Cynicus. bil. gustus.

Spasmus flatulentus. (sab. Gutta Crampa)

Ca.

Curae.

Prognostica: Spiritus pes. fil. agrest. anag.

Ligatura c. Spiritu tiliaceo.

Remissa fortiora; paricta si pede.

Frictiones.

Humidi Hygrotici ex Aleosmyde.

Fouth Camphorati, Camphorati, mellissophyli, lapidis, et Calendulae.

Balli; ifo.

Bal. Sancti.

ol. philosoph. Ruta c. Vsnea.

Vnctitia.

Diligenter circumspectus sacculorum.

Globularia hypotheca et farina.

Spagirica: Filix polypodior. Vmbil. ā fl. filicis. cord. terr. Hirundinis aud a. Epilepticae plant. Diaphoretica gem. Vnguis c. Myr. Succi lil. convall. ambrosiae Majoran. c. Tart.

veterum nos ignorare. Si fruſtra, Scalpr. terebra deſquamm. eximatur vel penitus tollatur, exceptis articulis iſchij, femoris, capite, vertebris, &c. Si fruſtra, potio vulneraria adhibeatur. Corrupti oſſis ſeceſſum expectare, non vi procurare decet: Seu ſquammis labentibus motum, non lapſum, accelera.

SPLENIS inflammatio. Inflammatio lienis.

SPLENIS intemperies calida. Intemperies calida lienis.

SPLENIS ſcirrhus. Scirrhus lienis.

SPVTVM cruentum. Hæmoptyſis.

STERILITAS. *For.* ſeq. præſcripſit. ℞. Croci, piper. long. cardam. pyrethri ana ʒ ß caud. ſcinc. cum renib. ∋ ij. galang. ∋ jv. ſem. rapor. paſtinac. eruc. urtic. ling. avis ana ʒ j. porrorum, ZZib. alb. cinam. elect. ana ʒ ij. elect. diaſatyr. deſcript. Meſuæ ʒ jv. cum ſir. conſerv. ZZib. condit. f. Elect. ſervetur in vaſe vitreo, capiat hora una ante cœnam ad magnitudinem nucis, ſuperbibat vini cyathum. Sumat ante lecti ingreſſum pulv. ſeq. ʒ j. cum vino. ℞ ZZib. alb. ʒ j. galang. ʒ ij. pulv. priapi tauri ʒ iij. f. pulv.

Rad. colocaſſ. cruda vel cocta manſa. ol. majoran. cum coagul. leporis cum moſchi tantillo, arcanum *Lobelij*. *Schreckvos* ſeq. divinitus revelatum commendat. ℞. vitell. ovor. butyr. rec. priap. taur. cicer. galang.

Satyrior. Zedoar. ZZ:beris condit. menth. teſtic. galli & vulpis ana 3 j. ſem. erucæ, caryophyll. ZZ:beris, piper. long. alb. & nigri. ſem. bulb. linguæ avis, Cinam. ana 3 ß cerebelli columbini & paſſer. bene coctorum & aſſator. ana ℔ ß medull. nuc. Indicæ, pinear. mundat. fiſticor. amygd. d. mundat. ſem. malvæ. mercurial. avellan. excortic. dactyl. ana 3 ij. coq. in lacte ovium & aq. conterantur fortiter & add. caud. Scincorum 3 ß. totum conficiatur cum melle roſ. vel ſacchar. q. ſ. coq. lento igne ad f. elect.

Helidæus hoc pro ſecreto habet. R. puleg. orig. ana m. iij. decoquantur in vino malvat. additis moſch. gr. iij. Suffumigetur uterque. Item fumus è ſalvia cocta exceptus: idem ambræ gr. unum vel ad ſummum tria mane in ovo ſorbili exhibet. raſur. ebor. & pulv. ſalv. ana. exhib. decoctum rad. eryngij in vino.

STERNVTATIO nimia tollitur lenientibus, præparantibus, vacuantibus, &c. odore frigidorum ut viol. roſar. attrahatur aq. viol. decoct. papav. roſ. aromata omnia fugienda, nares apprehendendæ, ſp. continendus. odor panis, odor opii, rad. mandrag. ſternutatio etiam exitiali morbo ſuperveniens ſalutem indicat, demittantur manus in ~~gelidam~~, ac inſuffletur. *vid. aphor. 13. ſ. 6.*

STRANGVRIA. In hac urina cum dolore guttatim redditur. Dyſuria alias ſumitur

Chirospheria et Erythronio Dios.

Hydrocotyle vulgaris.

Stomacace. vid. Scabies.

xxxvii. [illegible]

Sen.

a: plethora adusta: sanguinis
& suppressi vel alia causa suppressionis: membris amputatis:
ulcusculis, vulnus venenatis.

Curae: per venas & arteriam
tia. & V.S. vel sec.
influentis: & incisione vasis,
& ligatura sanguinis, &
& expurgare.
Vid. Vomitus venenatis.

+ Croci.
Vinum rubrum potabile c. bino.
Infus. Scabiosae 3 vin. & Hyss.
Samaritani.
Aqua Chir. c. Polygonati,
Cabrate & Bugulae, aa 3;
Bolli.

Interna & externa ad sanguinis
, vid. Sanguis.

Ulcus cancer. Kaekeé w cra-
Immedicabile, & libenda tuta, ne
angeat, vel ulcerat.
Abstinenda a medicina & victu
gantia.
Tumor abdominis: c. d. S.
menstruos suppressione.
Diagn. Color lugubris, hypogas
trij tumidus, tensa dura,
inaequalis, color niger livido,
pervor: vehementi. Febris,
vigetudo, anorexia, anxietas

Vteri adscensus. ἀναβάσεις. of. Hippo. d ferul

descensus. Καταβάσεις.

convulsio. Σπασμὸς ab nos. Καὶ διαφορὴ: ad

alterę inguen ꝓtensio alius:

indicuo Vteri ad latꝰ dicta.

Ἀποκλεισμὸς: pudenda ſ ꝓlapſꝰ.

frequentia glꝰ bruchia fiue

ligatura Hernia lapiora ſt. Manifeſtꝰ ad tactꝰ obſtetric

a irritans ad motꝰ tales interna, ſ ſenſu aggrauantꝰ de

externa. Vapor, humor à globoſo quadꝰ corpo

malignitate infectꝰ, ex uenę ſuaſꝰ ſe commouente

ſtuo corruptꝰ, ſemine tritꝰ compreſſentis.

to, ut qui ouꝰ alio humore Nos ſt ad diaphragma e

tetꝰ ſalitꝰ gignente. ſeparatꝰ aſcendere.

Rex externa, Vt foetidę uaribꝰ

dentꝰ, aſcenſꝰ cauſꝰ, inſꝰ

ricibꝰ a. aſcenſꝰ, d è ꝓpio

bene olentes.

Curatio. V. ſ. ꝑ pleſſaricę: purꝫ

gatoꝛe, ꝑ cauſdynię.

Dolor urgentꝰ. modꝰ ꝗa debentꝰ:

Vrgentia lapꝛora ſicanda ſt

ꝓtinuenda.

Vteri deorſus traſendꝰ: manibꝰ

℞. ἀεχὸν φλεγμάνον, ὑσέρᾳ φλεγμαινόᾳ, νεφρεὼν ἐκπυον. — Hippocr. V. aph. LIX.

Externe, vesicæ refrigerantib. debilitant, vina crida, decoctiones, defecata, cibi salsi, aromatici, acres, frigidi, vina generosa. Interne: vesicæ excoriatæ, calculi, urina acris, et mordax, et alvus fluxa, et renes debiles, humores acres, salsi, adusti, urina purulenta.

Gangræna Polygoza, et Hydropica Phlegmagoga

ac cæsim. rec. emulct. pth, solet vt q. f. turgi.

pth agnosc. rad. simpicell. rad. asparag. f. anis. f. hed. fl. Sambuci, lacte. Prof. o. alb. ovi.

Ἀνάστασις ὑστερικὴ. Hysterica passio. Fallò sic dicta, quod Anatomicos, Medicosq. medentes Hippocr. Paul. Barbette R. lib. IV. c. IX.

mitur pro sola urinæ imminutione sive cum sive sine dolore, ut supra. alias, cum urina non guttatim, debita quantitate, sine interruptione effluit, sed cum dolore.

CAVSA. Humor acris pertinaciter vesicæ sphincteri adhærens ut in tenesmo. item calculus, inflammatio, ulcus, urina acris vel per se cum scil. ob eruditatem in hepate contractam vel frigus vesicæ corrumpitur & acris fit, vel ob mixtionem acrium humorum, si ob potus tenuitatem, exercitium potus crudus ad renes trahitur, pellitur. *aph.* 44. *s.* 6.

CVRATIO. Cura variat pro ratione causæ. Si urina fit acris, molliendum, refrigerandum per interna & Topica: emuls. *For.* seipsum & alios, cum omnia essent frustra, decocto malv. cum sir. violar. curavit, serum lactis caprill. injectiones, sevum candel. inunctum, nux moschat. Dysuriæ causa est vitium meatus urinarij, non sphincteris, etiam vesicæ.

STRVMA. Scrofula.

SVDAMINA. Pustula.

SVFFOCATIO uteri. Causa est vapor malignus è sem. sang. m. aliisque humoribus in test. & tuba hærentibus orta. Tuba Fall. & testes, cum hi penduli sint, illa levis & flatu tensa, sæpe sursum adscendunt, ac pro utero adscendente habiti sunt qui tamen firmiter ligatus est. Probat hoc observ. Riol. Vid. Th. Bartol. Sect. 3. part. V. sect. 1. c. IIX.

tactu etiam sæpiss. corpus adscendens explo-ratur, male pro utero habitum. Tria symptomata urgent, syncope, suffocatio, & convulsio, & jam hæc iam illa, jam leviter jam graviter urgent.

Sign. Præcedit lassitudo, aspectus tristis, facillimè horrore corripiuntur, fœtidis naribus admotis & suaveolentibus locis curatur. Differt à syncope, quod syncope magis est præceps, pulsus parvus est in suff. ut in syncope, sudor adest frig. sæpe conjunguntur, syncope non diu durat, suff. ad triduum etiam, Ante horas 72 non sepeliantur. [In eo enim tempore omnes humores motum suum absolvunt] pluma ori, patina cum aq. cordi applicetur, vel speculum ori, certiora sunt sternutatoria.

Progn. Hyeme potiss. affligit. sternutatio bona: ~~non dissecentur ante 72 horas. Vesalius hoc didicit suo exemplo teste *Par. l.* 23. 46. Dudit. tamen ep. 30. & 31. ait Vesalium non mœrore confectum, sed cum iter sacrum absolvisset, in itinere febre ardente interiisse.~~

CVRATIO. Solutis ligaturis omnibus excitetur. Naribus graveolentia applica ut suffitus penn. perdic. capill. corii, cornuum, castoreum, infra suavia. Imprimis fumus è verrucis equorum siccatis. Clysteres uter. pessi; extra ol. rut. theriac. &c. ung. Naribus, auribus ol. succin. salv. &c. instill. Galban. dissolv.

Jubeadus, vox dempera, adest ἀτνοια,
ἄνοια, ἀδιαθεσία, καταβάρυνσις
ὀφθαλμοῦ, ἀναγαδγοια,
ἀκινησία.
Periodi, quales epilepsiæ.

Cæ. Vapor malignus, venenatus:
ex humore: Ulcus, ut cancrosum
delitescente: Sem. menstruus,
puris humore.

Febris ἐφήμερος. Sepulcrum
Vesalii. Lucis offensio, lacrymatio
lassitudo, ubi febri decessit, re-
vehi in patriam terra sancta.
Visita fuit Papæ: Vi morbi
alios ob pharmacum, ob nec
dolere alia, nec vehi spes, nec
expectare certitudo.

Pil. foetidæ.
Tropæum.
aristolochiæ terendiæ.

Ante exhibenda: vapor dissipandus:
à membris principalibus, cerebro
ne ad corde avertendus.
Extra parochyismum humor, ad
mixtam vaporis expirandi, ejus
quoad impediendo.
Gravedolentia narium: Suavedo-

℥ Hysterici ℈.
℣ Hysterica Pulv:
panacis Horach.
Elix. Uterin. Coll.
Pancorticis Gummata.
Pencedanus angelicatus.
Pencarpelos succinata.
Syr. ℣ Peonia Jo. Gabrielis.
(Consolida media.)
F. actus.
Ol. Castorei theriacale.
Bals. Sclarea Jacamacah.
Sacculi Melissolentichi.
Pessi Diatelos. ? Nic. Myrepsi.
Diartemisia
Hypothymiama (Collidonos: Opopanthis &c.

Syr. artemisiæ c. Silphii ℥j.
Lagoastragali c. Opuntiæ.
Castoriolithi.
Bals. hysterici ℥ij d. infer. J. J. Frey
Pessi olfactorii Silphiati, Nigellati,
d. Castoreati.
Epigastrica fol. Nicotianæ.
Lix Uterina Jo. Mariæ B.
Coma Hysterica infumanda.
Encolpismi d. ℈ij.
Vid. Cubic. ℔ Seb. ij Ars.
Epomphalismi cum cinnamomo de galbano.
℥ Hydrocoryi M. Rulandi cum Opio.
Lac Vitæ c. Sterc. Vaccino.

Sugillata, si intra sit crassa & copiosa curam postulant, ne sit contusata putrefiat & suppuret. Curatio fit per siccantia & discutientia: ℞ Marinæ
Iuncæ c. mellis ℥ij.
rad. polygonati c. ℞ ℈ij.
hyoscyami c. ol. amygd. d.
Unguentum de Cynoglossa.
viridis Regii.
de alabastro.
℞ Gratiæ Dei.

dissolv. in aceto & in cor. rot. extensum umbilico applica. nodulus fiat ex ass. fœtid. ℈ ij. Castor ℈ j. Quædam sola masticatione sem. levistic. & deglut. sunt curatæ. vid. partum. Vinum nocet. Pulv. matricalis talis est. ℞. rad. diptamn. sem. bauciæ ana ʒ j. cinam. elect. cass. lign. meliss. ana ℈ ij. croc. oriental. ℈ ß castor. ping. ℈ j. dosis ʒ ß vel ʒ j. cum cerevis. vel aq. chamæm. exhib. Theriac. cum aq. artemis. rad. angel. Succus allij cum aloe umbilico affricetur. arc. fol. lappæ pedibus suppone. Fecula bryon. in pil. redacta ad gr. 10 vel 12. cum pauco castor. extractum granor. sambuc. siccatorum factum cum aq. vitæ & sp. vitriol. per destill. ad ℈ j. præservatio fit per generalia & specif. & meliss. puleg. rad. angel. &c.

SVFFVSIO. Oculi vitia.

SVGILLATIO, ἐπιχύμωσις. Oculi vitia.

SVPPVRATIO ante maturationem est aperienda, alias enim in fistulam abit in parte exangui, ut pleura, & si materia fit maligna, acris.

Si à materia frigida, aperienda non est ante materiæ universæ coctionem. signa sunt si dolor, calor, tumor, febris intendantur. Vbi calor, dolor, febris remiserunt & tumor in mucronem attollitur, pus est confectum. Locum habent suppurantia, cum humor sic impactus est, ut repelli vel ob partis

principis viciniam nequeat, ſic craſſus ut reſolui non poſſit. Aperitur qua parte in conum aſſurgit ſecundum fibb. rectitudinem, ut pus non confertim effluat. Suppurantia poros occludunt ne calor exhalet & ſic à mollientibus differunt. Aperitur vel ferro vel medicamento. Ferro vel ignito, rarius, vel ſecante ut in annulo. Medic. ſunt vel Cauteria potentialia, vel mitiora ut ferment. cæp. ſub cineribus coctæ, allium, ſtercus columbinum. ſapo niger. ſem. ſinapi. ſal. ficus. diachyl. ſtercus canis, nitrum. tuſſis, vociferat. ſternut. vomitus. ſcabioſ. praſſ. Card. bened. horum aliqua emplaſtris maturantibus adde. ſir. de praſſ. cum aq. ſcabioſ. exhibeatur.

SVRDITAS. Cauſa eſt vel ſpiritus vitium & cerebri, & ſic reliqui ſenſus ſimul patiuntur, vel aures externæ deſunt, vel mearus anditorius obſtruitur, vel tympanum vel nervus laborat. Vidit Platerus Abbatem qui à lue venerea cæcus, ſurdus, mutus factus eſt.

Sign. Si ſequatur alios morbos & reliqui ſenſus ſalvi ſint, nervus laborat, ſi tympanum, cauſa fuit interna vel externa. In febb. malum, niſi criſin nunciet.

CVRATIO. Sublata cauſa ceſſat. Si à pituita fiat, ea ſiccanda, tollenda. Commendatur aq. origani è ſicca planta cum vino deſtillata. fel perdicum cum æquali parte ol. ſuccini.

Purdijo Marocko Empirico. ... IX.

Myrtaloëdaria Viticosa.
Cocciu Sellebarata.

Inu

Carocatharctica.
Ecstima, apopleymatisuata, starmica.
Hellboriei V. S.
Apopharctica.
Vaporosa, Fonatasica.
Spongiæ Tabi imbutæ.
Succi acustici.
olea aurygd. amara. d Tita Dijen?
tinctia.
Vd — Stati.

Ol. ovor. Napthati.
Ballami

Joh. L. S. Lentilius Ephalig.
[et c. Tudore, Tonsea.]

Ephr. Sellebog nigri c. Dulcy simplicis.

Phlegethon. c. cupfort. d. felle
taurin. Jer. Hartz.

Injectiones per Oesophagum
Systematis arteriosi
Jo. Faulhaj.

Hermes Trismegistus Similes.

Macrocephali Britannici.

Alexipharmacum Theriacum Andromachi Senioris.

Corona Ariadnea Dei D. Benedicti.

Corona Alexandri M: Arabici.

cini. aq. fraxini cum ſuo ſale ſpecif. Querc. Crato ep. 59. card. bened. M.iiij. infundit bis. in aq. card. bened. ℔ ij. poſt infuſionem 24. horar. deſtillat; imbutum ea aqua linteum auri immittit. aqua panis. Raro poſt 6. menſem curarur. Vetula auri granum unum vel alterum moſchi cum bombace feliciter impoſuit. alia oleum macerator. murium rec. natorum cum miraculo. ſuccus heder. depurat. cum vino inſtillatus. ſucc. cepar. cum liq. conv. ol. amygd. amar. majoran. è vitell. ovor. è ſem. cannab. ol. Terebint. ceræ. juniper. ol. ſinapi. ol. Guajac. ſuccus Tabaci. Omnia ſint tepida. Nova non immittantur niſi prioribus optimè purgatis; quo facit tuſſis, ſternutatio. medicamentor. una vice gutt. 3. vel 4. infundi ſufficit. æger in aure ſana decumbat. Aures bombac. obturentur. Vnctuoſa, ſi poſſibile, vitentur.

SVTVRA. 1. Opponitur acui Canaliculus feneſtratus qui acumen excipiat, labra vulneris immota teneat, poſt fit nodus. labia tamen penitus non ſunt conſtringenda ut pus exire poſſit. Primum punctura per medium vulneris fiat. In magnis vulneribus multum carnis comprehendatur. 2. Sutura ſicca cum emplaſtro tenaci. 3. quæ labris leporinis competit. 4. Sutura pellionum quæ inteſtinis competit. 5. gaſtroraphia in peritonæi vulneribus.

SYMPTOMATA febrium. Febrium ſymptomata.

SYNCOPE eſt præceps virium lapſus obſpirituum vitalium affluxum denegatum, vel quod non generentur ob materiæ defectum aut caloris vigorem, vel abſumantur à calore, malignitate, vacuatione, dolore, vel ſuffocantur ab hum. crudo ut in febri ſyncopali, conſternatione, &c.

Diagn. Præcedit pulſus languidus parvus, facies pallet, extrema frigent, ſudor adeſt; in lipothymia ſudor non eſt & manet pulſus. ab uteri ſuffocatione diſtinguitur pulſu. progn. *aph.* 41. *ſ.* 2.

CVRATIO. Spiritus conſerventur. facies irroretur aq. cinam. roſ. vino, acet. in fæminis ſemper fœtida objiciantur, epithemat. hepat. cord. applic. ſaccul. inunctiones. meliſſa vino odorato conſperſa in latere calente calefacta. detur panis vino imbutus. Imprimis frictiones digitorum extremorum etiam utiliſſim. & alia revellentia: decubitus. Tormentilla & reliqua cardiaca &c. ℞. Pom. Citrij n. ij. aq. roſ. affuſa & ſacch. alperſ. coq. ad elect. conſiſt. Si à ſpirituum abſumtione fiat, frictiones, &c. non conveniunt, ſed quies. ſic. ℞. pulv. facch. opt. q. v. humectetur aq. cinam. opt. ut nonnihil fluidum reddatur, cui adde gutt. aliquot ſp. vitriol. ol. cinam. gutt. I v. Caryophyll. g. ij. macis. nuc. moſch. aniſ. ana gutt. iij. detur cum cochleari ad placitum.

TARA-

Dysenteria subsultus à Lipothymia.

Is paroxysmus, vires instaurandi,
ea sustinendi, ips alterandi
& excitandi.

Varietates & virtutis.
Variis & varifera & ~~v~~ cardiaca.
Epicarpia. & epiphyllocarpia.
Epiphyllocarpia.

Ecta paroxysmus, ornamenta ois
à ois : ois fici putamen.
Vasa aer examen sistendi.
fetid. expirandi. acochymia
expurgandi. Dolores urgentes
mitigandi. militas sloquenda.
Malignitas antipsaemaeis sopienda.
ips à ipsis, victu & analepticis
reparandi. Halitus adscendentes,
à spiritibus revellendi. Externa

+ refrigerans ex Sellione Sug. lapide
frigido, mora dinturna, Vfu,
fida.
Vide vers legitimus, & ab Vlcere:
& Spurius, & sine filo.
Cap. de Sententia velementius &,
vt. p. de Sugat.

Variat & cum varietate.
Vermis vncandi Helminthocton;
educendi purgantibus. Intempe;
fig. fomenta, infess, Lotio, vapo,
rosa calfacientes. Fem ficiores
Glysmatibus emoll. educendo. Calu
sua & pia debent remedia. Vt et

Tinea id ficca, Syriasis, & furfu,
racea, vt. ficosa, varicola, fo,
fida. Id contumacie: à Stapis
me. Ca Lenis praxis, acris, Sal
Curatio: Tonsio rasa alutis bri
versalitus, abrasis capillis, lotione
emollitis & ablatis crustis, topicis.
Profacies evellendis filis, remedis
cruciatis & teneliis gerendis.
Vnctus ex axungia Sabinata Sellebo
rata & fab. & hydrargyrata fel. Pla
tis: dd. & suavolentibus.
Balneis argillaceis & Oatis.
Vnctus Emolliens.
Balneis Sabinatis
Lixivio ex fol. mic. Cort. querci &
baca. Juniperi.
Vnctus Sellebratus

Contagiosus sua Sede: ab icterico
alexica a oppilatis.
Remedia medicata Stabilis.
Chirurgia Pharmaceutica.
Vnctus Sellebratus Mercurialis.
Ecchymosis Mercurialis.

TARAXIS. Oculi vitia.

TENESMVS. Causa proxima est res expultricem stimulans. remot. calcul. vesic. medic. acria, vermes, humores salsi, dysenteria, ulcus sphincteris, diuturnus singultus letalis, dysenteria.

CVRATIO. Humor clysteribus molliatur deterg. vacuetur pro varietate humoris. Parva quant. injiciantur: dolor per Topica minuatur. suppositoria utilia. suffitus item. si ab ulcere dysent. curetur suffumigiis.

TESTIVM inflammatio. Inflammatio testium.

THORACIS fistula. Fistula thoracis.

THORACIS hydrops. Hydrops pectoris.

THORACIS vulnus. Vulnus thoracis.

THYMVS. Verruca.

TINEA. Sahafati.

TINNITVS aurium. Causa est materia in aure hærens facultatem movens. plerumque est flatus à variis partibus elevatus.

CVRATIO. Variat. Præmissis generalibus quidam evaporationem è sem. cicutæ in aceto coctæ excipere jubent. Suffitus aceti & vapor itidem aceti cum felle bubulo. quidam panem cal. sp. vini perfusum auri applicant. ol. resolv. sternutatio. ante cœnam & matutino tempore applicentur Topica:

pastis enim caput repletur.

TORMINA a partu. Partus.

TRACHOMA palpebrarum. Palpebrarum trachoma seu scabrities interior.

TREPANON in tribus casibus locum habet. 1. Cum os duram meningem premit. 2. Cum pungit. 3. Si pus colligatur intra Cranium. Nunquam ossi penitus fracto applicetur sed sano; quam proximè tamen ad fracturam.

Locum non habet. 1. In osse ita fracto ut magna ex parte divisum sit: sic enim in meningem premeretur. 2. Sururis. Tum enim duæ vel tres potius terebræ exiguæ utrimque futuræ applicentur. 3. Frontis illa regione quæ prope supercilium est ob cavitatem inter duas laminas. 4. Imis Cranij partibus, ne per foramen cerebrum excidat. 5. Puerorum ossibus sincipitis. 6. Temporibus sed prope ea terebretur. Hyeme & luna plena periculosior terebratio, intumescit enim cerebrum. Fiat intra dies 3. *Pareus* tamen hyeme & æstate post decimum ea usus est. Cum ad diploen pervenit, sanguis effunditur, sed non semper; tenue enim alicubi cranium est.

TREMOR. Causa est facultas motrix p. n. onerata ob sp. animalium vitium vel nervorum vel fibrarum nervosarum in musculo. Si sp. ob inordinatum motum à cerebro non influit, ut in ira, gaudio, terrore, timore.

℞: Scabiosa: ℥ß. ol. ℈ß balsam.
fomenta.
Interna roborantia: Analeptica:
Tabulæ ex ligno Cephal. arom.
Conf. Cephalicæ: gdita: gfect.

℞ De hoc vid. Chirurgica.

" Mots depravats partis voluntary
partis cœcis.

Eruptiones Pruritus Castoreato.
Ft. Lotio, Gclam.
opopan... myrrhatæ, ʒiij

Extr. Belladonnæ.
P:l. Morphiæ ℈. ss. Jacquier.

Distillat. Persicor. Limettæ ℥ pruin. Veris.
Conf. flor. sambuci ℥iij.
Rosarum Oxycrat. ℥iij.
Saccharochylissima Heliotropii.
Conf. anthy ℈ Tragacanthæ.
Syr. L. S. Cephalic. ℥ij.

Balsam. Nervin. Stahl Fallopii.

Tinctura c. Conf. anthy, pror. d. Citrii.
Vanilliæ. Limettæ. Limonis. Limettæ.
Ft. Camphoratæ, Salviæ, Cinnamomi.
Ft. Specifica fl. Tiliæ.

Balnea Neuritica. Vaporaria.
Unctiones Spinæ dorsalis.
Thermæ Aquæ.
Cucurbitula S. Scarifica. Lumbis, cervicis, ℥ spinalis medullæ.
Vulsella Scapulis Cervicalibus Rondelli ℥ Sternalis.

‖ Solvit diaphoresi. Curatur, Mercurius, flamma ocr religuæ: diverticulo per V. S.ᵐ ʒ brachialis: Cucurbitulæ ʒ colli: per purgans: derivando ℞ V. S. hypoglottidis.

‖ prima repellentia, ‖ digerentia ℞ discutientia.

‖ Tentatis pigmentis: magis secare ℞ sanare extremissima ‖.
Siccantia: Otorrhœtes. Cancri. Coralliæ rubr. Oculi. Cancri.
Cathæretica cautis adhibenda, ‖

timore. Hinc enim sp. vitalis varie movetur, & sic deficit generatio sp. animalium; intemp. frig. hum. nervorum vel malignit. ut tremor ab hydrarg.cinnabar. in aurifabris, quem *For.* solo lacte caprill. & nervinis curavit, obstructio, vinum.

CVRATIO. Si à sp. defectu, resumtivis curatur. Si ab hum. cum intemp.curatur generalibus, Topicis. Chymici essentiam melissæ laudant in aq. basilic. exhibitam. balneum. abluantur part. tremulæ aq. pentaphyll. vel decocto granor. junip. cum vino & sponte siccentur, vel aq. infus. artemisiæ. Lotio ex urina propria. Cerevisia salviata. Cibus salvia conditus. Carnes Ciconiarum, Columbarum silvestrium. Cerebrum leporis assatum. Bacc. juniper. infunde per noctem in aq. deinde maneant infusæ in aq. vitæ per dies 8. devorentur gr. 10. quotidie.decoctum Guajaci. *Monav. ep.* 240. post generalia exhibet extract. calami, manus fovet decoct. vini cum salvia & aq. vitæ.

TVMOR. Parulis, inflammatio gingivarum curatur generalibus. Topica fortia nec acria sint, venenum vitandum. si suppuretur, aperiatur scalpello. &c.

Epulis carnis est excrescentia circa dentes molares sæpe cum dolore & febre. sequitur inflammationem. Curatur filo constringendo in dies donec decidat, vel ferro.

TVSSIS. Causa est ~~i. nuda intemp.~~

~~& tum præcesserunt cauſæ procatarcticæ.~~
2. Humor, qualis autem ille ſit, è ſputo ſcitur. catarrhus. 3. Soluta unitas pulmonis. 4. ab inflammat. hepat. lienis, hydrope. 5. fumus, pulvis, acida & plura externa. lumbrici.

CVRATIO. Cauſa tollenda, & tuſſis, ſi à catarrho. curatur ut Catarrhus & expectorantibus. Si à materia tenui cal. acri, poſt generalia refrigerandum, humectandum, incraſſandum. Vtile eſt ſeq. ℞ mellis, butyri ana ʒ ß. pulv. cumin. ʒ j. m. detur cochlear. Foreſtus ſæpe aſthmaticis tabidis præſcripſit. ℞. ſucc. Tuſſilag. ℔ ß. mucag. althæ. extract. cum aq. hord. ʒ j. ſacch. q. ſ. f. eclegma. Suffumigia è fol. bechii & per cannam attracta proſunt. 1. præmiſſis generalibus. 2. ſi abſit febris. 3. viribus conſtantibus. 4. jejuno ventriculo. 5. in minima quantitate prius tentetur. 6. ſi ſequatur diff. reſp. curetur humectantibus. Si periculum ſit ne ex tuſſi rumpatur V. vel æger ſuffocetur vel pulmo erodatur, coacti narcoticis utimur præſertim ſi vigiliæ ſint perpetuæ, ut ſir. de pap. ſuc. de cynogloſſ. *For.* ſeq. ſæpe probavit. ℞. ſucc. petroſel. vulgar. ʒ ß. lactis muliebr. ʒ j. pulv. cumin. ∋ j. propina tepide puero & pectus inunge.

VARICES Curantur chirurgia; ſupra enim & infra venæ ligatura injicitur, poſtquam ea denudata eſt à cute, ſecatur

varix

Diff. sica, Fanida. Vehemens, fe-
rina, Ingeminans. Brevis, diu-
turna. Levis et aq. gra, mediocris,
magna. Continua, intermittens.
Ita in cetera ut intra Horas.

Pulsus ad 1. 2. impetu explicanda.
ad pallii tollendi, à ab Pulsi
Sympathia.
Ita tarda crassa, incidenda et
attenuanda.
Affectus ab humore salso mutii
landa.

Loco papav. Specacuanhæ.
Diahysoscamb.
Conf. Bechic antip. nigrum.

Pd: Pulv Vipe.

Herrn Hirtzers, Pfarrers,
Badens, seinen.

varix & vacuato ſanguine curatur. Verum cum hæc cura difficilis ſit & ſæpe ulcera maligna relinquat, *Hier. Fabric.* ligatam venam non magnis inciſionibus ſed punctionibus exiguis ſecat.# Tandem medic. apponit ex bol. arm. ſang. drac. maſt. cum tragac. in vino granat. vel omphacio macerat. in candelæ formam formatum, quam ſecundum longitudinem varici apponit, ſupra med. arundinem excavatam, quæ med. contineat, ſic enim contabeſcit varix. Si ulcus ſit conjunctum, exſcindendus eſt varix.

VARIOLÆ. Morbilli.

VENENVM perpetuo ea via educatur qua corpus ſubivit. V. S. cathartica locum non habent ante tertium diem. Omnia unctuoſa, ut ol. butyr. &c. conducunt : ſic ol. inunctam partem cauteria non exulcerabunt. Prima cura ſit, ſi per os fuerit aſſumtum, ut evacuetur vomitu procurato per pinguia additis alexipharmacis; ſi ad inteſtina deſcenderit, iidem ſcil. clyſteres pingues injiciantur, vel purgantia dentur ex alexipharm. ſcorſon. citr. acetoſ. agaric. aloë : tandem ſpecifica dentur. Extra ad pulſantes arterias illinitur ol. Caravitæ ſæpius probatum, in quo baſis eſt hyperic. & ſcorpiones. abſcondatur in cadavere calente. ſudorif. Lac in cibo. Si extra ſit communicatum, curetur ad inſtar ſeqq. Sic ſi cantharides, ſublimatum vel tale quid ſumtum ſit, inject. po-

tus, decocta, balnea.

Topica & interna omnia sint refriger. & humectantia.

Si morsus fiat à cane rabido, vulnus ante diem 40 non claudatur, sed quoties ad cicatricem festinat, vitis aut ficulneo cinere apertum servetur. Primo omnium arcta ligatura supra vulnus injiciatur, ne venenum latius serpat: Secundo evocetur: quare sanguis effluat largius, vulnus scarif. & plagis amplificetur, cucurbit. vulneri imponantur; item alia attrahentia, quibus semper adde theriac. succ. hyperic. &c. ut fimus columb. urina, muria; sanguis anatis, aq. vit. vinum, acetum, sal, theriac. antiquissima, sinapi. lavetur cum frictione validissima, allium, cæpe, porrum, ruta, scord. Volatilia dissecta calida: sed nihil æque prodest ac cauterium actuale, modo non altius venenum in corpus subierit. eschara scarif. profund. tollatur non unctuosis; quia transpirationem impediunt. *Fab. ob.* 87. *Cent.* 1. Excellit omnia remedia theriaca antiq. in aq. vitæ soluta. *Par.* quo fortiter lavetur pars & imposita maneant eo imbuta lintea quibus superpone attrahentia. Oxalis, lapat. acut. tritum impositum, succus, decoctum, prodest. His utere donec dolor & color varius cesset & pus laudabile reddatur. 3. Specifica item refrig. intus danda pro re nata. Instar omnium est *Galeno* cineris cancror. fluviat. cochl. 2. cum

cochl.

Morsibz à genuchaz aurium. d insecta
venenosa, terz vigz adfrictio
Catapl: ex Phaseolis cum aceto: H
ex Serpillo: cujz ch Instus. d
Off. interiz exhibeh.

Lingua mutanda. Xeoviζεγν
Vae kakòv thippou. V. apha. X-
ât apaxiz ej Medicina vitz ptêm
Inspexit.
Vulvz dilatandz, si parvus, d
pe 50. aut 60. o. affz ser,
vandz. Virz extrahendz, ne
d interiora serpat: intercipiendz
ch, ne partu diuj morbiosz fe
minet: pessaz Uterea robo,
randz, ne venenu admittant:
detergerumaca exhibenda.
d dilatare attendu dicu, hijs
vis, Vina, Vulva, d sto Ca-
nquelz d Capaki filu.
Curbitula ijz flamu extractorijz
jun, Sanificandz cura ijz affz.
Cautevis actualz, ablata ffa,
ffa, applicitis posteriorijz avis.
Metasyncritici appositis, si
nafsuis, dropacisz.
Uteriar. et Stirpid. vinu sol.
Diadrachmum Gali c. ol. scorp.
Hirudines to affo admotz.
Ligaturz interjicientes.
Defensivi dictz ad, tangentibz
ex ten. frig. halo, malacis,
fo. acacij, Sematicis &c.
c. alb. ovj. ol. ros. Myrtin.
Don. mastichin. myrtillorz.
V. Ist, Insessa, d Jaz ex Off.

ad Angelicz.
Gentianz.
Heliosz.
Salvijz.
Scordij.
Betonicz.
Dictamnij Cret.
Cal. arom.

Exh. Sedon.
Cal. arom.
Sanicl.
Myrtil.
Hen. Dianthi rog.
Mirtillorz.
Anthol. Cameracu Hofz.
Nuc. pz gland.

Morsibz à genuchaz aurium. d insecta venenosa, terz vigz adfrictio: Cataplz ex Phaseolis cum aceto: H ex Serpillo: cujz ch Instus. d Off. interiz exhibeh.

V. Ist. Ist Instus, pestorius Clysma IV. Sect. VI. IV. c. IX.

Purgas is accessimus.

Sternutatio, qua dubie fidz Laudat Cap. Hippo. V. apha. XXVII.

Ol. Scorpion, et viperae ipsi.
Elix Ornithum.
Instill. de vipe.

Ventriculi dolor. vid. Cardialgia

---

cochl. uno pulv. rad. gentianæ & vino meraco. Cauteria poſt 3. vel 7. diem locum non habent. Vtiliſſimè in loco affecto fonticulus excitatur.

Si ad interiora penetravit, fortiter purgandum per elleborum, etiam antimon. ſec. *Paræum*. Omnes pulſus quibuſvis 6 horis illinantur ol. Caravitæ, quòd ol. M. ducis Hetruriæ vocant, vel ol. ſcorpionis Matthioli. Plinius ſupra omnia rad. cynorrhodi laudat. allium comedatur. ſudorifera utiliſſima. Viſcum querc. lign. efficaciſſimum ſumtum & applicatum. Si rabies immineat, ſinapiſmi brachiis femoribus applicentur, antidota dupla doſi dentur etiam invitis. Somnus eſt fugiendus uſque dum veneni vires ſint fractæ, ad ſatietatem edat. Qui ad hydrophobiam pervenerunt, deſperati ſunt, niſi ſeipſos in ſpeculo agnoſcant. Canis rabidus conſpecta aqua horret eam, reliqui canes fugiunt, capti ei blandiuntur; panem ſanie vulneris imbutum ſi canis famelicus edere recuſet & odorari, canis rabidus fuit.

VENEREA lues. Lues venerea.

VENTRICVLI ardor. Ardor ventriculi.

VENTRICVLI inflammatio. Inflammatio ventriculi.

VENTRICVLI inflatio. Inflatio ventriculi.

VENTRICVLI intemperies frigida.

Intemperies frigida ventriculi.

VENTRICVLI ulcus. Vlcus ventriculi.

VENTRIS conſtipatio. Alvus ſuppreſſa.

VENTRIS tormina infantium. Infantium ventris tormina.

VERMES infantium. Infantium lumbrici.

VERMES. [Pediculos necat lotio è rebus amaris. Subucula croco infecta & aliquandiu geſtata. ~~mire~~ lotio ex aq. lavendulæ. cyrones tollit panis hordeac. & chartæ ana combuſtæ, adipe urſ. exceptæ.]

Lumbrici vel teretes ſunt vel alcarides vel lati. hi vel cucurbitini vel minus cucurbitini. Signa teretium ſunt dolor & punctiones graves, latorum dolor obſcurus, reliqua ſigna communia ſunt.

Curantur necantibus primo ut corallina ad ʒ j. in pulv. ſem. tenacet. rad. primul. veris, abſinth. marrub. ſem. citri. angel. amygd. amar. {pulvis Lumbricorum ſuſpectus eſt Tabernæmontano} aq. decoct. gram. CC. raſ. ebor. ſucc. limon. plantag. portul. endiv. aceto. Infantibus datur aq. gramin. ʒ j. cum ſir. acet. citri. vel grana aliquot ſalis ori immittuntur. ſp. vitrioli. Elixir propr. Lati validiora requirunt ut nuces jugl. copioſas imprimis rad. filicis, cujus pulv. infanti datur ad ʒ ß, natu majoribus ʒ j. ʒ ij. Theriac. ſuc. limon.

Ventriculj Vulny.

Diathesis lethifera VI. apta. XIIX.
Stupiens. Supremi officij sy-
ptoms, Amissi.
Casus difficillima deos rara,
Curae accep. Ager tus nos deserendy.

V. S. si vires ferant.
Hydrocephalus Cacochymiagoga.
Vulny curandus, relicto foramine
a puris expurgacey. Ol. Hyp
Croc. Vulnerar. illinendy,
Ol. Ol. Mastichin. Momordicy,
Nicotiana. Unct. de Betonica,
Vulnerar. Empl. Richij
Crollij
Excitanda: Sp. vol. Liq.
mynsichi.
Cordiar.
Gravidi. aud.
Corall.

Conf. ros. rub.
aromat. diacodion.
Syrupi hi majoris.
Diacydon. S. Hyac.

Lotiones Vulnerarij ex Distato. Centaurij
rad. Tormentill. Bistort. Ophioglos.
Hyssopi, Pyrola, Saniculae, Alchymillae,
agrimoniae, Mastick.

---

11 Sed incertus, ostendunt Exercitia de Vermiculis Capillaribus infantum.

polycheyth D. H. d M.
fil. Catholic. zetteb. Vidmanj.
Eleth Alexandrinj. Trajanj Petronij.
è H. Pelzj Castellj.
fil. pertil. Vladislai Reg. Hung.
Scordiae G. Marcellinj.

+ Sanctis, Sebastiano, Colonia,
Hilde.
Syr. + Cicloris c. Sal.
Diaseor Hud.
Hiera diacolocynthidor.
Eleth è Sc Rosar.
Ech. chal: Comp.
Mod. alexandrij.
Fil. Rufi, et de O.
V. D. vermibz inimica ap. D. D. è
Bruno, et Sebiz, Eucha. H.
Vstemiz & pia Hedwigis per
alias trajecti cor. fil.

Praeconij.
Specialis Lumbricos.
Buchelinj,
Elaphocerothj.
Fe. pertil. Eleth. Beatj.
Eligii Lantochyloth Hesp.
Montanj.
Fe. Ravendath.
Oath Rolfinaj.
Oath Sue Hau
lethi Vranorian
Pel. Balsamicj Barberinj.
Felicina citatis Geophyllis.

Externa: ol. Colocynthid.
ricinin.
philosophor.
aurin.
Vngth de arthanita.
ol. S. Justinj Patavinor.
ad. felle
et urin.

limon. ſoluta. hiera. Miſceri autem hic dulcia debent, ne averſentur ea lumbrici, & ſimul infra dulcia, ut eo proliciantur, injicienda. Necati educantur præſertim per diaturbit cum rhabarb. in rotul. Sebeſten decocto, ſir. perſicor. aloë, agaric. aſcarides ſuppoſitoriis tolluntur. *For.* ventrem ſeq. inunxit ℞. ol. ovor. lilior. fell. bubul. ſuc. cæp. aſſat. butyr. recen. ana ʒ ij. m. exhibuit ſeq. ℞. aloes ʒ ß. Corall. rubri vel diatragac. frig. gr. X. cum aq. ſcabioſ. f. pil. 3. ne aloe calorem excitet, ſuperſorbeat cochlear ſir. acetoſ. citri. Exhibuit puero trimo plus quam ℈ j. CC. uſti. quæ extra applicantur ut fel. &c. non ventriculo apponantur. *Heurn.* ſeq. pro pueris. ℞. ſir. de cichor. cum rhabarb. à ʒ ij. ad ℥ ß. aq. gram. ℥ j. pro una alternis diebus. *For.* curavit puerum per annum miſerè afflictum decoct. abſinth. & centaur. min. alij exhibuit ſucci granat. cochl. unum ol. oliv. coch. dimid. M. arcanum eſt reginæ Galliæ. Idem ſeq. pro una puerperæ deliræ febricitanti dedit. ℞. CC. uſt. ʒ ß. ſem. Zedoar. portul. ana ℈ ß. m. pro pueris CC. uſtum paſſulis enucleatis includatur. Ad aſcarides facit experimentum Aetij, ſuppoſitorium ſc. formatum è carne veteri ſalita, pinguedine deraſa.

VERMICVLI capillos decurtantes. Pili.

VERRVCA, clavus, condyloma, cum

ſc. ruga cutis indureſcit. Thymus ſcil. condyloma cum anguſta baſi & ſuperficie ampla, colore ſubrubro, thymi ſ. referens. Ficus, ſycoſis, eſt thymus magnus. Criſta è præpoſtera venere. ſæpè ſunt malignæ.

CAVSA. Putatur eſſe humor pit. mel. *Plater.* cenſet eſſe hum. alîmentarium cutis & cuticulæ. Contagioſæ ſæpè ſunt verrucæ.

CVRATIO. Per medic. ut *Fallop.* commendat fol. vel ſucc. ſalicis fol. portulac. tritam ſuo ſucco madentem. Item fol. & ſ. calendulæ. ſcrofulariam. rad. ari. cyclam. chelidonij rec. Nigella cum urina, liquor qui è ſ. verbaſc. inſolatis ſponte effluit in vitro. Cichor. verruc. ſuccus è dente leonis promanans, fortiora ſunt lac Tithym. exſcinduntur vel vinculo, vel cauterio, vel ferro. *Schreckv.* R. ciner. fol. jugl. comb. allium & ſevum M. & luna decreſcente applica. alij ſtercus gallinarum, alij liq. Teſtud. lign. querc. ard. applicant.

VERTEBRARVM luxatio. Luxatio vertebrarum.

VERTIGO eſt cum omnia in gyrum agi videntur. Scotoma eſt cum præterea tenebricoſa fit viſio. [Cur proſpicientes ex alto vertigine corripiantur, cauſa naturalis eſt, quod ex rei metuendæ inſpectione ſp. diffundantur, à terrore vero introtrahantur, unde motus contrarius.] læditur primariò ſenſus communis & imaginatio. Deog. ad delirij
curationem, & ſimilia hæc imaginare. CAV-

Conglomerata Uteri simpl. et que
Contumacia mala, fortiora
requirit, et caute adhibenda
vid. Bruno.

Cura per emolliencia, exsiccantia,
roborantia, evacuantia, exsciendentia,
extrahentia.

De Chirurgia vid. to Index in Chi.

Cicatrices vernicarum in oculis et
sem. eius. ad Zy.

Cicer Solisq. c. ♃ to
radefi.
portulaca.
Caulis.
Sonchi et Tarax. lactes.

Cichorij.
Semperviv. maj. c. Oleo Rosar.
Agrimonia c. ♃ Rosa.
Sem. basilici Hyssopi. Herb Heliotropij.

Cichorij.
ol. Chrysomelon.
Lac Euphorbij.
Cicuta.
Folia vini rubri.
Fl. de Cort. Solisq.

Diffac in vino coctis.
Cicer verbasci: et portulacae.
Cimex pedis gallinacei, adiectus.
Cinis liniae Salis: et Cochleae.
Vid. Cathartica ag. I. Jac-a
Bruno de vitra med.

Cinnamomata Nuces Moschatae Dentis
S. St. Jacques, vertigo, epilepsia,
epil. apopl. phrenit. Coma, Catalepsis, melancholia.

formice Balsamij, & de gland. Ch. ...
uenij natorum ex Caryophyll. ...
l. Cap. Esdr. l. & C. 11. Conf. l.

Fit & à quibusdam ebrietas vertigo, ut
ex lenticula.

Curas Laurentij Duglas: Paraeysem.
lij de Restitutione.

Restitutio Elixatij.
Quadrilibrij de Fonte, remedijs.

Ut aurea Alex.ª vt Electo ex vino
& vnctte aromatico.
vt balsamo or. ex fruct. H. Boni;
Stij Empir. MS.

Ottaui Girolami Spachio, ga parus
aefert.
Inter purgantia vt Sabij Catholicum
Rhodij: Salut Fuent.

Inter alterantia: Cassalpina Disentien
tia Praestantissima et Specifica.

Hiera Diacolocynthidos
Vomitoria lenitora, Fonseca.
11. Conf. LXIII.

Lien affij.
Cardui Santi.
Eborensis Antithoui.
Bombycis.
Galangolaccensis.

CAUSA. vertig. est circulatio spirituum animalium à vapore tenui; Scotoma à crasso. Hæret causa antecedens vel in cerebro & ejus affecti sunt indicia, vel in hepate, liene, utero, hypochondriis & affectorum sunt signa; vel à causa externa.

Progn. Quibus in vertigine viridis aut purpureus color obversatur, ad epilepsiam; quibus ater, ad apoplexiam; quibus rubens ad maniam magis proni censentur.

CVRATIO. In paroxysmo quiescat & si à parte inferiore causa adscendat, revellendum per frictiones. facies vino aspergenda. glandes, clysteres indantur. odoramenta naribus objicienda cal. vel frig. nares fricentur ol. succin. &c. temporibus affricetur aq. rorism. fronti serpillum, palatum Theriaca inungitur. V. S. etiam sed cautè concedit *Senn.* Si apoplexia sit in metu, ad præserv. valet sem. carvi maceratum in vino & postea siccatum, si quotidie cochlear dimidium diu masticetur sub horam decubitus, tandemque deglutiatur.

Extra paroxysmum V. secetur, ut cephalica. Curatur ut cephalalgia generalibus, Topicis. Commendatur auricula ursi. Scorsoneræ aq. vel extractum. Bombyx siccatus vertici inspergitur. ℞. sterc. pavonis ~~masculi, si mas, fœminæ si fœm.~~ laboret, ʒ j. infundatur per noctem in vino albo. trajiciatur per linteum, exhibe vertiginoso à novilunio

Embrock Hermaby.

ad plenilunium. si ab alia parte per consensum fiat, humor præparatus vacuandus, vapor intercipiendus ♯, revellendus ♯, discutiendus ♯, roborandum. ♯

VESICÆ calculus. Calculus vesicæ.
VESICÆ paralysis. Paralysis vesicæ.
VESICÆ ulcus. Vlcus vesicæ.
VIGILIÆ infantium. Infantium vigiliæ.

VLCVS est solutio continui à re exedente cum partium quarundam ablatione. differunt forma: aliud circulare est, &c. subjecto, causa.

Diagn. Causa suis signis dignoscitur. Cum sanies cruda, tenuis, copiosa effluit cum dolore, pruritu, principium est. in incremento melius fit pus & parcius, &c. reliqua si imminuantur, declinatio est.

Progn. Pus album seu potius cinereum lęve æquale, bonum. vid. *aph.* 45.4. *s.* 6. *aph.* 65. 67.2. 21. *s.* 7.

CVRATIO. Humor vacuandus per generalia. applicanda digestiva. tutius tamen etiam in principio detergentia miscentur digestivis inæqualiter ut tereb. suc. apij cum vitell. ov. ol. ros. croc. Pars affecta observanda ut in phlegmone. Si nimium detergatur ulcus, fit aridum, caro consumitur, labia rubent, mordicatio sentitur. Si siccius fiat, color adsit bonus, ex vlcere nec sanies effluat nec pus, sarcoticis utendum. quo purius evadit

Conf. Al. tunic. d auth. Ciacola.

القهوة

Eff. Anthos thym.
Mag. Pe
Suaveol.
Celidonite sive Pseudopal.

Stibis Drysion.
Xylopyrion.

حجر الحيه وياقوت بعصارة العليق
حجر المرارة الثور

Conf. antiepileptica Fernel. Reg. Rom.
Liq. Sebum Spleenomelanteric.
v. Cerasa. c. Bestond. Oaz. d Ulcer.
v. Coerule. tereb. absinthiac.
ligatur.
Sarificae, in arbitrio, ploe.
nig. mist post aures.
+ Diaphoretic.
# Cephalic. & Cardiac.

Vesicae inflamao. v. Infl. vesic.

Scabies. v. Vlc: in rao u. gradu tuis differt.

Fistula. v. Vlc: d: fistula.

Vibices, plyg. vid. Ecchymoma.

Vitiligo. vid. Elephantiasis.

Interna siccantia gferunt ets jus
in meliceria bubones.
Ossa Cranian. Pta: ex pts Everardi à Pinu ap. A. Gassen.
Eff. Veronic.
Mag. Pi.
Theriaca Jambicina Salis.

Phlegma ℞.
Balsameum Apostolorum.

Succi Jacearum ℥ss
Decoct. de Ae de Cichor.
Turbith ℥j.
Diagrid. albi ℥ss—

℞ Rad. Hermodactil. ℥j.
Cremobalsamum. ℥j.
Confect. Cord. de gemm. ℥ss.

Cerussa Diachalciteos.
Diapompholygos.
Empl. de Minio Vigonis.
Divini Fernelii.
Stichis Rolli.
Diac Rufi.
Cerus de gratia Dei.
Ol. terebinth. c. Sacch. ℥j.
Lotionis ℥ss Hydrargyri.
Unct. ex Ol. Scrophular. ℥ Nicot.
Tetrapharmac Schroderi, ana ℥ss
et ol. Nenufarin. ℥ss
Ung fere ℥ Unct. de Gratia
Dei. O. P. G. V.
Cerussa cocta Nic: Agerii,
Unct. Tegulinum A.
Sambuc. sive Oth.
Unct. pistoriae ℥ Oth.

dit ulcus, eo mitius detergendum. Cicatrix pulv. vel empl. epuloticis inducitur, non vero ſub forma humida.

Si intemperies, e. g. ſicca adſit, neglecto tamdiu ulcere ſiccitas curetur commodiſſimè per fotum hydrelæi tep. & mollientibus. Si intemperies ſit cum materia, quod è tumore, dolore & copia excrementorum ſcitur, materia ante omnia vacuanda, partes roborandæ, humor revellendus, intercipiendus, repellendus. repellunt optimè fonticuli in parte oppoſita excitati. Imo abſque his ſæpe ulcera non curantur, & antiqua ulcera claudi non poſſunt, niſi in oppoſito fiat fonticulus. Ori ulceris imponantur ſarcotica, citra tamen mordicationem, fortiora quam alias. ambitus repellentibus abluatur, vel reſolvente cataplaſmate. ſæpius varianda medicamenta. *Guido* per laminam plumbeam cicatricem inducit.

Si ſordidum ſit, ſordes copioſæ viſcidæ apparent. Si putridum & quidem à medic. debiliori, fœtor adeſt & ulcus albidum apparet. Si exedens, pruritus, dolor adeſt & quotidie augeſcit. Curatur per Generalia & Topica detergentia ut ſp. vini.

Excreſcentia carnea in ulceribus fit vel à ſanguine nimio, vel quod ſarcotica non ſatis exſiccantia ſint adhibita. Si prius, proba eſt caro; ſi poſterius, laxa & ſpongioſa. Si prius, curatur inedia, &c. poſterius magis ſiccanti-

bus ut epuloticis & ſepticis. ſine dolore utilis eſt aqua viridis ſæpe à *Senn.* decantata: ut ℞. aluminis crudi. virid. æris ana ʒ ij. coq. in vini ℥ XVIII. ad quartæ part. conſumt. Colatur. deinde ℞. Camphoræ ʒ j. ſolv. in ſp. vini ℥ j. & prioribus adde.

Si ulcus ſit cum ambitu duro, quæ durities non cedat mollientibus, commodiſſimè caro dura & livida ad carnem vivam uſque exſcinditur; vel ſcarif. fieri poteſt & adhiberi fortia detergentia.

Si ulcus ſit cum tumore, non ſolum cuticulam ſed & carnem exedens, Phagedæna dicitur. fit ab humore acri, non tam tenui ac in herpete, nec tam craſſo ut in cancro. Curatur ut ulcus cum tum. intemp. ulcus illud peſſimè ter vel 4. de die obligatur, niſi fiat ob dolorem ſummum.

Sit ulcus in interiore crure paulo ſupra malleolum, dolore magno excrucians, cavum, putridum, cum oſſis carie conjunctum, circulare, labris calloſis & tumentibus, inflammatione & varicibus cinctum. Id ſi curandum proponatur, præmiſſis generalibus, omnium primo dolorem ſedabis ſublata ejus cauſa per malactica, refriger. narcotica. Sic ſedato dolore cum inflamm. caries eluatur. Interim obiter ulceri figuram angularem induces, calloſam duritiem exſcindes, putredinem corriges, oſſium deſquammationi conſules, purgatum ulcus carne implebis & cicatrice

Ἰσχυρὸν ἐστὶ τὸ ἐξ ἑνὸς αἰτίου πολλὰ ἀποτελούμενον. οἷον βόδιον. κοίλωμα. ἀγγεῖον. αὐλάκωμα ἢ ἔγκαυμα.

Caveudy, abscidy & effr.
Avertendy, affluxy: dolor anodynis
mitigandy; retergendy, siccandy,
mundificandy, consolidandy.
V. S. scarificas, frictiones. Enemata,
fotiones, balnea, hydatis injectio,
&c.
Topica repellentia
Inter mundificantia mel, Sacchar.
℞ Cicer. Sodq.
Sp. è rof. sicc.
Lutia ℞.
℔j ℥ß. ℞ß.
Sief de ℥ß.
℞. ℥ß.
Mag. ℈. liß.
Flor ℥j Dej Plin.

catrice obduces. *Par. Quercet.* ad miraculum laudat Sacch. Saturni; pot. vulnerariæ.

VLCVS Oculi visu deprehenditur & si in cornea subsistat, præcessit pustula alba, ulcusculum, cicatrix fit alba; si in adnata, rubra. Curatur generalibus, revellentibus, intercipientibus tempori admotis, anodynis, detergentibus, ut sacch. mel. croc. myrrh. thure; aq. è fragor. tr. parr. & sacch. una destill. cum per octiduum in B. digesta fuerint, ruta, marrub. aq. euphrag. infusio Sarcocoll. aloes, &c. in linteo ligat. & expressorum. ℞. thur. mastich. ana ℈ j. myrrh. aloes sicc. ana ʒ ß. tut. præp. ʒ j. sarcocoll. nutrit. ʒ ß. pulveris. excipiantur ovi alb. & succ. cydon. f. Troch. solvendi in aq. fœn. Visum restaurantia interna dentur, ut ℞. Conserv. euphrag. ℥ j ß. betonic. roriſm. ana ℥ j. rad. enul. condit. ʒ ij. fœnic. cond. ℥ ß. extract. sem. rut. ℈ ß essent. extract. vel sp. rad. valerian. ℈ ß. siler. montan. ʒ j. sal. rut. verben. ana ℈ ß. cum sir. de beton. vel stæchad. f. el. sumat cubitum iturus. Sal è pulv. euphrag. cibis inspergatur. per nares quendam vidisse ob malè curatum ulcus narrat *Mona ep.* 75. Vitriol. paucum in multa aq. ros. solutum est instar omnium detergentium. *For.* præmisso lenitivo purgat è fœn. euph. fol. sen. pil. luc. ad ʒ j. V. S. cucurb. scarif. fotus è malv. m. ij. fl. ros. rub. ʒ j ß. sem. cydon. ʒ j ß. hord. mund. p. j. coq. in ℥ x. aq. f. addee

aq. malv. rof. ana ʒʃ ß fove bis in die. Collyr. ſeq. inſtillavit, ℞. troch. coll. alb. Rhaſ. ſ. opio ♃ ij. aq. roſ. ʒʃ ij. m. inſtilletur. ſuper inducatur linteum duplex ſup. fotu imbutum. poſtea fotui infuſum fuit ſem. fœnigr. exactiſſ. loti ʒ ij ß cidon. ʒ j. in nodulo. poſt addita eſt collyrio aq. euphrag. ʒʃ ß. poſtea eidem collyrio parum ſarcocoll. nutrit. in lacte muliebri: mox & aliquid thuris, croci cum muc. ſem. fænigr. Initio in latere oppoſito dormiat æger dum pus erumpit in affecto. *Venatius* ob malè curatum oculi ulcus Padua excedere coactus fuit.

VLCVS caruncułæ lacrimalis ſ. ægilops. *For.* ob periculum non libenter ſuſcipit ejus curationem." Si exulcerata nondum fuerit, poſt generalia repellentibus opus eſt; poſt adde diſcutient. ut nuc. rancidam. Si ſuppuretur, maturè aperiatur, detergeatur. æs virid. per ſe ſecretum. Si ſit cum carie oſſis, cauterio opus eſt. *Fab.* ſetonibus eas curavit.

VLCVS auris. Signa ſunt dolor, ardor, punctio gravis in aure, ſanies. hæc aliquando à cerebro inflammato excernitur quod facilè ſcitur. aliquando, ut in pueris, à cerebri impuritate abſque apoſtemate in venis cerebri & aurium viis ſanies generatur & dolor non adeſt & pus ſemel exhauſtum, denuo coacervatur.

CVRATIO per generalia. Topica detergentia:

vt ſ phlegmone ſjmcha D, vt ſuc.lla.
Jude curah vt ut phlegmone, vt
ut abſceſſ, vt ut fiſtula.
fiſtula ſ egilopes ſeſt, vid. ſ
Chirurgicis.

Orificiũ dilatato furunda, ſanies
expiemenda, vleg tegendꝫ, d
mundandꝫ ſyringiſmo, H ſary
cotica, d denꝫ epulotica adhibenda.

Catochymia tollj expurganda.

Scarificados y Scapulas, d fricciones
diversarum ad debilitat. S. Simonij

Cruster emollientia: Vitr, olea-
ti, solidantia, d epithi.
Ol. myrtinum cruffatis Simonij.
Mel Libano admiatis ejd.
Emp. Apostatilla Hucherij c. Ze opio,
gloss, P. Asselin.

gentia, ut ſuc. betæ. marrub. ol. amygd. amar. ſuc. cæpar. cum rhodomelit. ſeu mell. roſ. inungitur latus ung. alabaſtr. ſuc. ari, bryon. pus exiens lana eſt amovendum, aq. mulſa, poſt vino, tandem oxymel. ſpecillum lana involvatur. dolor tollitur partic. thuris infuſa in lacte donec diſſolvatur, guttatim immiſſa. Si adſit plethora, necdum ex ulcere fluat ſanies, urgente dolore V. S. convenit. Gal. ad antiqua ulcera utitur ferri ſcoria pulv. cum aceto trita & ſepties ſiccata, tandem cum aceto ad mellis conſiſtentiam cocta, pus pyulco eliciatur ni ſponte erumpat.

VLCVS narium, ſi recens ſit nec fœteat, facilè curatur. Si antiquum & fœtidum valde, ozæna vocatur, quæ ſuſpicionem cancri ſæpè facit, difficillime curatur, cruſtas habet.

CVRATIO præmiſſis generalibus etiam decocto Guajaci & pot. vulneraria, Topica ſint adſtringentia & diſcutientia mixta. Caput quovis modo ſiccandum. Primo omnium cruſta removeatur per vaporem aq. tepidæ, adip. butyr. loto cum aq. roſ. cruſtæ ſternutatione ejiciuntur. poſtea convenit omphac. cum melle, ſuc. marrub. calaminth, ſuc. mali punici in vaſe æneo coctus, myrrh. alum. *Rondel.* Ozænas curavit, quas nec Galli nec Itali curare poterant, candelarum è cera rubra accenſarum fumo naribus loco

angusto excepto. nasturt. suc. cum alum. commendat Celsus. Calaminthæ suc. vel pulv. Gal. quidam seq. laudant.

℞. ros. rub. myrtill. cal. arom. angelic. gentian. mac. Caryophyll. ana 3 ß. camph. ambr. ana gr. iv. mosch. gr. 6. f. pulv. Si frustra, Sal ammon. cum aceto.

VLCVS Ventriculi Curatur generalibus ut V. S. lenitivis. Vomitus exitialis. esculentis lenibus. detergit mel. crudum; cum glutinandum, addatur Tragacant. cum decoct. adstring. sine acrimonia. Cibus sit liquidus. decoct. ficus. dactyl. prun. passul. lact. vitell. ov. potus hydromel. potio vulneraria.

VLCVS vesicæ [etiam à cantharidibus fit. *Senn.* tamen, licet centies omnibus partibus applicaverit, nunquam id observavit.] Signa sunt dolor in pube quoties mingit æger. pus. sanguis. tenesmus. utinæ diff. priapismus. pus magis est tenax & viscosum quam pus vesicæ. Curatur temperatione humorum per refrig. & humect. post detergendum per interna & injectiones: imprimis utiles sunt Trochisc. Gordon. q. vide. Conserv. ros. bol. arm. lac pro glutinat. potus vuln.

VLCVS renum. Vrina sine impedimento redditur, pus urinæ est permixtum, minus fœtet. vide *aph.* 76. 77. 81. *s.* 4. Curatur ut ulcus vesicæ. Serum lactis; f. emul-

Ag. Aristolochiæ, plantag. fol.
querc, nicotianæ. Oliv. c. o°. terebb.
Ol. Succi, momordic. Unct. dia-
thalict. Diapompholygos, de hitia,
Nicotian. Joubertii, Schiff. capitis
rotb. Cathaplasmata M. Schiffi.

Ol. Croci & Vitellinæ.
Unct. rosat. c. ol. ovor. & ℔ß
Ol. Succini Aphrodis. c. Lapid. ℔ß
Cruentæ Ictione c. ▽ &

Signa: dolor lancinans, inf
ab esu acris, gandes, e
inappetentia, nisi fœtid
nisi purulenta, cruenta,
oris, febris lenta, et exu
lantes præsertim.

Regiendo ex internis, et externis, & removendo: & mundificando, cavitates implendo, et cicatrices inducendo.

Sup. Aloes c. ocho Hiera Pi
& gamarolibon aa ℔ß. Sacchar.
Sacchar.

Detergentia: Sup. Veronica, betonica. Scabiosa. Card. benedict. agrimonia. Chamædrys. de Cichorio. & absinthii.

Sup. Viol.
Fumar.
Syrupi detergentis & Lact. Capilo
tajneto & cum Aq. Scabiosæ
Decoctum ejusdem cum Absinthii
Balnea semicupia, aperta,
aquata.

Detergentia exteriora: Cucumis, Cichorii, glycyrrhizæ. Emul. S. pinear. amygd. amar. Ulcera præ abundantia Atræ ipsa & sanat.

Cauterizata sunt ea toto corpore expurganda. Dolor Ulcera mitigandi.

Semina Myrobalani Chebuli mediocr

Ea externe: & corrodunt, aeria, mordacia, mundificantia, aliunta: & stimulant & penetrant, venas aperiunt. Inducunt in & flammas, suppurant, abscess

Mors subitus.

℞: inflamm[atio] gravis, ℥ ij sang[uinis]
missa. Fumus acris hi[e]m[alis], crudus, frig. subtilis,
sicc[us], acre. Inferius d[e]fectus
malignitas.

Progn. Si magnus fit, periculosus
sequitur ad[ustio] sanguinis, delirium,
cachexia, hydrops, atrophia.

Curatio tentanda: Mundificantibus
cachectica, expurgantibus,
tutis, diaphoreticis, refrigerantibus
diureticis: Cibis digestibilibus
℞: S: Santt, Rad. Cichor.
Scabios.
Succ. absinthii cum melle.
Hydromeli Scordii, Veronicati, Betonicati, Rosati.
℞ Syr. corticum Cit. Absinthii
cichorii cum gentian. Quercet.

Curas tentanda abstergentibus
& glutinantibus.

Vlcus mamarum. Vid. Gynæca.

Vlcus Vretra.

Ca. Sanes & pus virulentum: Vina
nonda: calidis dulcib & alb:
Tuberum Decoct. Hordei cum
Jmpositas Vesic. muliebrib & fuie lue.
Cura. Fà carunculæ, excrescens
Calli: ## Jusc. la gallinacea
hoch. alchekengi, Cepulæ glan.
& rad. glycyrrhizæ medicata.
A. Gasser. obs. XXXVII.
Vlcus primò ichorosum, deinde
sanies, tandem pus. Fistulosum.
& anodyna.
Injectiones pareyoricæ & laudanicæ
Fotus emolliens.
& resolvens anodyna: & diacodion.
Injectiones & fistulæ cum sticticis
& detergentibus. Veronic. Cicer.
Vlcus penis.
Cura eadem, ut Vretræ.
Quietudo Venereorum:
Catharsis. Antiscorbutica.
Diaphoretica.

Vl. le Vlcer. & Vulner. Cirurgica.

sio cum sem. 4. frig. lac. Si pus parcius exeat, glutina. pot. vulneraria.

VVLNVS est soluta unitas in parte molli à re secante, in quo à pure nihil eroditur.

Progn. Plenilunio inflicta, item syncipiti, periculosiora, quod hum. abundent & decubitus saniem detineat. Quod vulnus aliquando curatum est, id absolutè lethale dici non debet, vel quod per Symptomata, quæ aliquando adsunt, interficit. Nec illa quæ diu non curantur & tandem in alium affectum lethalem transeunt ut vulnus pulm. in phthisin. Illa sunt lethalia absolutè, quæ intra horas vel dies interimunt, nec ulla arte sanari possunt. Insanabilia vero illa sunt, quæ sanari non possunt, æger tamen ad annos etiam supersse potest. Spiritus vel suffocantur subito vel dissipantur. Vulnera spinalis medullæ lethalia. Vidit *Senn.* lanium, qui boves non percutiebat, sed exiguo cultello, ubi caput vertebris conjungitur, in spin. medull. adegit felicissimè. Facilius curantur verè. In vulneribus & dies Critici observandi; Quosdam vigesimo die, non ante, symptomata invasere. Circulare vulnus pejus. si febris ante 7. diem oriatur, à pure est nec ita terreat. Si post 7. à putredine est & periculosa. Febris ab erysipelate minus est terrifica. Frigus, Venus, ira, lætitia nimia, timor, lethalia. Lethales sunt per linguam.

extuberantes puſtulæ ex acris ſaniei per palati foramen in linguam ſtillicidio & oppoſitæ partis convulſio.

CVR. 1. Extranea eximantur. 2. diſtracta conjungantur. 3. coaleſcant. 4. partis robur ſervetur. 5. Symptomata tollantur. Primo ergo ſanguis fluat liberaliter, pili abradantur, corpuſcula aliena vino elue; grumi eximendi, ſed non omnes primo apparatu, ſi metus ſit hæmorrhagiæ. armorum particulæ eximantur niſi metus acerbi doloris vel hæmorrhagiæ obſtet: ſic enim ſatius eſt rem omnem naturæ per aliquot dies committere. Si ſpes nulla ſit, ægrum extracto telo victurum, non extrahat chirurgus, ne homicidii famam acquirat. Quidam enim ut in vulnere cerębri, cordis, telo relicto per diem vivunt, extracto ſtatim exſpirant. Vt extrahatur res aliena, æger eo ſitu relinquatur, quo erat cum vulneraretur. Extrahitur vel digitis vel roſtris cum vel ſine ſectione, vel ex oppoſito facta ſectione eò expellitur. *Fab. obſ.* 88. *Cent.* 1. habet inſtrumenta quibus glandes ſine dolore eximuntur. Si feſtuca carni impacta eximi nequeat, med. eximitur è pice galb. ſagap. ammon. reſ. pini, diptam. Cret. ariſt. rot. vel totum negotium naturæ committitur. Collocetur molliter, æqualiter quantum per dolorem licet, ea forma qua volumus permanere partem. Niſi vaſtum fuerit, non adhi-

Vtery adfect. vñ. lit. 4pijs: dij Gynecior: dap. Schir
R. MS.

Vrina Incontinentia.

Cæ.

Chiac.

Dilty fic. pessular. d glycyrrhiza.

adhibeatur ſutura. Sutura per glutinum conveniens eſt : ſed ante 4. horas non firmiter adhæreſcit. *Senn.* hoc emplaſtro utitur. ℞ bol. arm. maſt. ſanguinis dr. thur. ana ℈ j. gum. Tacamah. ʒ ij. f. empl. pro glutino. *C. Magatus* non ſuit, ſed tam longa facit emplaſtra ; eaque plura & tenuia , ut una parte adhærente , alteram quoque ſupra vulnus ad partem oppoſitam applicet. Vtinam huic ſuturæ adſueſcerent chirurgi. Prima ſpecies ſuturæ interſciſſa vocatur. Turundæ med. deferunt & vulnera aperta ſervant. Si in fundo vulneris nervus ſit, eum Turunda non attingat. *Fab. obſ. 76.* ubi anguſtum eſt vulnus, Turundas tenuiores ob flexilitatem non inſerendas eſſe ait. Ipſe filum atgenteum turunda obvolvit & digeſtivo inungit. *obſ.* 83. & 84. maxime attendendum eſſe ait, an vulnus unum ſit an reduplicatum , ita ut extra unum interius ſit bifidum. Poſt ſi pars carnoſa laboret , pus movendum per digeſtiva ſeu ſuppurantia ut ol. roſ. vit. ov. tereb. reſ. abiet. far. trit. thus. &c. Si pars ſicca , mox ſarcotica applicantur neglectis illis , & quidem ſæpiſſ. mutanda medicam. & ſemper ſarcotica ſuppurantibus miſceantur. Vbi pus bonum apparet ſarcoticis utimur. *Ceſar Magatus & Septalius* rarò detergendum vulnus cenſent, quod aer ambiens partis temperiem corrumpat , unde puris copia & curæ difficultas. 2. Turundas inutiles eſſe. Fluxio

arcetur, si partis calor, dolor, humorum calor, tenuitas præcaveatur per V. S. Purgatio si requiratur, in principio detur; accedente febre tuta non est. Semper fiat è mitioribus.

VMBILICALIS hernia. Hernia umbilicalis.

VMBILICI hernia aquosa. Hernia aquosa umbilici.

VMBILICI hernia carnosa. Hernia carnosa umbilici.

VNGVLA. Oculi vitia.

VOLVVLVS. Ileus.

VOMITVS nimius Curatur revellent. clyst. ol. fric. & imprimis calefactione extremorum. dentur adstringentia ante cibum. Ventosa ventriculi fundo applicetur. Topica, crusta panis in aq. ment. & acet. ros. infusa, pulv. mastich. aspersa. tosta. opium.

VRINÆ ARDOR. Dysuria.

VRINÆ difficultas. Dysuria.

VRINÆ incontinentia. Mictio involuntaria.

VSTA. Combusta.

VTERI hydrops. Hydrops uteri.

VTERINVS furor. Furor uterinus.

VTERI procidentia. Procidentia uteri.

VTERI suffocatio. Suffocatio uteri.

VVEÆ procidentia. Oculi vitia.

VVLNVS nervorum. signa: dolor, actio læsa, sanies. punctura periculosissima. angustia.

Bals. d Empts 4 Rᵘlandj : ℈ Ruth Fol. Besse, Argent. Med.

Vomitus ℈ sensus sepatis inflam
matis, diaphragmatis, & fauce
ris. P. Barbette P. lib. IV. c.
Is synocho, sepatitide, & pleuritide, & pleuro
pneumonia V. f. non accipit. D. H. Sing
Mentha stomachi roborantia
d adstringentia vid. & Euch
Pt. Sel. & Mss. Dete 4 i
Diaydon. S. Syth. Diascordium.
Trocis. Cathabet.
Nardi ℈. nos.
Externa: Cathapl. ex fermento rosato
azoticato.
Dibapta ℈. plantaginato mentha
ta, cal.

Uteri dola.
Ca: alterno: tensiu: stupi
Solutio: bellicus.
Vi. apta. XXII.
Curatio: dolori, tensui, stupori ca.
Theriaca c. ℈ Cary ℈ II. ex vino generoso. Emplast ex baccis lauri.
Anodyna Interna & externa. ℈ tinct ex vino & Opio.
Ster aromatici.
Scultus Hysterica, Galiatus. A. Gallej obs. XXXIX.
ol. Cainini antharej. ol. mentte. Sythoi. rosmarini. Cathorej. ol. Nardin Laurin, pulegij. ℈. Salvie. ℈ ol. Carj. d. Cuminio amisi. foenic.

Sandaracopsa.
Sebastapsis.
Linonelis Nasturtiatis.
Resina Trygocarpica.
Oxeteus Fab.

Unguium defluvium.

Unguium fissura.

anguſtia enim vix ſubituris med. vix exituris ſaniebus patet. Symptomata ſi ante 7. non appareant, bene ſperandum. med. ſint temperate cal. ſed ſicca. Non ſolum pars affecta ſed & princip. nervorum & tota pars reſpiciatur. Si vulnus non pateat ſatis; amplificetur. Topica dolorem mitigent & ſaniei exitum parent. dolorem hic ſedant ol. lumbr. far. fab. hord. lup. fl. chamæm. &c. cum lixivio vel oxymel. Fuge frig. hum. adſtringentia. ſaniei ſeu ſynoviæ, ut vocat *Cneuff. daſz glidt vvaſſer.* conveniunt ol. lumbr. rut. de caſt. de tereb. lacrym. abiet. euphorb. quod quo vetuſtius eo debilius. Vnde ſi vulnus rubeat, &c. med. mitius impone, ol. hyper. ſp. vini, gum. Tacamah. Carannæ. *Paraus* tali vulneri in Carolo 9. impoſuit empl. è Baſilicone, quod ipſius agglutinationem remoraretur: ſimul diplomata lintea oxycrato imbuta toti brachio cum faſcia expulſiva ad humerum uſq; impoſuit. Secundo apparatu ol. Tereb. cum aq. vitæ vulneri infudit. Toti vero brachio emplaſtrum diachalciteos, in aceto & ol. roſ. diſſoluto impoſuit, cum faſcia expulſiva. (℞. ol. Tereb. ʒ j. aq. vit. ʒ j. addi poteſt euphorb. parum vel ℞. Tereb. ven. ʒ j. ol. vet. ʒ j. aq. vit. parum.) poſtea tumorem, dolorem, curarunt catapl. ℞. far. hord. & orob. ana ʒ ij. fl. chamæm. meli. ana p. ij butyr. rec. ſ. ſal. ʒ j ß. lixiv. barbitonſ. q. ſ. his ſi dolor non

ceſſiſſet, vel nervum totum reſcidiſſet, vel ol. fervens affudiſſet, eoque imbuto linteo ſpatulæ extremo alligato ter aut quater fundum attigiſſet.

VVLNVS ligam. & articul. Cura eadem eſt quæ nervorum, niſi quod articuli majorem ſiccationem, adhuc majorem ligamenta deſiderent; utile eſt Balſ. *Par.* ſi pulv. doſis intendatur. A frigore, aere, diligenter cavendum. actu cal. imponantur. Si anticam humeri partem vulnus obſideat, alæ diploma craſſius ſubjiciendum & mitella brachium ſuſtentandum. Si carpus vel digiti, ſemiflexa ſit vola, pilâ aſſidue circumlatâ. Sic enim ſemper contrahi poterunt. Si coxa, os femoris, ne latum unguem ab Iſchii cavitate dimoveatur, quod fit faſciis & decubitu in ſpinam. Cum cicatrix fit, moveatur metu anchyloſeos. In vulnere articuli crus rectâ collocandum. Signa oſſis abſceſſuri ſunt. 1. Cum ſanies copioſior effluit. 2. Cum os aeri exponitur: id enim abſcedit. 3. Si coaleſcere non velit & caro mollior generetur.

VVLNVS à globis inflictum venenatum non eſt nec ſemper contuſum. Male ol. Sambuci inuritur. Difficult. curatur ob contuſ. & fig. circularem. Signum eſt pauca ſanguinis è vulnere eruptio: ſtatim enim intumeſcunt labra. Primo ſi neceſſe & poſſibile, vulnus amplificandum. Citiſſimè glans

exi-

genitalis [illegible]

Ol. d garyophyll. vulg. Schoepferij
Ferdin. Gonzagæ Duc.
Mantuani, & Sabioneti
vit. Etiam. m. xij.
LXXXIII.

eximatur per inſtrumentum. *Fab. cent.* 1. *obſ.* 88. poſt ſuppurandum præter generalia, ut ol. è Catellis. Sed ſi pars ſit ficca, plus terebint. & minus ol. ſumendum. Si putredo adſit, Mercurius præcipitatus addatur vel ægypt. ol. ſem. lini, ol. cannab. ol. hyperic. vitell. ovi. Setacea illa, quibus hinc inde tractis vulnus purgatur, utilia non ſunt, cum idem per penicula fiat. Per initia ſemel de die obligetur: ubi pus fluere incipit, bis de die, etiam ter de die poſtea bis, tandem denuo ſemel. Pus in hiſce vulneribus tarde funditur. pot. vulnerariæ. ad teſtul. eximendas ſeq. longo uſu probatum. ℞. Rad. ireos, flor. panac. cappar. ana 3 ij. Ariſtol. rot. man. thur. ana 3 j. cum melle roſ. & Tereb. ana ʒ ij. excip. Quidam deplorata hæc vulnera ſuppurante curavit è lardo liquefacto, ovi vitello, terebint. & pauco croco. poſt ſuppurat. detergendum.

VVLNVS oculi. Primo repellens appone. Omnia tepida. Temporibus. narcotica ſunt, pulmones vervec. & omentum in lacte cocti & calidi appoſiti, lac mulieris Virginem lactantis, ſanguinis turtur. columbar. pullor inciſa ſub alis vena. Si fruſtra, ad vehementiora veniendum. detergentia ocularia ſunt: fella rajæ, lepor. perdic. in aq. euphrag. fœnic. ſacch. cand. crocus. Seq. Sarcoticum eſt. ℞. mucag. gum. oliban. arab. tragac. & ſarcocoll. in aq. hord. extract. ana

℥ ij. aloës ter lotæ in aq. ros. ʒ j. cerus. ust. & lotæ, tutiæ præp. ana ʒ ß. f. collyr. Cicatrix inducitur aq. euphrag. sacch. & tut. pp. Si fluxio sisti nequeat, seto adhibeatur. V. S. utilissima in principio.

VVLNVS Linguæ suturam non fert sed linctus fiant & dentur sir. è ros. sic. mel. ros. col. &c. vel collutio. *For.* recipit vitellum ovi crudum, bulliat parum ut parum concrescat. adde ʒ j. sir. è ros. sicc. fiat litus. postea ℞. aq. plantag. caprifol. ana ʒ iv. sir. è ros. sic. infus. ros. ana ʒ j ß. f. collutorium. ore versetur sacc. ros. sir. cydon. *Paræus* suturam adhibet, dum minister linguam molli linteo tenet.

VVLNVS auris cataplasmata gravia unctuosa non fert sed glutinantia, sicca: si sutura sit facienda acus cartilaginem non tangat: abit enim in gangrænam.

VVLNVS Thoracis si in capacitatem usque penetraverit, Spiritus ore naribusque obturatis per vulnus erumpit, æger vix spiritum ducit, cum specillo exploratur. Æger eo statu locetur quo erat cum vulnus acciperet. Sanguinem in capacitatem thoracis confluxisse scitur, si adsit febris, si pondus diaphragmatis & dyspnæa urgeat: si sanguis eructetur. Si nihil in capacitatem thoracis confluxerit, citissime consolidandum metu fistulæ: si sanguis in thorace hæreat diu per turundas apertum servetur. Ergo si quando

curan-

Ligna Cogerum.

Adstringunt ulcera, sistunt, restituunt, hæmorrhagias.

Decoctum ex vulnerariis, & collutione. ex Consolida, millefolio, ophioglosso, serpentaria, plantag. fragaria, hypico, bursapast. telephio. rosar. balaust. sanguin. mell. rosar.

Succus ex bolo Armen. Sanguin. Draconis, succ. Draconis c. mell. rosar. & hypocist. succ. rosar. sicc. Sanguinem Cynocrambes. Collyr. ex traumaticis Ophthalmicis.

---

curandum ſuſceperis tale vulnus, haud primo apparatu id obturabis, ſed ad duos vel tres dies apertum tenebis. Cum interea animadverteris ægrum nullo dolore, pondere, febre, hæmoptyſi tentari, detracto penicillo citiſſim e conſolida.

Si adſit febris, pondus, &c. præter generalia ſanguis ſiſtatur per in & externa, etiam V. S. Turundæ & omnia Topica non ſint nimis longa, ne pulmones offendant: item ad diplomata filo alligentur, ne in thoracem ~~excidant.~~ Capite ſint craſſiore. æger jaceat in parte affecta. ſanguis è thorace expurgatur per injectionem à Paræo è decoct. hord. ℥ vj. mell. roſ. ℥ ij. quam reclinato corpore ſpiritu expreſſo per vulnus æger reddat majori quantitate quam fuit injecta. Idque tamdiu fiat donec ſanguinis thrombi ſint vacuati. Nihil amari injiciatur. *Senn.* per pyulcum elicit." Si accepto vulnere ſanguis in pectore detineatur nec fluat è vulnere æger granum unum moſchi ſub lingua teneat: ſic enim effluet.# Tubulus aureus, argenteus, plumbeus inſeri poteſt foraminibus multis pervius, alis munitus vel loris revinctus, ſpongia magna vino & aq. vitæ imbuta expreſſa ad orificium inſtructus ut ſanies per eum vacuetur. Ad thromboſin ſolvendam melicratum injici poteſt, quod ex una parte melli & duabus aq. ad tertias coctis fit ſolutum in aq. agrim. &c. tepide interna expectorantia dentur.

VVLNVS pulmonis. Signa præter ſuperiora, ſpumantis ex ore ſanguinis cum tuſſi rejectio, è pectore rubens ſpumans ſanguis ſine dolore effluens: cervicis venæ turgidæ ſunt. Sed cum caro pulmonum vulnerata eſt, tuſſis non adeſt, ſanguis enim diaphragma petit & premit, ſed modo frigus modo calor, frequens faciei mutatio. Secatur vena metu inflammationis, niſi copioſus ſanguis effluxerit. Vulnus ſi anguſtum ſit, amplificetur, ut effluat materia. Adſtringens repellens applica. Quædam injici poſſunt ut liqu. *Senn.* inſpiratione diſtentis pulmonibus pulverem inſpergit. pot. vulneratiæ. utatur cibis emplaſticis. Vitet motum omnem. Sanari poteſt niſi fuerit nimis magnum, ſi inflammatio vacet, ſi tuſſis abſit. detergitur eclegmatis e lacte cum pauxillo mellis. Inprimis ſacch. roſ. &c. ℞

VVLNERVM hæmorrhagia. Hæmorrhagia vulnerum.

VVLNVS cum fractura. Fractura cum vulnere.

VVLNVS magnum. Renuntiatio.

VVVLÆ inflammatio. Inflammatio gurgulionis.

VVVLÆ procidentia. Procidentia gurgulionis.

XIPHOIDIS cartilaginis prolapſus. Procidentia cartilaginis xiphoidis.

FINIS

#Eclegmata, Elata, Scrapia &c,
l. ; phthisi.

Vulnq; aspe arteriæ. Vid. ; Chir. Vid. Tract. 4. III. Chir. c. 11
Sedandq; & agglutinandq;
Empl. nigr. opt. & Rhetic. Collij.
l. ; aqua. Omnino Vigonis
ore accipienda, & Scrofi per arteriq;
aspe dehiscentia. Cavendq; à fer,
more cum Uso, & nigr. à Pp.
Convenient interna l. ; Ulcere
cpd. Croc. & Ta. Coll.
Diacydon. S. Felix.

Vulny abdominis & intestinorum.

Lenientia et Coll. & sanantia
dix, non obstante Hipp.
to: lib. 1 sect. 11.
W. Rumleÿ obs. XXXIX.

Sicta, semissa. Poly cyclaminat.
Confect. anisi, & sach. de sanctis. ss.
Fomenta Menemhastica.
Pessi ol. Cucurbit. & Nardis.
inittendi.
Vi alter. & defensiva phlegmonis.

Vulnus sepatis.

Glenum, Vitale e Hippoc. VI. aph.
XIX. & II. prorhet. & Coac. &
V. Epidem. C. Cels. V. 26.
Ebersima IV. Can. sect. IV. tr. I. c.
2. Galen. & Com. aph. cit.
Curatio & ostendit explic. Jo. Skenkij
lib. III. obs. XXXIX. & seqq.
Profundum, & lesione vasor. majo-
& putrefactij, medicabile, ja ag;
non cassij enormi gimbla.

Diaga. explic. vulneris: vomicæ
biliosæ: lipothymia: febris: sudo
fugido & cyhemon. refrigeratoe:
vrinæ languoe: & debilitate cubandi
& jacendi.

Curatio. Cohibendo, & topicis glutinando. Poly Holdanthis, gorei
& Dissolventibus & sedativis ja
sistentibus: Quibus Universalia
lib: S. M. sinxer. ferantur:
Enematis emoll. & lenantibus.
Cordialibus non neglectis tam interne
& externe.

Sicta semis, refrigerans, adg
stringens.

Traumatica vid. sub to.

ol. Hyperic. & compos.
Balsa. vulnerar. Mindereri.
Gemenge sibi Hipp.

ol. Nenuphar.
Empl. nigrum.
Picis Cretij.
Cerat. de Betonica.

Vulnq lienis.

Sgu. Lesio in superficie, nq lesa.
Profunda sine lesa, & arterias,
Hemorragias, & inflamaoes,
Curão Contra à Ora, & juvanda
potionibz Vulnerarijs.

Vulnus renum.

Signa: Urinę difficultas, urina,
dolor lib, tumor abdominis,

Progn. Insanabile, si ad carum
culas pertingat. Hingat.
Regimen hoc Humores asperos, Ros
cos, Herbas, enema, vomitz
frequentia prohibere.
Curão; Omissis universalibz,
Vulnq externum sanandum, glu
tinão Ora conuenienda
Seavendo o Osso lesado.
Dotz Practicos de Turis in Vulnq. Syptico.

Vulnq Vesicę.

Sgu. peritonitis, & Diarrhoia
Hippocr. VI. apho. XIX.
Collo inflicta, gsoldan postea, ex
carnosis Cicatricibz fundo, quibz
bromos, semper Humore madet,
Dolentia Dies gravatiores in
pede, vehementer dolet, & post
ea Spi pflegmone excitat.
Progn. ab. Cicatr. Vrę. dolor
augetur, tumor pedis, urinę cru
enta, Urinę flux, ex Vulnere
stomachi adh, bilis vomitus, singul
extremos refrigerans habet.
Curão per externa & externa.
Jnt. sol. Vulnerarię c. urin. Vulp.
Syptico.
Ext. ol. Momordię.
Syptici.
Theriaca.
rosarum.
Syptici.
Empls ad tumias.

(Dotz Traumatici Turgesii.

Injectiones Vulnerarię ex Ossa inspida
Chi Cabi de Jacob. Tij.

Vulnq Scroti.
Ff: Solij, facile curata: si ob
tectij, difficile.
Diff. punctis, cutis, rupturis,
glutis.
Cura. † glutinantia, ubi ij
alijs partibus.

Index Morborum.

Febres.

Ephemera. pag. 69
Hectica p. 73
Hectica peſtilens 75
Putrida 69
Continua putrida 70
Tertiana 70
Tertiana duplex 71
Quotidiana 72
Quartana intermittens 72
Quartana triplex 73
Quartana continua 72
Quintana 73
Erratica 73
Symptomatica 73
Lenta 73
Epiala 76
Syncopalis 76
Aſſodes 76
Elodes 76
Peſtilens 77
Petechialis 78
Vngarica 79
Febris alba 81
Hemitritæus 73
Peſtis 79

Febrium symptomata. 80

Caput.

Catarrhus pag. 35
Capitis dolor 55
Apoplexia 13
Carus 33
Lethargus 152
Coma 41
Coma vigil 42
Epilepsia 65
Catalepsis 34
Ecstasis 63
Hydrocephalus 123
Incubus 128
Phrenitis 135
Mania 162
Melancholia 163
Memoriæ defectus 165
Vertigo 232
Pilorum defluuium 197
Plica 199
Furfures 95
Ebrietas. 62

Oculi.

Ophtalmia 174
Pterygion 176
Nubecula 177
Sugillatio 178
Hypopyon 178
Vuleæ procidentia 178

Mydriasis pag. 179
Cataracta 179
Excanthis 180
Rhyas 180
Amblyopia 180
Epiphora 180
Palpebrarum Trachoma 183
Hordeolum 184
Ectropium 184
Lagophtalmia 185
Hydatis palpebræ 185
Palpebrarum pruritus 201
Oculi vlcus 237
Caruncvlæ lachrymalis vlcus 238
Oculi vulnus. 247

Aures.

Obstructio meatus auditorij 172
Surditas 220
Vlcus auris 238
Vulnus auris 248
Tinnitus. 223

Nares.

Narium hæmorrhagia 102
Sternutatio 216
Narium vlcus. 239

Labia.

Os, lingua, dentes, gingiua, fauues.

Dentes 52
Parulis 225
Epulis 225

Labia Leporina pag. 149
Linguæ tumor 154
Ranula 155
Aphtæ 11
Gurgulionis inflammatio 136
Angina 137
Vuulæ relaxatio 250
Gulæ obstructio 173
Ptyalismus. 201

Thorax, pulmo, mamma, cor.

Tussis 225
Asthma 22
Empyema 64
Hydrops thoracis 123
Phthisis 196
Peripneumonia 139
Pleuritis, 140
Sanguinis sputum 100
Palpitatio cordis 185
Syncope 212
Papillæ 186
Papillarum fissura 83
Mammarum inflammatio 145
Xyphoidis decidentia. 200

Ventriculus.

Anorexia 8
Bulimia 25
Ardor ventriculi 15
Ventriculi inflammatio 146
Intemperies Ventriculi 148

Len-

Ventriculi inflatio pag. 147
Singultus 213
Vomitus 244
Vlcus Ventriculi 240
Cholera. 38

Intestina, Anus.

Aluus suppressa 5
Diarrhœa 53
Dysenteria 58
Lienteria 153
Tenesmus 223
Colica 40
Ileos 126
Vermes 230
Ani procidentia 199
Hæmorrhoides. 115

Iecur, lien, mesenterium.

Affectio hypochondriaca 22
Cachexia 26
Assites 116
Tympanites 121
Hepatis inflammatio 143
Obstructio hepatis 171
Scorbutus 208
Hepatis Scirrhus 207
Lienis inflammatio 145
Lienis intemperies 148
Lienis scirrhus 207
Mesenterij inflammatio 147
Lues venerea 156

Renes, Vesica.

Calculus renum pag. 27
Renum inflammatio 146
Renum Vlcus 240
Calculus Vesicæ 29
Vlcus Vesicæ 240
Dysuria 61
Stranguria 216
Mictio inuoluntaria. 169

Penis, Testes.

Testium inflammatio 147
Priapismus 201
Gonorrhœa Venerea 99
Hernia intestinalis 108
—Inquinalis 110
Hernia Vteri ventosa, aquosa 111
—Carnosa, varicosa 112
—Vmbilicalis, vmbilicalis aquosa 113
—Vmbilicalis Carnosa 114
—Gutturalis 114

Morbi virginum & mulierum.

Abortus 1
Partus 169
Secundina vide Partus 189
Lochia 191
Sterilitas 215
Lactis defectus 149
Lactis redundantia 150
Lactis thromboſis 150
Vteri procidentia 199
Vteri ſuffocatio 217

Renes, Ureter.

Calculus renum
Renum inflammatio
Renum Vicus
Calculus Vesicæ
Vicus Vesicæ
Dysuria
Strangoria
Ischuria involuntaria

Penis, Testes.

Testium inflammatio
Priapismus
Gonorrhœa Venerea
Hernia intestinalis
——Inguinalis
Hernia Varicosa, aquosa
——Carnosa, carnosa
——Umbilicalis, umbilicalis aquosa
——Umbilicalis Cataysta
——Guturalis

Morbi virginum & mulierum.

Menses
Partus
Secundinæ de Partu
Lochia
Sterilitas
Lactis defectus
Lactis redundantia
Lactis abundantia
Vteri prolapsus
Vteri suffocatio

Vteri hæmorrhoides pag. 108
Vteri hydrops 122
Furor Vterinus 95
Fluor muliebris 85
Menſium profluuium 166
Menſium ſuppreſſio 167
Chloroſis: vide febres 81
Menſium ſtillicidium. 169

Affectus puerorum.

Febres 130
Siriaſis 131
Pauor in ſomno 131
Vigiliæ 131
Catarrhus 132
Epilepſia 66
Hydrocephalus: vide morb. Capit. 123
Aphtæ: vide os, fauces 11
Linguæ viuculum 132
Sahafati 205
Humiditas aurium 132
Tormina Ventris 132
Alui fluxus 133
Lumbrici 133
Dracunculi 133
Morbilli. 169

Artus, Nerui.

Arthritis 16
Paralyſis 186
Paralyſis particularis 188
Neruorum tremor 224

Conuulsio pag. 47
Lumborum dolor 58
Horror. 115

Venenum.

Venenum 227
Morsus à cane rabido. 228

Totum.

Lassitudo 151
Marasmus. 163

Miscellanea.

An fulmine quis ichis 204
An qui confossas eo viuente vel mortuus factum 204
An submersus viuus vel mortuus præcipitatus in aquas. 204
Infans an suffocatus 204
Crisis 49
Dolor 57
Fascinatio 68
Imaginatio 117
Pili & eorum morbi 197
Recidiuæ. 203

Cutis.

Scabies 206
Elephantiasis 63. & 64
Icterus 124. & 125
Impetigo 128
Maculæ Ephelides 161
Maculæ congenitæ 162
Pustula 202

Suda-

Sudamina. 182

Tumores.

Anthrax pag. 10
Bubo 24
Scirrhus 206
Fungi 95
Gangliam 96
Oedema 182
Scrofula 212
Varices 226
Verruca, clauus, condyloma 231
Eryſipelas 67
Gutta roſacea 100
Suppuratio 219
Bronchocele 114
Herpes miliaris 114
Gangræna, Sphacelus oſſium 96. & 214
Inflammatio 134
Paronychia 189
Perniones 192
Epinyctis 202
Eſſere 203
Pſydracia 203
Phlyctænæ 203
Aneuriſma. 7

Vulnera, Contuſiones.

Vulnera partium, vide titulum cuiuſque partis.

Vulnus 241
Vulnus Capitis cum fractura 91

Vulnus oculi pag. 147
Vulnus linguæ 148
Vulnus auris 148
Vulnus neruorum 244
Vulnus ligamentorum & articulorum 246
Vulnus thoraxis 248
Vulnus pulmonis 250
Vulnera Sclopetorum 246
Vulnerum hæmorrhagia 104
Contusio capitis cum ecchymosi 45
Contusio cum sanguinis effluxu per superiora 47
Concussio cerebri 44
Sutura 221
Contusio cum ecchymosi. 45

Vlcera, fistulæ.

Vlcus 234
Vlcus cum ambitu duro 236
Excrescentia carnea in vlceribus 235
Vlcus cum tumore 236
Vlcus supra malleolum 236
Fistula gingiuarum 85
Fistula thoracis 85
Fistula 83
Cancer 31
Ambusta 42
Intertrigo 149
Ossis sacri excoriatio. 183

Fractura.

Fractura cranij cum contusione 46

Fra-

MORBORVM.

Fractura cranij cum vulnere pag. 91
Effractura 94
Sedes 94
Resonitus 94
Trepanum 224
Fractura 86
Fractura cum vulnere 90
Fractura cruris cum vulnere. 90

Luxationes.

Luxatio 158
Luxatio vertebrarum. 160

FINIS.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Schmitz, Johannes A.

Joh. Andr. Schmitzii Medicinae practicae compendium

Genevae 1659

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- Med 4019
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11269712-8